

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

לידופרי-אבניר 5% קרם

החומרים הפעילים וריכוזם:

הרכב:

Lidocaine 2.5%

Prilocaine 2.5%

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים – ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לידופרי-אבניר 5% משמש לאלחוש מקומי על פני העור, לשיכוך כאבים לפני פעולות הכרוכות בהחדרת מחט (לדוגמה: עירוי, בדיקות דם) וניתוחי עור שטחיים. קרם לידופרי-אבניר 5% פועל על ידי אלחוש פני העור באופן זמני, כך שמסייע לשיכוך הכאב. אך עדיין ייתכן שתחוש מגע ולחץ באזור.

קבוצה תרפויטית:

מאלחש מקומי מקבוצת האמידים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, או למאלחש מקומי דומה אחר (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בלידופרי-אבניר 5% ספר לרופא אם:

- לך או לילדך יש מחלה תורשתית נדירה המשפיעה על הדם, שנקראת "מחסור בגלוקוז-6-פוספט דהידרוגנאז" (אנזים G6PD, רגישות לפול).
- לך או לילדך יש בעיה ברמות פיגמנט הדם הנקראת "מטהמוגלובינמיה".
- אין להשתמש בלידופרי-אבניר 5% באזורים בהם יש פריחה בעור, חתכים, שפשופים, שריטות או פצעים פתוחים אחרים, פרט לכיב ברגל. אם אחת מבעיות אלו קיימת, בדוק עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה.
- אתה או ילדך סובלים ממצב של גירוי בעור הנקרא "אטופיק דרמטיטיס". ייתכן שמשך השהייה קצר יותר על העור יספק. השארת הקרם על העור למשך יותר מ-30 דקות יכולה לגרום לעליה בשכיחות של תגובות עוריות מקומיות (ראה גם סעיף 4 "תופעות לוואי").
- הינך נוטל תרופות מסוימות להפרעות בקצב הלב (אנטי-ארייתמיות מקבוצה class III, כגון אמיודארון). במקרה זה הרופא ינטר את תפקוד הלב שלך.

עקב הפוטנציאל לספיגה מוגברת בעור שגולח לאחרונה, חשוב לעקוב אחר המינון המומלץ,

אזורי העור ומשך השארת הקרם המרוח על פני העור.

יש להימנע מכניסת קרם לידופרי-אבניר 5% לתוך העיניים, מאחר שזה יכול לגרום לגירוי. אם בטעות קרם לידופרי-אבניר 5% נכנס לעיניים, יש לשטוף מיד היטב את העיניים במים פושרים או

בתמיסת מי מלח (סודיום כלוריד). היזהר על מנת להימנע מכניסת כל דבר לעין עד לחזרת התחושה.
אין למרוח לידופרי-אבניר 5% על עור תוף פגום.
כאשר הינך משתמש בלידופרי-אבניר 5% לפני שהינך מתחנן עם חיסונים חיים (לדוגמה חיסון שחפת), עליך לחזור לרופא או לאחות לאחר תקופת הזמן המבוקשת לצורך מעקב אחר תוצאות החיסון.

בילדים - אין להשתמש על איברי המין הריריים (ראה גם בסעיף 3).

במצבים הבאים יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

- בתינוקות מתחת לגיל שנה המטופלים במקביל בתרופות משרות מטהמוגלובינימיה כגון סולפונאמידים ("תרופות סולפה").
- בפגים עד הגיעם לגיל כרונולוגי של 37 שבועות הריון.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם, תוספי תזונה ותרופות צמחיות, ספר על כך לרופא או לרוקח. זאת מאחר שקרם לידופרי-אבניר 5% יכול להשפיע על האופן בו תרופות מסוימות פועלות, וחלק מהתרופות יכולות להשפיע על לידופרי-אבניר 5%.
ספר לרופא או לרוקח במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים, הנקראות "סולפונאמידים" וניטרופורנטואין.
- תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה, הנקראות פניטואין ופנוברביטל.
- מאלחשים מקומיים אחרים.
- תרופות לטיפול בקצב לב לא סדיר, כגון אמיודארון.
- סימטידין או חוסמי בטא, אשר עלולים לגרום לעלייה ברמות הלידוקאין בדם. לתגובה בין תרופתית זו אין רלוונטיות קלינית בטיפול קצר-טווח עם לידופרי-אבניר 5% במינונים המומלצים.

הריון, הנקה ופוריות

- אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להרות, התייעצי ברופא או ברוקח טרם השימוש בתרופה זו.
- שימוש מזדמן בלידופרי-אבניר 5% במהלך הריון לא אמור לגרום לתופעות לוואי בעובר.
- החומרים הפעילים בלידופרי-אבניר 5% (לידוקאין ופריילוקאין) מופרשים לחלב האם. אולם, הכמות היא קטנה מאוד כך שבדרך כלל אין סיכון לילד.
- ניסויים בבעלי חיים לא הראו פגיעה בפוריות הזכר או הנקבה.

נהיגה ושימוש במכונות

לידופרי-אבניר 5% אין השפעה כלל או יש השפעה זניחה על יכולת הנהיגה והשימוש במכונות כאשר משתמשים במנות המומלצות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

לידופרי-אבניר 5% מכיל macroglycerol hydroxystearate (מקרוגולגליצירול הידרוקסיסטאראט) שעלול לגרום לתגובות עוריות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש בתכשיר לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

ראה בהמשך: "מדידת הכמות הנכונה של הקרם"

אין להשתמש בקרם לידופרי-אבניר 5% ברקמות ריריות או על עור פגוע ללא התייעצות עם רופא. במקרים אלו יש להקטין את זמן ההייה של הקרם.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מינון במבוגרים (מעל גיל 12):

לפרוצדורות ניתוחיות זעירות (כדוגמת החדרת מחט לצורך עירוני תוך ורידי או בלקיחת בדיקות דם, או גירוד נגעים וירליים בעור (mollusca contagiosum)):

כ-2-1.5 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש למרוח שכבה עבה של קרם, לכסות בכיסוי אטום, כגון ניילון נצמד, ולהמתין 1-5 שעות.

לפרוצדורות ניתוחיות הדורשות אלחוש מקומי עמוק יותר:

כ-2-1.5 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש למרוח שכבה עבה של קרם, לכסות בכיסוי אטום, כגון ניילון נצמד, ולהמתין 2-5 שעות.

מינון מקסימלי: ניתן למרוח עד 60 גרם ליממה (2 שפופרות של 30 גרם). אין להשאיר את הקרם על האזור המטופל למשך יותר מ-5 שעות.

באזורי עור שעברו גילוח לאחרונה, אין למרוח קרם לידופרי-אבניר 5% על שטח שגדול יותר מ-600 סמ"ר (20X30 ס"מ).

להסרת כיבים ברגליים (leg ulcers) - יש למרוח 1-2 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש למרוח שכבה עבה של קרם על שטח הכיב, אך לא יותר מ-10 גרם לכל טיפול. לכסות בכיסוי אטום ולהשמיד את יתרת הקרם שנותרה בשפופרת. זמן השהייה: לפחות 30 דקות. במקרים של רקמות עם חדירות קשה במיוחד, ניתן להאריך את זמן השהייה למקסימום 60 דקות.

הסרת הכיב צריכה להתחיל תוך 10 דקות לאחר שהוסר הקרם. לידופרי-אבניר 5% יכול לשמש עד ל-15 טיפולים במהלך חודש-חודשיים ללא הפחתה באפקט או עלייה במספר התגובות המקומיות.

על איברי מין (גברים בלבד) – לפני הזרקה מאלחשים מקומיים - יש למרוח כ-1 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש לכסות בכיסוי אטום למשך 15 דקות.

על איברי מין (נשים) – לפני הזרקה מאלחשים מקומיים - יש למרוח כ-2-1 גרם לכל שטח עור של 10 סמ"ר. יש לכסות בכיסוי אטום למשך 60 דקות.

על איברי מין ריריים (מבוגרים בלבד) - לפני ניתוחי עור זעירים כגון ניתוח להסרת קונדילומות: יש למרוח 5-10 גרם, תלוי בגודל השטח המטופל. יש לכסות את כל השטח, כולל הקפלים בריריות. אטימה אינה הכרחית. זמן השהייה: 5-10 דקות. יש להתחיל את הניתוח מיד לאחר הסרת הקרם.

מינון בילדים:

לשימוש על העור לפני פעולות רפואיות כגון החדרת מחט או ניתוחי עור זעירים. יש למרוח כשעה לפני הפעולה.

אין לעבור על המנה המומלצת (ראה טבלת מינון).

בשימוש בתינוקות עד גיל 3 חודשים יש לבדוק מטהמוגלובין לפני ואחרי השימוש. בילדים, אין להשתמש בלידופרי-אבניר 5% על רקמות ריריות של איברי המין.

טבלת מינון בתינוקות וילדים

גיל ומשקל גוף	כמות מקסימלית של לידופרי-אבניר 5% קרם	שטח מריחה מקסימלי	זמן השהייה על העור מקסימלי על העור
עד 3 חודשים / עד 5 ק"ג	1 גרם	10 ס"מ ²	1 שעה
3-12 חודשים / 5-10 ק"ג	2 גרם	20 ס"מ ²	4 שעות
1-6 שנים / 10-20 ק"ג	10 גרם	100 ס"מ ²	4 שעות
7-12 שנים / מעל 20 ק"ג	20 גרם	200 ס"מ ²	4 שעות

בילדים עם אטופיק דרמטיטיס יש להסיר את הקרם 15-30 דקות לאחר המריחה.

מתן מנות נוספות:

בתינוקות עד לגיל 3 חודשים - אין לתת מנה נוספת במשך 24 שעות.

בתינוקות וילדים מעל לגיל 3 חודשים - יש להמתין לפחות 12 שעות עד למתן חוזר של לידופרי-אבניר 5%. אין לתת יותר מ-2 מנות תוך 24 שעות.

מדידת הכמות הנכונה של הקרם (לשימוש בילדים ובמבוגרים):

על מנת למדוד 1 גרם של קרם לידופרי-אבניר 5%, יש ללחוץ בעדינות על השפופרת להוצאת פס צר של קרם באורך 3.8 ס"מ וברוחב 5 מ"מ. פס הקרם צריך להיות בגבולות של השרטוט שלהלן:

פס ≈ 1 גרם

3.8 ס"מ X 5 מ"מ

אין לעבור על המנה המומלצת.

ראה בסוף עלון זה הנחיות מפורטות בנוגע לאופן השימוש.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים, ריריות והאוזניים. במקרה של מגע, יש לשטוף היטב במים. יש להגן על העין עד שתחושה חוזרת לעין.

אם מרחת כמות גדולה יותר מהמומלץ ייתכן שתחושה: עור בגוון אפור-כחלחל, תחושת נמנום או סחרחורות, טשטוש ראייה או צלצולים באוזניים, שינויים בתחושת הטעם, בלבול, תחושת חום/קור או נימול, תחושת עקצוץ בעור מסביב לפה וחוסר תחושה בלשון. במקרים חמורים של מינון יתר ייתכנו: עוויתות, ירידת לחץ דם, האטה בקצב הנשימה, הפסקת נשימה ושינויים בקצב הלב – יש לפנות את המטופל לחדר מיון מיד!

אם מרחת קרם לידופרי-אבניר 5% בכמות גדולה מהמומלץ או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים **אם הינך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בקרם לידופרי-אבניר 5% עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

פנה לרופא או לרוקח שלך אם תופעת לוואי כלשהי מבין תופעות הלוואי הבאות מטרידה אותך או שלא נראה שעומדת לחלוף. ספר לרופא על כל דבר אחר הגורם לך לחוש לא טוב בזמן שאתה משתמש בקרם לידופרי-אבניר 5%.

אם הינך חווה אחת מהתופעות הבאות במהלך השימוש בקרם לידופרי-אבניר 5%, הפסק את השימוש בו ובדוק עם הרופא או הרוקח שלך בהקדם האפשרי:

- תגובות אלרגיות, שבמקרים נדירים עלולות להתפתח לשוק אנפילקטי (פריחה בעור, נפיחות, חום, קשיי נשימה ועילפון) במהלך הטיפול בעור, ברירית איברי המין או בכיבים ברגליים.
- מטהמוגלובינמיה (בעיה בדם), שבמקרים נדירים עלולה להתפתח במהלך הטיפול בעור, ועלולה לגרום לסימנים ותסמינים של היפוקסמיה (רמות נמוכות חריגות של חמצן בדם). מטהמוגלובינמיה נצפתה בתדירות גבוהה יותר, לעיתים קרובות בקשר למינון יתר, בתינוקות שזה עתה נולדו ובתינוקות מגיל 0 עד 12 חודשים.

תגובה קלה (חיוורון או אדמומיות של העור, נפיחות קלה, תחושת צריבה ראשונית או גירוי) עלולה לקרות באזור מריחת קרם לידופרי-אבניר 5%. אלו הן תגובות תקינות לקרם ולחומרים מאלחשים והן ייעלמו תוך זמן קצר ללא צורך בשימוש באמצעים נוספים.

אם הינך חווה השפעות מטרידות או יוצאות דופן כשאתה משתמש בקרם לידופרי-אבניר 5%, הפסק את השימוש בקרם ובדוק עם הרופא שלך או הרוקח מוקדם ככל שניתן.

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- תגובות עוריות מקומיות חולפות (חיוורון, אדמומיות, נפיחות) במקום המטופל במהלך הטיפול בעור, בריריות של איברי המין או בכיבים ברגליים.
- תחושת צריבה קלה ראשונית, גירוי או חמימות באזור המטופל במהלך הטיפול ברירית אברי המין או בכיבים ברגליים.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- תחושת צריבה קלה ראשונית, גירוי או חמימות באזור המטופל במהלך הטיפול בעור.
- חוסר תחושה (עקצוץ) באזור המטופל במהלך הטיפול ברירית איברי המין.
- גירוי העור המטופל במהלך הטיפול בכיבי רגליים.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- דימום בצורת נקודות קטנות באזור המטופל (במיוחד אצל ילדים עם אקזמה לאחר זמני השארה ממושכים יותר של הקרם) במהלך הטיפול בעור.
- גירוי של העיניים אם לידופרי-אבניר 5% בא במגע עימן בטעות במהלך הטיפול בעור.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. **אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.**
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן את התרופה בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- ניתן להשתמש בקרם לידופרי-אבניר 5% עד 6 חודשים לאחר פתיחת השפופרת לראשונה, באחסון בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה.
- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד יש להיפטר מתרופות שאינך משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:


Macrogolglycerol hydroxystearate, Carbomers (Carbopol 980 NF), Sodium hydroxide, Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

קרם לידופרי-אבניר 5% הינו קרם לבן הומוגני הארוז בשפופרת אלומיניום של 5 גרם או 30 גרם.

אופן השימוש:


1. לחץ על שפופרת של לידופרי-אבניר 5% להוצאת כמות מספקת (ראה הוראות מינון) ומרח שכבה עבה של הקרם על העור. אין לשפשף את המקום.



1


2

2. כסה את העור עליו מרחת לידופרי-אבניר 5% בעזרת כיסויי אטום, כגון ניילון נצמד. הצמד היטב, ודא שהקרם כולו מכוסה.




2

3. המתן את פרק הזמן הנדרש (בדרך כלל שעה לפחות) עד לביצוע הטיפול הנדרש.



3

4. הסר את הכיסוי, נגב את קרם הלידופרי-אבניר 5% והכן לטיפול הנדרש. האזור שטופל בלידופרי-אבניר 5% יישאר מאולחש במשך 30 דקות לפחות ועד למספר שעות.



4

שם היצרן וכתובתו: מעבדות אגוטאנט, רח' אלכסנדר פלמינג 1, 69007, ליון סדקס, צרפת

בעל הרישום וכתובתו: ביואבניר בע"מ, רח' דוד המלך 1, הרצליה פיתוח

נערך בדצמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 162-80-35307-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.