نشرة طبّيّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) 1986

يُسوّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

هالوبير 0.5 ملغ أقراص
هالوبير 5 ملغ أقراص
هالوبير 10 ملغ أقراص

يحتوي كل قرص من هالوبير 0.5 ملغ على: Haloperidol 0.5 mg
0.5 ملغ هالوبيريدول

يحتوي كل قرص من هالوبير 5 ملغ على: Haloperidol 5 mg
5 ملغ هالوبيريدول

يحتوي كل قرص من هالوبير 10 ملغ على: Haloperidol 10 mg
10 ملغ هالوبيريدول

للاطلاع على المواد غير الفعالة ومستَبات الأرجية في المستحضر - انظر البند 2 "معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافيّة".

اقرأ النشرة بإمعان حتّى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توفّرت لديك أسئلة إضافيّة، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
لقد وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. قد يضرّهم الدواء حتّى لو بدا لك أنّ مرضهم مشابه.

1. لأيّ غرض مخصّص هذا الدواء؟

التأثير الطبّي: لعلاج أعراض الاضطرابات الذهانية، التي تؤثر على الطريقة التي تفكر بها، تشعر بها أو تتصرف بها. قد تجعلك هذه الاضطرابات تشعر بالارتباك؛ ترى، تسمع أو تشعر بأشياء غير حقيقية (هلوسات)؛ تؤمن بأشياء غير صحيحة (أوهام)؛ تشعر بارتياب متطرف (پارانويا - جنون الارتياب)؛ تشعر بفرط الانفعال، العصبية، الحماس أو فرط النشاط؛ تشعر بأنك عدواني أو عنيف.
لعلاج أعراض مرض توريت (Tourette).

الفصيلة العلاجيّة: مضادات الذهان من فصيلة بوتيروفينونات.

2. قبل استعمال الدواء:

☒ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجيّة) للمادة الفعالة أو لأيٍّ من المركّبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- كنت أقل إدراكًا للأشياء التي تحدث حولك أو إذا أصبحت ردود فعلك بطيئة بشكل غير عادي.
- كنت تعاني من الپاركينسون.
- كنت تعاني من الخرف من نوع خرف أجسام ليوي ('Lewy body dementia').
- كنت تعاني من مرض عصبي ضموري في الدماغ - Progressive Supranuclear Palsy (PSP).
- كنت تشعر بالنعاس والثقل نتيجة لمرض أو لاستعمال أدوية أو في أعقاب استهلاك الكحول.
- كنت تعاني من اضطراب قلبي يسمى "متلازمة QT الطويلة" أو من أي مشكلة أخرى في نظم القلب تُظهر نتيجة شاذة في تخطيط ECG (الكترو كارديوجرام - مخطط كهربية القلب).
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من أمراض القلب التي تسبب اضطرابات النظم أو النبض البطيء بشكل خاص.
- كنت تستعمل أدوية للاضطرابات في نظم القلب.
- كنت تعاني من قصور القلب أو أصبت مؤخرًا بنوبة قلبية.
- كنت تعاني من مستوى منخفض للبوتاسيوم في الدم لم يتم علاجه.
- كنت تعاني من تضرر في جزء من الدماغ يسمى العقدة القاعدية.
- كنت تستعمل أحد الأدوية الواردة في قائمة الأدوية التي لا يجوز استعمالها سويًا مع هالوبير (انظر البند "التفاعلات بين الأدوية").
- لا يجوز استعمال الدواء إذا كان أحد الأمور المسجلة أعلاه يخصّك. إذا لم تكن متأكّدًا، فاستشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

☒ تحذيرات خاصّة تتعلّق باستعمال الدواء:

قبل العلاج بهالوبير، أخبر الطبيب إذا:
- كانت لديك حساسية لغذاء ما أو لدواء ما.

☒ أعراض جانبيّة خطيرة

قد يسبب هالوبير مشاكل في القلب، مشاكل في السيطرة على حركات الجسم أو الأطراف، وعرضًا جانبيًا خطيرًا يسمى "المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان". بإمكانه أيضًا أن يسبب ردود فعل تحسسية خطيرة وخثرات دموية. عليك أن تكون مدركًا للأعراض الجانبية الخطيرة عند استعمالك لهالوبير لأنك قد تحتاج إلى علاج طبي مستعجل (انظر "أعراض جانبية خطيرة" في البند 4).

☒ الأشخاص المسنّون والأشخاص المصابون بالخرف

تم التبليغ عن ارتفاع طفيف في حالات الموت والسكتة الدماغية لدى الأشخاص المسنّين المصابين بالخرف، الذين يستعملون الأدوية المضادة للذهان. قد يكون المرضى المسنّون المصابون بالخرف، الذين يستعملون هالوبير من أجل السيطرة على سلوكهم، أكثر عرضةً لخطر الموت بالمقارنة مع المرضى غير المعالَجين.

☒ لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت تعاني الآن أو عانيت في الماضي:

- خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية - وتيرة بطيئة لدقات القلب، مرض في القلب أو ماضٍ عائلي من مشاكل القلب، إذا مات أحد أفراد عائلتك القريبة بشكل فجائي من مشاكل في القلب أو إذا كنت تستعمل أدوية لعلاج مرض في القلب.
- من ضغط دم منخفض أو إحساس بالدوار عند الانتقال إلى وضعية الجلوس أو الوقوف.
- من عدم توازن الكهارل - خاصة من مستوى منخفض للبوتاسيوم أو المغنيزيوم (أو لكهرل آخر) في الدم.
- من مشاكل في الكليتين، في الكبد أو في الغدة الدرقية (فرط الدرقية).
- من الصرع أو إذا عانيت ذات مرة من اختلاجات (تشنجات).
- من نزيف في الدماغ أو إذا قال لك طبيبك أن لديك احتمالًا أكبر من غيرك للإصابة بسكتة دماغية.
- من أورام حميدة في الغدة الكظرية (ورم القوائم).
- من مستوى مرتفع للهرمون پرولاكتين في الدم، أو من سرطان قد ينجم عن مستويات مرتفعة لپرولاكتين (مثل سرطان الثدي).
- إذا لم تكن تأكل بشكل صحيح لفترة طويلة.
- من خثرات دموية أو إذا كان لديك ماضٍ عائلي من الخثرات الدموية.
- تم التبليغ عن خثرات دموية في الرئتين والرجلين لدى المرضى الذين يستعملون أدوية مضادة للذهان (مثل هذا الدواء).
- من الاكتئاب أو من الاضطراب الثنائي القطب وبدأت تشعر بالاكتئاب.

قد تحتاج إلى متابعة أكثر كثبًا وقد تكون هناك حاجة إلى تغيير الجرعة الدوائية التي تستعملها من هالوبير.
إذا لم تكن متأكّدًا من أن أحد الأوضاع المفصلة أعلاه ينطبق عليك، فاستشر طبيبك أو الصيدلي قبل استعمال هالوبير.

☒ الأولاد دون سنّ الـ 6

لا يجوز استعمال هالوبير لدى الأولاد الذين سنّهم دون الـ 6، وذلك لأنه لم تتم دراسة الدواء بشكل صحيح في هذه الفئة العمرية.

☒ الفحوص والمتابعة

قد يحيلك طبيبك إلى فحص إلكتروكارديوجرام (مخطط كهربية القلب) قبل العلاج بهالوبير أو خلاله، لفحص النشاط الكهربائي لقلبك.
كذلك، قد يحيلك طبيبك إلى فحص للدم لفحص مستويات البوتاسيوم أو المغنيزيوم (أو كهرل آخر) في دمك قبل العلاج بهالوبير أو خلاله.

☒ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخّرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدليّ بذلك.

لا يجوز استعمال هالوبير إذا كنت تستعمل أدوية معينة لعلاج:
- مشاكل نظم القلب (مثل: أميودارون، دوفيتيليد، ديزوپيراميد، درونيدارون، إيبوتيليد، كوينيدين، پروكايناميد، سوتالول).
- الاكتئاب (مثل: سيتالوپرام أو إيسيتالوپرام).
- الذهان (مثل: فلوفينازين، ليڤوميپرومازين، پيرفينازين، پيميوزد، پروكلوروپرازين، پرومازين، سپرتيندول، ثيوريدازين، تريفلوپرازين، تريفلوپرومازين وزيپراسيدون).
- التلوثات الجرثومية (مثل: أزيثروميثيسن، كلاريثروميثيسن، إريثروميثيسن، ليڤوفلوكساتسين، موكسيفلوكساتسين وتيليثروميثيسن).
- التلوثات الفطرية (مثل: پينتاميدين).
- الملاريا (مثل: هالوفانترين).
- الغثيان والتقيؤات (مثل: دولاسيترون).
- السرطان (مثل: توريميفين وڤاندیتانيب).

كذلك، بلّغ الطبيب إذا كنت تستعمل بپيريديل (لعلاج الألم في الصدر أو لخفض ضغط الدم) أو ميثادون (لتسكين الآلام أو لعلاج الإدمان على المخدرات).
قد تزيد هذه الأدوية من خطر حدوث مشاكل في القلب، ولذلك عليك استشارة الطبيب إذا كنت تستعمل أحد هذه الأدوية أو لا تستعمل هالوبير (انظر البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

قد يتطلّب الأمر متابعة خاصة إذا كنت تستعمل الليثيوم وهالوبير بشكل متزامن.
هناك حاجة إلى مراقبة خاصة إذا كنت تستعمل الدواءين معًا. يجب إبلاغ الطبيب فورًا والتوقف عن استعمال الدواءين بشكل متزامن إذا كنت تعاني من: حمّى غير مفسرة أو حركات غير خاضعة للسيطرة، ارتباك، توهان، صداع، مشاكل في التوازن وإحساس بالميل إلى النوم. هذه جميعها علامات على وضع خطير.

قد تؤثر أدوية معينة على كيفية عمل هالوبير أو قد تزيد من الخطر لحدوث مشاكل في القلب. بلّغ الطبيب إذا كنت تستعمل:
- ألبرازولام أو بوسپيرون (لعلاج القلق).
- دولوكسيتين، فلوكسيتين، فلوفوكسامين، نيفازودون، پاروكسيتين، سيرترالين، St. John's Wort (العرن المثقوب) أو ڤينلافاكسين (لعلاج الاكتئاب).
- بوپروپيون (لعلاج الاكتئاب أو للمساعدة في التوقف عن التدخين).
- كاربامازيپين، فينوباربيتال أو فينيتوئين (لعلاج الصرع).
- ريفامپيتسين (لعلاج التلوثات الجرثومية).
- إيتراكونازول، پوساكونازول أو ڤوريكونازول (لعلاج التلوثات الفطرية).
- أقراص كيتوكونازول (لعلاج متلازمة كوشينج).
- إيندينافير، ريتونافير أو ساكوينافير (لعلاج ڤيروس العوز المناعي البشري، HIV).
- كلوروپرومازين أو پرومیثازين (لعلاج الغثيان والتقيؤات).
- ڤيراپاميل (لعلاج فرط ضغط الدم أو مشاكل القلب).

كذلك، بلّغ الطبيب إذا كنت تستعمل أدوية أخرى لخفض ضغط الدم، مثل الأدوية المدرّة للبول.

كيفيّة التناول – هالوبير مخصص للاستعمال عن طريق الفم. يجب تناول الدواء مع الطعام أو بدونه. يجب ابتلاع الدواء مع القليل من الماء.

الهِرس/الشطر/المضغ: لا يجوز المضغ، القرص مخصّص للبلع. عند الحاجة يمكن شطر، هرس أو سحق القرص.

إذا تناولتَ خطأً جرعةً دوائيّةً أكبر
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام شخص آخر بتلع الدواء خطأً، فتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء. عند استعمال جرعة دوائية مفرطة قد تظهر واحدة أو أكثر من بين العلامات التالية: انخفاض في حالة اليقظة، ارتجاف حاد أو فرط تصلب العضلات.

إذا نسيت تناول الدواء
إذا نسيت تناول هالوبير في الوقت المحدد، فعليك تناول الجرعة القادمة كالمعتاد. بعد ذلك، واصل تناول الدواء وفق إرشادات الطبيب. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.
يجب عليك إتمام العلاج الذي أوصى به الطبيب. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
حتّى لو طرأ تحسّن على حالتك الصحيّة، فلا يجوز التوقّف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقّفت عن تناول الدواء
سيستغرق الأمر وقتًا ما حتى تشعر بكامل تأثير الدواء. يجب التوقّف عن استعمال الدواء فقط إذا صادق لك الطبيب على ذلك. عليك إيقاف استعمال هالوبير بالتدريج، إلا إذا أمرك الطبيب بغير ذلك. قد يسبب إيقاف العلاج بشكل فجائي أعراضًا مثل: الغثيان، التقيؤات والصعوبات في النوم.

يجب المواظبة على العلاج حسب تعليمات الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكّد من الجرعة في كلّ مرّة تتناول فيها دواءً. ضع النظّارات الطبّيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافيّة حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبيّة:

انتبه للأعراض الجانبية الخطيرة
بلّغ الطبيب بشكل فوري إذا لاحظت أو شككت بوجود أحد الأعراض الواردة فيما يلي. قد تحتاج إلى علاج طبّيّ مستعجل.
مشاكل في القلب:
- اضطراب في نظم القلب - هذا العرض يوقف العمل السليم للقلب وقد يؤدي إلى فقدان الوعي.
- نظم قلبيّ سريع بشكل استثنائي.
- دقّات قلبيّة إضافية.

مشاكل القلب غير شائعة لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100 مستعمل). حدثت حالات موت فجائي لدى متلقّي العلاج الذين استعملوا هذا الدواء، لكن الشيوع الدقيق لهذه الحالات من الموت غير معلوم. كذلك، حدث توقف للقلب (توقف القلب عن النبض) لدى الأشخاص الذين استعملوا أدوية مضادة للذهان.
مشكلة خطيرة تسمى "المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان" - يسبب هذا العرض الحمى المرتفعة، تصلب العضلات الخطير، الارتباك وفقدان الوعي. إنها نادرة لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 1,000 مستعمل).
مشكلة في السيطرة على حركات الجسم أو الأطراف (الاضطراب خارج الهرميّ)، مثل:
- حركات الفم، اللسان، الفك وأحيانًا الأطراف (tardive dyskinesia).
- إحساس بالتململ أو صعوبة في الجلوس بسكون، تزايد حركات الجسم.
- حركات جسم بطيئة أو متضائلة، تشنجات أو حركات تشنجية.
- ارتجاف أو تصلّب في العضلات، مشي مترنح.
- عدم القدرة على التحرك.
- انعدام تعبير الوجه السليم، تعبير وجهي يبدو أحيانًا كالقناع.

هذه الأعراض شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد تظهر لدى أكثر من مستعمل 1 من بين 10 مستعملين). إذا عانيت من أحد هذه الأعراض، فقد تحتاج إلى علاج بدواء إضافي.

رد فعل تحسسي خطير قد يشمل:
- انتفاخًا في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة.
- صعوبة في البلع أو في التنفّس.
- طفحًا جلديًا مصحوبًا بالحكة (شرى).

رد الفعل التحسسي غير شائع لدى الأشخاص الذين يستعملون هالوبير (قد يظهر لدى مستعمل 1 كحد أقصى من بين 100 مستعمل).
خثرات دموية في الأوردة، عادةً في الرجلين (الخثار الوريدي العميق أو DVT). تم التبليغ عن خثرات دموية لدى الأشخاص الذين يستعملون أدوية مضادة للذهان. تشمل علامات DVT في الرجل الانتفاخ، الألم والاحمرار في الرجل، لكن الخثرة قد تتجرف إلى الرئتين، مسببةً ألمًا في الصدر وصعوبات في التنفس. قد تكون الخثرات الدموية خطيرة جدًا، لذلك بلّغ الطبيب بشكل فوري إذا لاحظت وجود إحدى هذه المشاكل.
بلّغ الطبيب بشكل فوري إذا لاحظت نشوء أحد الأعراض الجانبيّة الخطيرة المفصلة أعلاه.

أعراض جانبيّة أخرى
بلّغ الطبيب إذا لاحظت أو شككت بوجود أحد الأعراض الجانبية الواردة فيما يلي.

أعراض جانبيّة شائعة جدًا (very common) – أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:
- إحساس بعدم الهدوء (تململ)
- صعوبات في النوم
- صداع

أعراض جانبيّة شائعة (common) – أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 100:
- اضطراب نفسي خطير مثل الإيمان بأشياء غير حقيقية (أوهام) أو رؤية، إحساس، سماع أو شمّ أشياء غير موجودة (هلوسات).
- اكتئاب.
- توتر عضلي شاذ.
- إحساس بالدوار، بما في ذلك عند الانتقال إلى وضعية الجلوس أو الوقوف.
- إحساس بالميل إلى النوم.
- حركة العينين باتجاه الأعلى أو حركات سريعة في العينين وغير خاضعة للسيطرة. مشاكل في الرؤية مثل تشوّش الرؤية.
- ضغط دم منخفض.
- غثيان، تقيّؤات، إمساك.
- جفاف الفم أو تزايد في إفراز اللعاب.
- طفح جلديّ.
- عدم القدرة على التبول أو إفراغ المثانة البولية بالكامل.
- صعوبة في تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه (الضعف الجنسي).
- ارتفاع أو انخفاض الوزن.
- تغيرات تظهر في فحوص الدم لوظائف الكبد.

أعراض جانبيّة غير شائعة (uncommon) – أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 1,000:
- تأثيرات على خلايا الدم - عدد منخفض لجميع خلايا الدم، بما في ذلك انخفاضات خطيرة في تعداد خلايا الدم البيضاء وعدد منخفض للصفائح (وهي خلايا تساعد على تخثر الدم).
- إحساس بالارتباك.
- فقدان الرغبة الجنسية أو رغبة جنسية متدنية.
- اختلاجات (تشنجات).
- تصلب في العضلات والمفاصل.
- تشنجات في العضلات، حركات تشنجية أو تقلصات غير خاضعة للسيطرة، بما في ذلك تشنج في الرقبة يسبب دوران الرأس إلى جانب واحد.
- مشاكل في المشي.
- ضيق التنفّس.
- التهاب الكبد أو مشكلة في الكبد تسبب اصفرار الجلد أو العينين (يرقان).
- تزايد في حساسيّة الجلد لضوء الشمس.
- حكّة.
- فرط التعرّق.
- تغيرات في دورات الحيض (الدورات الشهرية)، مثل: غياب الدورات الشهرية أو دورات طويلة، غزيرة ومؤلمة.
- إنتاج لحليب الأم بشكل غير متوقع.
- ألم أو انزعاج في الثدييين.
- حرارة جسم مرتفعة.
- انتفاخ ينجم عن تراكم السائل في الجسم.

أعراض جانبيّة نادرة (rare) - أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10,000:
- مستوى مرتفع للهرمون پرولاكتين في الدم.
- تضيق المسالك التنفسية في الرئتين مما يسبب صعوبات في التنفس.
- صعوبة أو عدم القدرة على فتح الفم.
- مشاكل في الوظيفة الجنسية.

كذلك، تم التبليغ عن الأعراض الجانبية الواردة فيما يلي، لكن شيوعها الدقيق غير معلوم:
- مستوى مرتفع للهرمون المضاد لإدرار البول في الدم (متلازمة مرتبطة بخلل في إفراز الهرمون المضاد لإدرار البول).
- مستوى منخفض للسكّر في الدم.
- انتفاخ حول الحنجرة أو تشنج لحظي للأوتار الصوتية مما قد يسبب صعوبات في الكلام (النطق) أو التنفس.
- فُصور الكبد الفجائي.
- تدنٍّ في جريان السائل الصفراوي في القناة الصفراوية.
- تكوّن قشرة على الجلد أو تقشر الجلد.
- التهاب في الأوعية الدموية الصغيرة، يؤدي إلى ظهور طفح جلدي مصحوب بنتوءات حمراء أو بنقصية صغيرة.
- انحلال النسيج العضلي (انحلال العضل).
- انتصاب متواصل مصحوب بالألم في القضيب.
- تضخّم الثديين لدى الرجال.
- حرارة جسم منخفضة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبيّة، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبيّ لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبيّة
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبيّة لوزارة الصحّة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبيّة عقب العلاج الدوائيّ" الموجود في الصفحة الرئيسيّة لموقع وزارة الصحّة (www.health.gov.il) والذي بوجّه إلى الاستمارة المتّصلة للتبليغ عن أعراض جانبيّة، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّمَ! هذا الدواء، وأيّ دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضّع ومجال رؤيتهم، وبذلك سنمنع التسمّم. لا تسبّب التقيّؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحيّة (EXP) المدوّن على العبوّة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحيّة إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
يجب التخزين في درجة حرارة أقلّ من 25 درجة مئويّة. يجب التخزين في العبوّة الأصليّة.

6. معلومات إضافيّة:

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على:

هالوبير 0.5 ملغ أقراص
Lactose, Maize starch, Povidone, Magnesium stearate.

هالوبير 5 ملغ أقراص
Lactose, Maize starch, Povidone, Magnesium stearate, Sunset Yellow FDC Yellow no.6.

هالوبير 10 ملغ أقراص
Lactose, Maize starch, Povidone, Magnesium stearate, Quinoline Yellow 70 E 104, Indigo Carmine.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوّة:
هالوبير 0.5 ملغ: قرص باللون الأبيض الضارب إلى الصفرة، مستدير ومسطح، ذو خط للشطر على كلا الجانبين.
هالوبير 5 ملغ: قرص باللون الزرنقالي، مستدير ومسطح، ذو خط للشطر على كلا الجانبين.
هالوبير 10 ملغ: قرص باللون الأخضر الفاتح، مستدير ومسطح، ذو خط للشطر على كلا الجانبين.
تمت تعبئة الأقراص في لويحات ألومينيوم، 10 أقراص في اللويحة، في عبوة كرتونية تحتوي على 20، 30 أو 60 قرصًا (هالوبير 0.5 ملغ) أو 20، 30، 60 أو 100 قرص (هالوبير 5، 10 ملغ). قد لا تُسوّق جميع أحجام العبوّات.

صاحب الامتياز/ المصنّع وعنوانه: ك ص ط للصناعات الكيميائيّة م.ض.، هاكيما 3، كريات ملاخي.
تمّ تحرير هذه النشرة في 07/2021 وفقًا لإرشادات وزارة الصحّة.
أرقام تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحّة:
هالوبير 0.5 ملغ: 1159325918، هالوبير 5 ملغ: 1169525917، هالوبير 10 ملغ: 1159225916
من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

LFL 226 02/22