

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד

הלופר 0.5 מ"ג טבליות

הלופר 5 מ"ג טבליות

הלופר 10 מ"ג טבליות

כל טבליה של הלופר 0.5 מ"ג מכילה 0.5 מ"ג הלופרידול

כל טבליה של הלופר 5 מ"ג מכילה:

5 מ"ג הלופרידול

כל טבליה של הלופר 10 מ"ג מכילה:

10 מ"ג הלופרידול 10 mg Haloperidol

לחומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו טרם שתשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל החוקר.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלת, אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיעדת התרופה?

פעילות רפואית: לטיפול בתסמינים של הפרעות פסיכוטיות, המשפיעות על הדרך שבה אתה חושב, מרגיש או מתנהג. הפרעות אלו עלולות לגרום לך להרגיש מבולבל; לראות, לשמוע או להרגיש דברים שאינם אמיתיים (הזיות); להאמין בדברים שאינם נכונים (דלזיות); להרגיש חשדנות קיצונית (פרוניה); להרגיש התרגשות יתר, עצבנות, התלהבות או היפר אקטיביות; להרגיש תוקפני או אלים.

לטיפול בסטימפוטיום של מחלת טורט (Tourette).

2. למה תרופתית: אנטי פסיכטיים ממשפחת הבוטירפוננים.

✖ אין להשתמש בתרופה אם:

- הך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- הך פחות מודע לדברים המורחשים סביבך או שהתגובות שלך נעשות איטיות באופן לא רגיל.
- הך סובל מפרקינסון.
- הך סובל מdemy dementia (').
- הך סובל ממחלה עصبית שנויית על המוח – Progressive Supranuclear Palsy (PSP).
- הך מרגיש נמנמם וכבדות כתוצאה ממחלה או משימוש בתרופות או עקב צריכת אלכוהול.
- הך סובל מהפרעה לבבית המכונה 'תסמונת מקטע QT מוארך' או מכל בעיה אחרת בקצב הלב המדגימה ממצא חריג בתרשים ECG (אלקטרוקרדיוגרמה).
- הך סובל או סבלת בעבר ממחלות לב הגורמות להפרעות קצב או דופק איטי במיוחד.
- הך נטול תרופות להפרעות בקצב הלב.
- הך סובל מאי ספיקת לב או היה לך התקף לב לאחרונה.
- הך סובל מרמה נמוכה של אשלגן בדם אשר לא טופלה.
- הך סובל מפגיעה בחלק מהמוח הנקרא הגנגליון הבדלי.
- הך נטול את אחת התרופות המופיעות ברשימת התרופות שאין ליטול ביחד עם הלופר (ראה סעיף "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").
- אין להשתמש בתרופה אם אחד מהרשומים מעלה נוגע לך. אם אינך בטוח, היוועץ ברופא לפני לקיחת התרופה.

⊟ **אזהרות מיוחדות בתרופה לשימוש בתרופה:**

לפני הטיפול בהלופר, ספר לרופא אם:

הך רגיש למוזן כלשהו או לתרופה כלשהי.

⊟ **תופעות לוואי חמורות**

הלופר עלולה לגרום לבעיות בלב, לבעיות בשליטה על תנועות הגוף או הגפיים ותופעות לוואי חמורה הנקראת 'תסמונת נירולופטית ממאירה'. היא יכולה גם לגרום לתגובות אלרגיות חמורות ולקרישי דם. עליך להיות מודע לתופעות הלוואי החמורות בעת שאתה נוטל הלופר מכיוון שאתה עשוי להזדקק לטיפול רפואי דחוף (ראה 'תופעות לוואי חמורות' בסעיף 4).

⊟ **אנשים קשישים ואנשים עם דמנציה**

דוחזה עליה טקנה במקרי מוות ושכץ באנשים קשישים הלוקים בדמנציה (שיטיו) הנוטלים תרופות אנטי-פסיכיות. חולים קשישים עם דמנציה הנוטלים הלופר על מנת לשלוט על התנהגותם, עלולים להיות בסכין גבוה יותר למוות בהשוואה לחולים לא מטופלים.

⊟ **אין להשתמש בתרופה מבלי היוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הך סובל או סבלת בעבר:**

- מיליקו בתפקוד הלב ולא/ כלי הדם – קצב פעימות לב איטי, מחלת לב או היסטוריה במשפחתו של בעיות לב, אם משהו מבני משפחתך הקרובה מת באופן פתאומי מבעיות לב או אם הך נוטל תרופות לטיפול במחלת לב.
- מלחץ דם נמוך או חש סחרחורת בעת מעבר למצב ישיבה או עמידה.
- מוחسر איזון של אלקטרוליטים – במיוחד מרמה נמוכה של אשלגן או של מגנזיום (או אלקטרוליט אחר) בדם.
- מבעיות בכליות, בכבד או בבלוטת התריס (היפרתירואידיזם).
- מאפילפסיה או אי פעם סבלת מפרכוסים (עוויתות).
- מדימום במוח או אם הרופא שלך אמר לך שהסכני שלך ללקות בשבץ גדול משל אנשים אחרים.
- מגידולים שפירים של בלוטת האדרנל (פאורוקומיטומה).
- מרמה גבוהה של ההורמון פרולקטין בדם או מסרטן העלול להיגרם על-ידי רמות גבוהות של פרולקטין (כגון סרטן שד).
- אם אינך אול כראוי במשך תקופה ארוכה.
- מקרישי דם או שיש לך היסטוריה משפחתית של קרישי דם.
- קרישי דם בריאות וברגליים ודוחו בחולים הנוטלים תרופות אנטי פסיכיות (כדוגמת תרופת זו).

- מדימואן או הפרעה דו-קוטבית והך ממחיל להרגיש מדוכא.
- ייתכן כי תזדקק למעקב צמוד יותר וייתכן שיהיה צורך לשנות את המינון של הלופר שהך נוטל.
- אם אינך בטוח אם אתה אחד המצבים המפורטים לעיל רלוונטי לגביך, התייעץ עם הרופא שלך ועם הרופך טרם נטילת הלופר.
- ⊟ **ילדים מתחת לגיל 6 שנים**

אין להשתמש בהלופר בילדים מתחת לגיל 6 שנים, זאת מאחר שהתרופה לא נחקרה כראוי בקבוצת גיל זו.

⊟ **בדיקות ומעקב**

ייתכן שהרופא שלך יפנה אותך לבדיקת אלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג.) לפני או במהלך הטיפול בהלופר, לבדיקת הפעילות החשמלית של ליבך. כמו כן, ייתכן שהרופא שלך יפנה אותך לבדיקת דם לבדיקת רמות האשלגן (א) והמגנזיום (א) ואלקטרוליט אחר) במהלך הטיפול בהלופר.

⊟ **אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרנה, תרופות אחרות כולל תרופות

ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוחך.

אין ליטול הלופר אם אתה נוטל תרופות מסוימות לטיפול:

- בעיות קצב לב (כגון: אמיואדרון, דופטיליד, דיזופירמיד, דרונדרון, איבוטיליד, קווינידין, פרוקניאמיד, סנטול).
- בדימואן (כגון: ציטאלופרם או אסציטאלופרם).
- בפסיכזות (כגון: פלופנאזין, לובומפרמאזין, פרפנאזין, פימוזיד, פרוכלורפרזין, פרומאזין, סרטינדול, תיורידאזין, טריפלאופרזין, טריפלופרמזין וזיפרסידין).
- בדיהומים בקטריאליים (כגון: אזיתרומיצין, קלריתרומיצין, אריתרומיצין, לבולפולקסצין, מוקסיפלוקסאצין וטליטרומוצין).
- בדיהומים פטרייתיים (כגון: פנטמידין).
- במלריה (כגון: הלופנטרין).
- בחבילות והקאות (כגון: דולסטרון).
- בסרטן (כגון: טורמיפן ונדטניב).

כמו כן, דווח לרופא אם אתה נוטל בפרידיל (טיפול בכאב בחזה או להורדת לחץ דם) או מתדון (לשיכון כאבים או לטיפול בהתמכרות לסמים).

תרופות אלו עלולות להגביר את הסכין לבעיות לב ולכן עליך להתייעץ עם הרופא אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו ואל ליטול הלופר (ראה סעיף "אין להשתמש בתרופה אם").

ייתכן שיידרש מעקב מיוחד אם אתה נוטל ליטיום והלופר בו זמנית.

יש צורך ביוטר מיוחד במידה ואתה נוטל את שתי התרופות יחד. יש לדווח לרופא מיידית ולהפסיק ליטול את שתי התרופות בו זמנית במידה ואתה סובל מ: חום לא מוסבר או תנועות לא נשלטות, בלבול, חוסר התמאאות, כאב ראש, בעיות בשיון משקל ותחושת ישנוניות. כל אלה הינם סימנים למצב חמור.

תרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן הפעולה של הלופר או להגביר את הסיכון לבעיות לב. דווח לרופא אם אתה נוטל:

- אזולואזולאם או בוספירון (לטיפול בחרדה).
- דולקוטיין, פלואקטיין, פלובוקאמין, נפזודון, פארוקוטיין, סרטרג'ין, St. John's Wort (היפרקום פרפורטום) או ונלפאקסין (לטיפול בדיכאון).
- בופרופין (לטיפול בדיכאון או לטיפול בהפסקת עישון).
- קרובקזין, פנובארביטאל או פניטואין (לטיפול באפילפסיה).
- ריפאמפיצין (לטיפול בדיהומים בקטריאליים).
- איטראקונאזול, פוסאקונאזול או ווריקונאזול (לטיפול בדיהומים פטרייתיים).
- טבליות קטוקונאזול (לטיפול בתסמונת קושינג).
- אינדינאביר, ריטונאביר או סקוויונאביר (לטיפול בנגיף הכשל החיסוני האנושי, HIV).
- לורפרמאזין או פרומתאזין (לטיפול בחבילות והקאות).
- וראפאמיל (לטיפול ביתר לחץ דם או בבעיות לב).

כמו כן, דווח לרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות להורדת לחץ דם, כגון תרופות משתנות.

ייתכן כי הרופא יצטרך לשנות את המינון של הלופר שאתה נוטל אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו.

הלופר יכול להשפיע על אופן הפעולה של תרופות מהסוגים שלהלן. ספר לרופא שלך אם אתה נוטל תרופות לצורך:

- הרגעה או סיוע בהפרעות שינה (תרופות הרגעה).
- טיפול בכאב (משככי כאבים חזקים).
- טיפול בדיכאון (נוגדי דיכאון טריציקליים).
- הורדת לחץ דם (כגון: גואנטידין ומתילדופה).
- טיפול בתגובות אלרגיות חמורות (אדרנלין).
- טיפול במרציות).
- טיפול בפרקינסון (כגון: לבודופה).
- דילול דם (פנידינן).

התייעץ עם הרופא טרם נטילת הלופר אם אתה נוטל אחת מתרופות אלו.

⊟ שימוש בתרופה ומזון

ייתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

⊟ **שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**

שתיית אלכוהול במהלך נטילת הלופר עלולה לגרום לישנוניות ולהפחתת עירנות. משמעות הדבר היא כי עליך לנהוג משנה זהירות לגבי כמות האלכוהול שאתה שותה. התייעץ עם הרופא לגבי שתיית אלכוהול בעת נטילת הלופר ודווח לרופא על ממות האלכוהול שאתה שותה.

⊟ **הריון, הנקה ופוריות**

הריון – אם הך בהריון או מתכננת להרות, פני לרופא אשר יחליט האם תוכלי להשתמש בהלופר. הרופא שלך עשוי ליעץ לך לא ליטול הלופר במהלך ההריון.

רעד, נוקשות או חולשת שרירים; ישנוניות או אי שקט; קשיי נשימה או קושי בהאכלה, עלולים להתרחש ביילודים שאינם נטלה הלופר במהלך השליש האחרון של ההריון.

הלופר יכולה לעבור דרך השליה ויכולה להיות קשורה עם שינויים מוטורים או התנהגותיים בתינוקות שנולדו לאימהות שקיבלו הלופר במהלך השליש האחרון של ההריון. שכוחות המדיויקת של בעיות אלו אינה ידועה. אם נטלת הלופר במהלך ההריון ותינוקך מפתח אחת מתופעות לוואי אלו, פני לרופא.

הנקה – התייעצי עם הרופא אם את מניקה או מתכננת להניק, זאת מאחר ששמויות קטנות של התרופה עלולות לעבור לחלב האם ומשם לתינוק.

הרופא שלך ידון עמך בסיכונים וביתרונות של הנקה כאשר הך נוטלת הלופר.

פוריות – הלופר עלולה להגביר את הרמות של ההורמון המכונה פרולקטיין, אשר עלול להשפיע על הפריון בגברים ובנשים. התייעץ עם הרופא אם יש לך שאלות בעניין זה.

⊟ **ההיגה ושימוש במכוונת**

הלופר עלולה להשפיע על יכולתך לנהוג ולהשתמש בכלים ובמכוונת. תופעות לוואי, כגון תחושת ישנוניות, עלולות לפגוע בעירנותך, במיוחד בתחילת הטיפול או לאחר מתן מינון גבוה. אין לנהוג או להפעיל מכוונת מבלי להתייעץ עם הרופא שלך.

באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

⊟ **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

הלופר טבליות מכילות לקטוז. אם הרופא אמר לך כי יש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, התייעץ עמו טרם תחילת השימוש בטבליות הלופר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוחך אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו ע"י הרופא בלבד.

הרופא יאמר לך כמה הלופר לייטול ולמשך כמה זמן. כמו כן, הרופא יאמר לך האם ליטול הלופר פעם אחת ביום או מספר פעמים ביום. ייתכן כי יחלוף פרק זמן מסוים עד אשר תחוש בהשפעתה המלאה של התרופה. הרופא בדרך כלל תחיל מינון נמוך ולאחר מכן יתאים את המינון למינון המתאים לך. חשוב מאוד שיטיל את הכמות הנכונה.

- המינון של הלופר שיינתן לך יהיה תלוי:
- ביגלך
- היעדר הבעת פנים תקינה, הבעה אשר לעיתים נראית כמו מסיכה.
- באם יש לך בעיות בכליות או בכבד
- על תרופות נוספות אותן אתה נוטל

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה – הלופר מיעד לנטילה דרך הפה. יש ליטול את התרופה עם או בלי מזון.

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
כתשעה/חציצה/ליטוח: אין ללעוס, הטבליה מיעדת לבלעה. במידת הצורך ניתן לחצות, לתכוש או לרסק את הטבליה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע מישהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. בעת לקיחת מינון יתר עלול להופיע אחד או יותר מהסימנים הבאים: ירידה במצב העירנות, רעד חריף או נוקשות יתר של השרירים.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול הלופר בזמן המיעוד, עליך ליטול את המנה הבאה כרגיל. לאחר מכן המשך ליטול את התרופה על פי הנחיות הרופא. אין ליטול מנה כפולה.

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

ייתכן זמן מה לפני שתרגיש את מלוא השפעת התרופה. יש להפסיק את השימוש בתרופה רק אם הרופא מאשר לך. עליך להפסיק את נטילת הלופר בהדרגה, אלא אם כן הרופא הורה לך אחרת. הפסקת טיפול פתאומית עלולה לגרום לתופעות כגון: בחילות, הקאות וקשיי שינה.

יש להתמיד בטיפול על פי הוראות הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שהך נוטל

תרופה. הרכיב משקפים אם הך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוחך.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בהלופר עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. את תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

שים לב לתופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמופיעות

דווח לרופא באופן מיידי אם אתה מבחין או חושד בקיומה של אחת מהתופעות שלהלן. ייתכן כי תזדקק לטיפול רפואי דחוף.

בעיות לב:

- הפרעה בקצב הלב – תופעה זו מפסיקה את פעולתו התקינה של הלב ועלולה לגרום לאיבוד הכרה.
- קצב לב מהיר באופן חריג.
- פעימות לב נוספות.

בעיות לב אינן שכיחות בקרב אנשים הנוטלים הלופר (עלולות להופיע בעד 1 מתוך 100 משתמשים). מקרי מוות פתאומי התרחשו במטופלים שנטלו תרופה זו, אך שכוחות המדויקת של מקרי מוות אלה אינה ידועה. כמו כן, דום לב (הלב מפסיק לפעום) התרחש באנשים שנטלו תרופות אנטי-פסיכיות.

⊟ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

הלופר טבליות מכילות לקטוז. אם הרופא אמר לך כי יש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, התייעץ עמו טרם תחילת השימוש בטבליות הלופר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוחך אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו ע"י הרופא בלבד.

- הרופא יאמר לך כמה הלופר לייטול ולמשך כמה זמן. כמו כן, הרופא יאמר לך האם ליטול הלופר פעם אחת ביום או מספר פעמים ביום. ייתכן כי יחלוף פרק זמן מסוים עד אשר תחוש בהשפעתה המלאה של התרופה. הרופא בדרך כלל תחיל מינון נמוך ולאחר מכן יתאים את המינון למינון המתאים לך. חשוב מאוד שיטיל את הכמות הנכונה.
- המינון של הלופר שיינתן לך יהיה תלוי:
- ביגלך
- היעדר הבעת פנים תקינה, הבעה אשר לעיתים נראית כמו מסיכה.
- באם יש לך בעיות בכליות או בכבד
- על תרופות נוספות אותן אתה נוטל

אין לעבור על המנה המומלצת.
צורת הנטילה – הלופר מיעד לנטילה דרך הפה. יש ליטול את התרופה עם או בלי מזון.
יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
כתשעה/חציצה/ליטוח: אין ללעוס, הטבליה מיעדת לבלעה. במידת הצורך ניתן לחצות, לתכוש או לרסק את הטבליה.

- היעדר הבעת פנים תקינה, הבעה אשר לעיתים נראית כמו מסיכה.
- באם יש לך בעיות בכליות או בכבד
- על תרופות נוספות אותן אתה נוטל

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה – הלופר מיעד לנטילה דרך הפה. יש ליטול את התרופה עם או בלי מזון.

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.
כתשעה/חציצה/ליטוח: אין ללעוס, הטבליה מיעדת לבלעה. במידת הצורך ניתן לחצות, לתכוש או לרסק את הטבליה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע מישהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. בעת לקיחת מינון יתר עלול להופיע אחד או יותר מהסימנים הבאים: ירידה במצב העירנות, רעד חריף או נוקשות יתר של השרירים.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול הלופר בזמן המיעוד, עליך ליטול את המנה הבאה כרגיל. לאחר מכן המשך ליטול את התרופה על פי הנחיות הרופא. אין ליטול מנה כפולה.

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

ייתכן זמן מה לפני שתרגיש את מלוא השפעת התרופה. יש להפסיק את השימוש בתרופה רק אם הרופא מאשר לך. עליך להפסיק את נטילת הלופר בהדרגה, אלא אם כן הרופא הורה לך אחרת. הפסקת טיפול פתאומית עלולה לגרום לתופעות כגון: בחילות, הקאות וקשיי שינה.

יש להתמיד בטיפול על פי הוראות הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שהך נוטל

תרופה. הרכיב משקפים אם הך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוחך.

תופעות לוואי נוספות

דווח לרופא אם אתה מבחין או חושד בקיומה של אחת מתופעות הלוואי שלהלן.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמופיעות

בייחוד ממשתמש אחד מעשרה:

תחושת אי שקט • קשיי שינה • כאבי ראש
תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100:

- הפרעה נפשית חמורה כגון אמונה בדברים שאינם אמיתיים (מחשבות שווא) או ראייה,
- רגשה, שמעה או הרחה של דברים שאינם קיימים (הזיות).
- דיכאון.
- מתח שרירים חריג.
- תחושת סחרחורת, לרבות בעת מעבר למצב ישיבה או עמידה.
- תחושת ישנוניות.
- תנועת עיניים לפני מעלה או תנועת עינים מהירות כולתי נשלטות. בעיות ראייה כגון טשטוש ראייה.

⊟ תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות

ב-10 משתמשים מתוך 1,000:

- השפעות על תאי הדם – מספר נמוך של כל תאי הדם, לרבות הגורמת להצהבת העור או העיניים (צהבת).
- רשימות מוגברת של העור לאור השמש.
- גרד.
- אובדן החשק המיני או חשק מיני מופחת.
- פרוכוסים (עוויתות).
- נוקשות בשרירים ובמפרקים.
- עוויתות שרירים, תנועות תוך גרימת כאב בחזה וקשיי נשימה. קרישי דם עלולים להיות חמורים מאוד, לכן דווח לרופא באופן מיידי אם אתה מבחין באחת מבעיות אלו, דווח לרופא באופן מיידי אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות שהמוצט לעיל.
- עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
- גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
- רמה גבוהה של הורמון אנטי-דיורטי בדם (תסמונת הכרוכה בהפרשה לקויה של הור