

התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

קרודידילול טבע 6.25 מ"ג

טבליות

כל טבליה מכילה:

קרודידילול 6.25 מ"ג

Carvedilol 6.25 mg

קרודידילול טבע 12.5 מ"ג

טבליות

כל טבליה מכילה:

קרודידילול 12.5 מ"ג

Carvedilol 12.5 mg

למיעד על מרכיבים בלתי פעילים וארגניים,
ראה סעיף 6 – "מידע נוסף" וסעיף 2 – "מידע

חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".
קרא בעיון את העلون עד סופו בתרום תשמש
בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתני על
התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל
הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו נשמה עבורה. אל תעביר אותה
לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם
נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

קרודידילול טבע מיועדת לטיפול באיספיקת לב.
קובוצה טיפולית:

חוסמי קולטנים מסווג אalfa-1 ובטא.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל
(קרודידילול) או לכל אחד מהרכיבים
הנושאים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף
6).

• אתה סובל או שבסבל בעבר מצפצפים
כתוצאה מאסתמה.

• אתה סובל מאיספיקת לב חמורה (NEY) –
בידיים, בקרסולים או בכפות הרגליים)
המטופפת על ידי תרופות הנינטות דרך
הוריד.

• אתה סובל מביעות בכבד.
אם אתה סובל מבעיות לב (לדוגמאות: חסם לב

טבע אינה מתאימה לטיפול בחקל מהחולמים
עם בעיות לב מסוימות.

• אתה סובל מעתה לחץ דם חמור.
אם אתה סובל מתקחת את התרופה. אם אין בטוח,
היוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת התרופה.

ازירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בקרודידילול טבע, ספר לרופא
אם:

• יש לך בעיות עם הריאות שלך.

• אתה סובל מבעיות בכליות.
אתה סובל מבעיות בכליז (רמות סוכר גבוהות בדם).

• אתה מרוכיב עדשות מגע.
אתה סובל מבעיות בכליז דם (מחלת כליז
היקפית).

• אתה סובל או שבסבל בעבר מבעיות בבלוטת
התריס (тирואיד).
אתה סובל מפרעאות בזירמת דם לאצבעות
חומרה (לדוגמא: נפיחות פתאומית האגרומת
לקשיי נשימה או בליעה, נפיחות בידיים,
בקפות הרגליים וברсолילים, או פריחה
חומרה).

• אתה סובל מאלרגיה ועובר טיפול לאלרגן
דה-SENSITIZATION (להפחחת ההיגיון של גוף).

• אתה סובל מהפרעות בזירמת דם לאצבעות
ידיים והרגליים (תסמונת ריני).

• אתה סובל או שבסבל בעבר מבעיות נטילת חסמי
קולטנים מסווג בטאי.

• אתה סובל מאנגינה (כאב בחזה) מסווג
פרינימטול.

• אתה סובל מגידול על אחת מבולטות יותרת
הכליה (פאקורומיצומה).

• אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.
אם אחד או יותר ממצביעים אלה נוכנים לך או
אם אין בטוח, היוועץ ברופא או ברוקח לפני
נטילת התרופה.

אם אתה עומד לעבור ניתוח, דוחה לרופא שאתה
נותל קרודידילול טבע. חומרה הרדמה מסוימת
עלולים להוועץ את החם שלך והוא עלול
 להיות נורם מדי.

3. אינטראקציות/תגובה בין תרופות:
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופה
אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי
תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

קרודידילול טבע עלולה להשפיע על פעילותם של
תרופות מסוימות. כמו כן, תרופות מסוימות
עלולות להשפיע על פעילות קרודידילול טבע.

במיוחד ספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקח:
תרופות להוועת לחץ דם וללב כגון: מנתנים,
חוסמי תעולות סיידן (כגון דילטיאזם או
ורפאפמייל), תרופות הנינטות על מנת
לשנות על דופק לא סיידן (למשל דיגוקסין
או אמידודרין).

תרופות מזרקנות מאגרי קטולאמין, לדוגמא:
טרופין ומעצבי מונוamin אוקסידאז (MAOIs),
כגון איזוקרבוקסיד ופנליין (טיפול בדיכאון).
פלואוקסטין ופאראוקסטין (טיפול בדיכאון).
תרופות לטיפול בסוכרת כגון איסוטולין או
מטפרומין.

קלוניין (טיפול בחץ דם גבוה, מיגרנה
וטיפול בהסמקה flushing) בגיל המעבר
בנשים).

ריאפאפמיין (טיפול בזיהומים).
ציקלוספורין (לديבי המערכות החיסוניות לאחר
השתלות).

נוודי דלקת שאים סטרויאדים (NSAIDs),
כגון אספירין, אינידומטצין או איבופרופין).

מרחיבי סימפונות אגוניסטים לקלוטני בטאי
(טיפול בהצרות כליז נשימה וצפצופים
בעקבות אסתמה או מחלות ריאה אחרות
(כגון סלבטומול וטורבוטאלין סולפט)).

שימוש בתרופה ומזון:
יש ליטול את התרופה עם הארוחה.

4. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

נ:right;גיה ושימוש במכוון:
השימוש בתרופה זו עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בהתחלה או בשינוי הטיפול. אם זה
קרה לך, אין לנוהג, להשתמש בכלים או
להפעל מכוונות. ספר לרופא ש郎ר אם אתה
מבחן בהזנתו נסודות או מוגבר לאנו
על הניגזה, שימוש בכלים או מכוונות כשר אתה
נותל קרודידילול טבע.

5. מיזוג בתרופה ומזון:
מיזוג קרודידילול טבע מכילה עם מינון
מרחיבי סימפונות אגוניסטים לקלוטני בטאי
(טיפול בהצרות כליז נשימה וצפצופים
בעקבות אסתמה או מחלות ריאה אחרות
(כגון סלבטומול וטורבוטאלין סולפט)).

שימוש בתרופה ומזון:
יש ליטול את התרופה עם הארוחה.

6. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

7. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

8. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

9. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

10. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

11. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

12. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

13. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

14. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

15. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

16. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

17. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

18. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

19. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

20. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

21. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

22. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

23. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

24. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

25. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

26. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

27. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

28. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

29. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

30. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

31. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

32. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.

הירין והנקה:
אין ליטול קרודידילול טבע אם את הירין, מנסה
להיכנס להירין או מניקה אלא בהוראת רופא.

33. שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
השימוש בתרופה עלול לגרום לשחרחות
במיוחד בשילוב עם אלכוהול.