

מרץ 2022

משרד ראשי
רח' החרש 4
הוד השרון 45240
ת.ד. 10 ת"א 61000

Head Office
4 Haharash St.
Hod-Hasharon 45240
P.O.Box 10 Tel-Aviv 61000
Israel

Tel. +972-9-7626333
Fax. +972-9-7626300

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: עדכון עלון לרופא של ולטסה 8.4 גר', ולטסה 16.8 גר'

VELTASSA 8.4 G, VELTASSA 16.8 G

אנו מבקשים להודיעכם כי העלון לרופא והעלון לצרכן של התכשיר שבנדון עודכנו בסעיף אופן המתן.

ההתוויה המאושרת:

Veltassa is indicated for the treatment of hyperkalaemia in adults.

הרכב וחוזק חומר פעיל:

PATROMER (AS SORBITEX CALCIUM) 8.4 G, 16.8 G

בפירוט שלהלן מובא המידע בו בוצעו שינויים מהותיים בלבד. תוספת טקסט או טקסט בעל שינוי משמעותי מסומן בצבע. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

העדכונים בעלון לצרכן נעשו בסעיפים הבאים:

אופן המתן

- יש לערבב את ולטסה עם **מים-הנוזלים והמזונות הרכים המפורטים מטה** ולבחוש היטב באופן הבא:
- יש להכין כ-40 מ"ל **מים-מהנוזל או מהמזון הרך** (3 כפות) בכוס/קערה.
 - יש להוסיף את המספר הדרוש של שקיות ולטסה ולבחוש.
 - יש להוסיף עוד כ-40 מ"ל **מים-נוזל או מזון רך** (3 כפות) ולבחוש היטב. האבקה אינה מתמוססת אולם נוצר תרחיף, שניתן **שזיהיה גרגרי**.
 - ניתן להוסיף עוד **מים-נוזל או מזון רך** לתערובת כדי להקל על בליעת התרופה.
 - יש לשתות **או לאכול** את התערובת תוך שעה מהכנתה. אם נותרת אבקה בכוס/קערה לאחר השתייה **או האכילה**, יש להוסיף **מים-נוזל או מזון רך**, לבחוש ולשתות/לאכול מיד. ייתכן שתצטרך לעשות זאת פעם נוספת כדי לוודא **ששתית-שסיימת** את כל האבקה.

ניתן להשתמש **במיץ תפוחים או מיץ חמוציות- במקום-מים או בנוזלים או במזונות הרכים הבאים להכנת התערובת באופן המתואר מעלה: מיץ תפוחים, מיץ חמוציות, מיץ אננס, מיץ תפוזים, מיץ ענבים, מיץ אגסים, נקטר משמש, נקטר אפרסק, יוגורט, חלב, מסמיר, רוטב תפוחים, פודינג וניל או שוקולד. אין להשתמש בנוזלים אחרים מכיוון שיתכן והם מכילים כמויות גבוהות של אשלגן.**

כאשר משתמשים בנוזלים או במזונות רכים שכאלה, יש לעקוב אחר ההמלצות התזונתיות לצריכת אשלגן. בדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח.

יש לשתות רק כמויות מדודות (פחות מ-400 מ"ל ליום) של מיץ חמוציות שכן הוא יכול להשפיע על תרופות אחרות.



העדכונים בעלון לרופא נעשו בסעיפים הבאים:

Method of administration

The following liquids or soft foods can be used instead of water to prepare the mixture by following the same steps as described above: apple juice, cranberry juice, pineapple juice, orange juice, grape juice, pear juice, apricot nectar, peach nectar, yoghurt, milk, thickener (for example: cornstarch), apple sauce, vanilla and chocolate pudding.

The potassium content of liquids or soft foods used to prepare the mixture should be considered as part of the dietary recommendations on potassium intake for each individual patient. Apple juice or cranberry juice can be used instead of water to prepare the mixture. Other liquids should be avoided as they may contain high amounts of potassium.

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות
http://www.health.gov.il
ניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לחברת כצט בע"מ, רח' החרש 4 הוד השרון, 09-7626323

בברכה,
אלון אופיר
רוקח ממונה
כצט בע"מ