نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يسوّق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

ركويپ مودوتاب 2 ملغ
ركويپ مودوتاب 4 ملغ
ركويپ مودوتاب 8 ملغ

أقراص مطلية لتحرير مطول تحتوي على روپينيرول (على شكل هيدروكلوريد) ropinirole (as hydrochloride)
2 ملغ، 4 ملغ، 8 ملغ.
لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، أنظر البند 2 – "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والبند 6 – "معلومات إضافية".
إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يُستطب بـ ركويپ مودوتاب لعلاج مرض الپاركينسون ضمن الظروف التالية:
- علاج أولي كعلاج منفرد من أجل إعاقة العلاج بليڤودوپا.
- بالمشاركة مع ليڤودوپا، خلال المرض، عندما يضعف تأثير ليڤودوپا أو يصبح غير ثابت وحدوث تقلبات في التأثير العلاجي ("إنتهاء المقدار الدواء" أو تقلبات من نوع **"on-off"**).

المركب الفعال في ركويپ مودوتاب هو روپينيرول.
لدى الأشخاص المصابين بمرض الپاركينسون توجد نسب منخفضة من الدوپامين في مناطق معينة في الدماغ.
لروپينيرول تأثيرات تشبه تأثيرات الدوپامين الطبيعي، لذلك يساعد في التقليل من أعراض مرض الپاركينسون.
يمكنك تناول ركويپ مودوتاب كعلاج منفرد أو سوية مع إل – دوپا (أنظر البند 4 في هذه النشرة للمزيد من التفاصيل).
الفصيلة العلاجية: ناهض للدوپامين.
تؤثر ناهضات الدوپامين على الدماغ بطريقة مشابهة للمادة الطبيعية التي تسمى دوپامين.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:
- كنت حساسا (أليرجي) للمادة الفعالة روپينيرول أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصل في البند 6).
- كان لديك **مرض شديد في الكلى.**
- كان لديك **مرض في الكبد.**

← **إحك للطبيب** إذا كنت تعتقد بأن إحدى تلك الحالات تنطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء
قبل العلاج بـ ركويپ مودوتاب، أبلغ الطبيب إذا:
- كنت **في فترة الحمل** أو تظنين أنه من الجائز أنك حامل
- كنت في **فترة الإرضاع**
- كان **عمرك دون 18 سنة**
- كان لديك **مشكلة خطيرة في القلب**
- كان لديك **مشكلة نفسية** خطيرة
- كان لديك **دوافع و/أو سلوكيات غير عادية** (أنظر البند 4)
- لديك **عدم تحمل لسكريات معينة** (مثل لاكتوز)

إحك للطبيب إذا كنت تقاسي بعد التوقف أو تقليل العلاج بـ ركويپ مودوتاب، من أعراض **مثل إكتئاب، لامبالاة (apathy)، قلق، إنهاك، تعرق أو ألم (تدعى متلازمة الفطام عن ناهضات الدوپامين).** من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى ملاءمة المقدار الدوائي الخاص بك إذا إستمرت هذه الأعراض لأكثر من عدة أسابيع.
إحك للطبيب إذا كنت أنت أو عائلتك/معالِجك تلاحظون أنك تطور دوافع أو رغبة شديدة للتصرف بطرق غير مألوفة بالنسبة لك وبأنه لا يمكنك مقاومة دافع، حافز أو إغراء للقيام بنشاطات معينة التي يمكن أن تضر بك أو بالآخرين.
تسمى هذه إضطرابات سيطرة على الدوافع ويمكن أن تشمل سلوكيات مثل قمار مسبب للإدمان، الأكل المفرط أو تبذير المال بشكل مفرط، رغبة جنسية زائدة بشكل شاذ أو زيادة في الأفكار أو المشاعر الجنسية. من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى ملاءمة جرعتك الدوائية أو أن يوقف العلاج.

إحك للطبيب إذا كنت تلاحظ أنت أو عائلتك/معالجك أنك تطور نوبات من فرط النشاط، إبتهاج النفس أو عصبية (أعراض الهوس). قد تحدث هذه مع أو بدون أعراض اضطرابات السيطرة على الدوافع (أنظر أعلاه). قد يحتاج الطبيب إلى ملاءمة المقدار الدوائي الخاص بك أو أن يوقف العلاج.
← **إحكِ للطبيب** إذا كنت تعتقد أن إحدى تلك الحالات تنطبق عليك. من الجائز أن يقرر الطبيب أن ركويپ مودوتاب غير ملائم بالنسبة لك، أو أنك بحاجة لفحوصات إضافية خلال فترة تناوله.

خلال فترة تناول ركويپ مودوتاب
إحكِ للطبيب إذا لاحظت أنت أو عائلتك أنك تطور **سلوكيات غير طبيعية** أياً كانت (مثل **رغبة غير طبيعية في المقامرة** أو **دوافع** و/أو **سلوكيات جنسية متزايدة**) أثناء فترة تناولك ركويپ مودوتاب. من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى ملاءمة الجرعة أو أن يوقف العلاج.

التدخين
إحك للطبيب إذا كنت قد بدأت بالتدخين أو توقفت عن التدخين أثناء تناولك ركويپ مودوتاب. قد يحتاج الطبيب إلى ملاءمة الجرعة الدوائية من أجلك.

الأطفال والمراهقون
الدواء غير مخصص لأطفال ومراهقين دون عمر 18 سنة.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
تذكر أن تخبر الطبيب أو الصيدلي إذا بدأت في تناول دواء آخر أياً كان أثناء تناولك ركويپ مودوتاب.
يمكن أن تؤثر أدوية معينة على الطريقة التي يعمل بها ركويپ مودوتاب، أو أن تزيد إحتمال ظهور أعراض جانبية لديك. قد يؤثر ركويپ مودوتاب أيضا على طريقة عمل أدوية أخرى.
تلك تشمل:
- **فلوفوكسامين، دواء ضد الإكتئاب**
- أدوية **لمشاكل نفسية** أخرى، على سبيل المثال **سولپيريد**
- **علاج هورموني بديل** (Hormone Replacement Therapy)
- **ميتوكلوپراميد،** المستعمل لعلاج **الغثيان والحرقان**
- **سيميتيدين،** المستعمل **لعلاج قرحة المعدة**
- **المضادات الحيوية سيپروفلوكساسين** أو **إينوكساسين**
- **كل دواء** آخر **لعلاج مرض پاركينسون.**

← **إحك للطبيب أو للصيدلي** إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، واحد من تلك الأدوية.

ستحتاج إلى إجراء فحوصات دم إضافية إذا كنت تتناول هذه الأدوية مع ركويپ مودوتاب:
← مناهضات ڤيتامين K (المستعملة لتقليل تخثر الدم) مثل الوارفارين (كومادين).

إستعمال الدواء والطعام
يمكن تناول ركويپ مودوتاب مع أو بدون طعام، كيفما تفضل. نظراً لأن المأكولات الغنية بالدهون قد تزيد من كمية روپينيرول الذي يتم إمتصاصه في جسمك، يوصى بأن لا تتناول ركويپ مودوتاب سوية مع وجبة غنية بالدهون.

الحمل والإرضاع
لا يوصى بـ ركويپ مودوتاب إذا كنت في فترة الحمل، إلا إذا كان الطبيب يعتقد بأن الفائدة بالنسبة لك من تناول ركويپ مودوتاب أكبر من الخطورة على جنينك.
لا يوصى بـ ركويپ مودوتاب إذا كنت مرضعة، حيث أنه قد يؤثر على إنتاج الحليب لديك.
أخبري الطبيب بشكل فوري إذا كنت حاملا، إذا كنت تعتقدين أنك حامل، أو إذا كنت تخططين للحمل.
سوف ينصحك الطبيب إذا كنت ترضعين أو تخططين للقيام بذلك. من المرجح أن ينصحك الطبيب بالتوقف عن تناول ركويپ مودوتاب.

السياقة وإستعمال الماكينات
قد يسبب لك ركويپ مودوتاب الشعور بالنعاس.
قد يسبب للأشخاص الشعور بالنعاس الشديد وفي بعض الأحيان قد يسبب للأشخاص **النوم بشكل مفاجىء جداً من دون أي سابق إنذار.**
قد يؤدي ركويپ مودوتاب إلى هلوسة (رؤية، سماع أو الشعور بأشياء غير موجودة). إذا كنت تتأثر على هذا النحو من الدواء فلا تقم بالسياقة أو تشغل الماكينات.
إذا كنت عرضة لأن تتأثر: **لا تقد، لا تشغل ماكينات ولا** تضع نفسك بأي وضع قد يشكل فيه الشعور بالنعاس أو النوم خطراً عليك (أو على أشخاص آخرين) بتلقيك إصابة خطيرة أو موت. لا تشارك في هذه النشاطات حتى تكون متأكداً بأنك لا تتأثر.
← **إحك للطبيب** إذا كان هذا يسبب المشاكل لك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء
- تحتوي أقراص ركويپ مودوتاب على سكر يسمى **لاكتوز.** إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل تناول ركويپ مودوتاب.
- تحتوي أقراص ركويپ مودوتاب 4 ملغ على صبغة طعام تسمى **أصفر سنسيت sunset yellow** (E110)، التي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية.
- تحتوي أقراص ركويپ مودوتاب على أقل من 1 ملليمول من **الصوديوم** (23 ملغ) لكل قرص، مما يعني أنه يتم تعريفه على أنه دواء "خال من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال الدواء؟
يجب إستعمال المستحضر دائما حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.
لا تعط ركويپ مودوتاب للأطفال. ركويپ مودوتاب غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.
من الجائز أن تتلقى ركويپ مودوتاب كعلاج منفرد لأعراض مرض الپاركينسون، أو أنك قد تتلقى ركويپ مودوتاب سوية مع دواء آخر يسمى إل - دوپا (يسمى أيضاً ليڤودوپا).
وصفة طبية لـ ركويپ مودوتاب ومتابعة تقدمك يجب أن تتم من قبل طبيب مختص في علاج مرض الپاركينسون.
إذا كنت تتناول إل - دوپا، فمن الجائز أن تظهر لديك حركات لا إرادية (dyskinesias) عندما تبدأ بتناول ركويپ مودوتاب. إحك للطبيب إذا حصل ذلك، لأنه من الجائز أن يحتاج الطبيب لملاءمة الجرعة الدوائية للأدوية التي تتناولها.
إحك للطبيب إذا كنت أنت أو أفراد عائلتك تلاحظون أنك تطور سلوك غير عادي أياً كان (مثل دافع غير عادي للعب القمار أو زيادة الرغبة و/أو السلوك الجنسي) خلال تناولك ركويپ مودوتاب. من الجائز أن يحتاج الطبيب لملاءمة جرعتك الدوائية.
أقراص ركويپ مودوتاب مخصصة لتحرير الدواء لمدة 24 ساعة. إذا كانت لديك حالة يمر فيها الدواء عبر الجسم بسرعة كبيرة، على سبيل المثال إسهال، فمن المحتمل ألا تذوب الأقراص تماماً وقد لا تعمل بشكل صحيح. من الجائز أن ترى أقراصاً في البراز. إذا حدث هذا، أخبر الطبيب في أقرب وقت ممكن.

كم عليك أن تتناول من ركويپ مودوتاب؟
من الجائز أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى إيجاد الجرعة الدوائية الأفضل من ركويپ مودوتاب بالنسبة لك.
الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
الجرعة الدوائية الإبتدائية الإعتيادية من أقراص ركويپ مودوتاب هي 2 ملغ، مرة في اليوم، في الأسبوع الأول. من الجائز أن يزيد الطبيب الجرعة الدوائية لديك إلى 4 ملغ من أقراص ركويپ مودوتاب مرة في اليوم، بدءاً من الأسبوع الثاني من العلاج. بعد ذلك سوف يستمر الطبيب بملاءمة جرعة الدواء تدريجيا حتى تتناول الجرعة الدوائية الأكثر

ملاءمة بالنسبة لك. إذا كان عمرك فوق 65 سنة، قد يزيد طبيبك جرعتك الدوائية بوتيرة أبطأ. بعض الأشخاص يتناولون حتى 24 ملغ من أقراص ركويپ مودوتاب في كل يوم.
إذا شعرت في بداية العلاج بأعراض جانبية يصعب عليك مواجهتها، توجه إلى الطبيب.
لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
من الجائز أن تستغرق بضعة أسابيع حتى يؤثر ركويپ مودوتاب عليك.

طريقة التناول



يجب تناول ركويپ مودوتاب مرة في اليوم، في نفس الوقت كل يوم.
يجب بلع أقراص ركويپ مودوتاب كاملة، مع كأس ماء.
لا يجوز كسر، شطر، مضغ أو سحق الأقراص - إذا فعلت ذلك، هناك خطر بأن تتناول جرعة دوائية مفرطة، حيث أن الدواء سوف يتحرر في جسمك أسرع من اللازم.
أقراص ركويپ مودوتاب مخصصة لأن تحرر الدواء في جسمك على مدار 24 ساعة. إذا كانت الأقراص تعبر جسمك خلال فترة تقل عن 24 ساعة فمن الجائز ألاّ يتم تحرير كل الدواء. من الجائز أن تلاحظ الأقراص في برازك. إذا حصل ذلك، بلغ الطبيب.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر عليك
التوجه فوراً إلى الطبيب. إذا أمكن، أره علبة ركويپ مودوتاب.
الشخص الذي يتناول جرعة دوائية مفرطة من ركويپ مودوتاب، من الممكن أن يعاني من الأعراض التالية: غثيان، تقيؤ، دوار (الشعور بأن كل شيء يدور)، شعور بالنعاس، إرهاق نفسي أو جسدي، إغماء، هلوسة.
إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارىء في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء
إذا نسيت تناول ركويپ مودوتاب في الوقت المخصص، فلا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت المعتاد وإستشر الطبيب.
إذا لم تتناول ركويپ مودوتاب ليوم واحد أو أكثر، توجه إلى الطبيب لتتلقى إستشارة بخصوص كيفية البدء بتناول هذا الدواء ثانية.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء
لا تتوقف عن تناول ركويپ مودوتاب بدون تعليمات من الطبيب.
إستمر في تناول ركويپ مودوتاب على إمتداد كامل الفترة التي أوصاك بها الطبيب.
إذا توقفت عن تناول ركويپ مودوتاب فجأة، فقد تتفاقم بشكل سريع جداً أعراض مرض الپاركينسون لديك.
إن التوقف المفاجئ قد يؤدي إلى أن تتطور لديك حالة طبية تسمى متلازمة مضادات الذهان الخبيثة (neuroleptic malignant syndrome) التي قد تشكل خطراً كبيراً على الصحة. الأعراض تشمل: رنح (فقدان حركة العضلات)، تصلب العضلات، سخونة، ضغط دم غير متوازن، تسرع القلب (تزايد نظم القلب)، إرتباك، تدني مستوى الوعي (depressed level of consciousness، مثلاً سبات).
إذا كان عليك التوقف عن تناول ركويپ مودوتاب، سوف يقوم الطبيب بخفض جرعتك الدوائية بشكل تدريجي.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.
ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ركويپ مودوتاب قد يسبب أعراضا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيا منها.

هناك إحتمال أكبر لأن تظهر الأعراض الجانبية لـ ركويپ مودوتاب في بداية العلاج أو عند زيادة الجرعة الدوائية. عادة ما تكون معتدلة، ومن الجائز أن تصبح أقل إزعاجا بعد تناولك الجرعة الدوائية لفترة معينة. إذا كنت قلقاً من الأعراض الجانبية راجع الطبيب.

أعراض جانبية شائعة جداً
قد تظهر هذه لدى أكثر **من 1 من بين 10** أشخاص:
- إغماء
- شعور بالنعاس
- غثيان.

أعراض جانبية شائعة
قد تظهر هذه لدى **حتى 1 من بين 10** أشخاص:
- نوم بشكل مفاجئ جداً من دون الشعور بإرهاق قبل ذلك (نوبات نوم فجائية)
- هلوسة ("رؤية" أمور غير موجودة في الواقع)
- تقيؤات
- دوار (تشعر بأن كل الأشياء تدور)
- حرقان
- ألم بطن
- إمساك
- إنتفاخ في القدمين، في راحتي القدمين أو في اليدين.

أعراض جانبية غير شائعة
قد تظهر هذه لدى **حتى 1 من بين 100** شخص:
- شعور بالدوار أو الإغماء، خاصة عندما تقف فجأة (يحدث هذا نتيجة هبوط ضغط الدم)
- انخفاض ضغط الدم
- شعور بأن لديك ميل شديد للنوم خلال النهار (وَسَن شديد)
- مشاكل نفسية مثل إرتباك شديد (هذيان)، أوهام (أفكار غير منطقية)، أو پارانويا (شكوك غير معقولة).

من الجائز أن يقاسي بعض المتعالجين من الأعراض الجانبية التالية (شيوعها غير معروف، لا يمكن تقييمها من المعطيات الموجودة):
- **ردود فعل تحسسية** مثل **انتفاخات** حمراء وحاكة على الجلد (شرى)، إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة الذي قد يؤدي إلى صعوبة في البلع أو في التنفس، **طفح** أو حكة زائدة (انظر البند 2)
- تغيرات في **وظيفة الكبد**، التي تم الكشف عنها في فحوص الدم
- التصرف بعدوانية
- فرط إستعمال ركويپ مودوتاب (التشوق لجرعات دوائية كبيرة من الأدوية ذات المفعول الدوپاميني بما يتجاوز تلك اللازمة للسيطرة على الأعراض الحركية، المسماة متلازمة خلل تنظيم الدوپامين)
- عدم القدرة على مقاومة دافع، حافز أو إغراء بالقيام بعمل يمكن أن يكون مضراً لك أو للآخرين، يمكن أن يشمل هذا العمل:
  - رغبة قوية للقمار بشكل مفرط، رغم العواقب الشخصية أو العائلية الشديدة
  - إهتمام وسلوك جنسي متزايدان أو مختلفان يثيران قلقك أو قلق الآخرين بشكل ملحوظ، مثلاً زيادة في الرغبة الجنسية
  - مشتريات أو تبذير زيادة عن اللزوم بشكل خارج عن السيطرة
  - نوبات أكل بشراهة (تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة قصيرة من الوقت)، أو أكل قسري (تناول كميات طعام أكثر مما تحتاجه لإشباع الجوع)
- نوبات فرط نشاط، شمق أو عصبية
- إكتئاب، لامبالاة (apathy)، قلق، قلة حيوية، تعرق أو ألم يمكن أن تحدث (مسماة متلازمة الفطام من ناهضات الدوپامين) بعد التوقف أو خفض العلاج بـ ركويپ مودوتاب.

← **توجه إلى الطبيب إذا قاسيت أحد هذه التصرفات؛ سوف يتناقش معك حول كيفية إدارة أو تقليل الأعراض.**

إذا كنت تتناول ركويپ مودوتاب مع إل - دوپا
الأشخاص الذين يتناولون ركويپ مودوتاب مع إل - دوپا قد يطورون أعراضاً جانبية أخرى مع مرور الوقت:
- حركات لا إرادية (dyskinesias) هي عرض جانبي شائع جداً. إذا كنت تتناول إل - دوپا فمن الجائز أن تظهر لديك حركات لا إرادية معينة (dyskinesias) عندما تبدأ بتناول ركويپ مودوتاب. إحك للطبيب إذا حصل ذلك، لأنه من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى أن يلائم الجرعة الدوائية للأدوية التي تتناولها
- الشعور بالإرتباك هو عرض جانبي شائع.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.
التبليغ عن أعراض جانبية
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
https://sideeffects.health.gov.il/

5. كيفية تخزين الدواء؟
- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. خزن في العلبة الأصلية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية لمياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. استشر الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. ستساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

6. معلومات إضافية
- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

لب القرص:
Hypromellose 2208, glycerol dibehenate, mannitol (E421), lactose monohydrate, povidone K29-32, carmellose sodium, hydrogenated castor oil, maltodextrin, magnesium stearate, anhydrous colloidal silica and ferric oxide yellow (E172).

طبقة الطلاء:
قرص ذو **2 ملغ**:
Hypromellose 2910, titanium dioxide (E171), macrogol 400, ferric oxide red (E172), ferric oxide yellow (E172).

قرص ذو **4 ملغ:**
Hypromellose 2910, titanium dioxide (E171), macrogol 400, sunset yellow (E110), indigo carmine (E132).

قرص ذو **8 ملغ:**
Hypromellose 2910, titanium dioxide (E171), macrogol 400, ferric oxide red (E172), ferric oxide black (E172), ferric oxide yellow (E172).

انظر أيضا البند 2 في النشرة – "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تتوفر أقراص ركويپ مودوتاب لتحرير مطول (كل العيارات الدوائية) على شكل كبسولة، مطلية، عليها علامة 'GS' من جانب واحد.
ركويپ مودوتاب 2 ملغ: أقراص وردية مع علامة '3V2' من الجانب الآخر.
ركويپ مودوتاب 4 ملغ: أقراص بنية فاتحة اللون مع علامة 'WXG' من الجانب الآخر.
ركويپ مودوتاب 8 ملغ: أقراص حمراء مع علامة '5CC' من الجانب الآخر.
كل العيارات الدوائية: ضمن علبة لويحات، ذات 28 أو 84 قرصاً.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز: چلاكسوسميثكلاين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، پيتح تكڤا.

- المنتج: چلاكسو ويلكام .S.A، بورچوس، إسبانيا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ركويپ مودوتاب 2 ملغ: 141-62-31838
ركويپ مودوتاب 4 ملغ: 141-64-31839
ركويپ مودوتاب 8 ملغ: 141-63-31840

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تمّ التحرير في شباط 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

العلامات التجارية بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
©2022 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Req MT PT V8B