

نشرة المستهلك للطب البيطري
يتم تسويق الدواء وفقاً لوصفة الطبيب البيطري فقط
للاستخدام في الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله وقوته
مرهم بتروكسامين داخل الضرع لفترة الجفاف بيطري

2. المادة الفعالة والكمية في وحدة الجرعة
كل حقنة 5 مل تحتوي على:
ريفكسامين 100 ملغ

Rifaximin 100 mg

للحصول على قائمة المواد غير الفعالة، انظر للبند 13.

3. الغرض من استعمال الدواء
للاستخدام في بداية فترة الجفاف لعلاج التهابات ضرع تحت سريرية، للعلاج الوقائي في فترة الجفاف ومنع
التهاب الضرع الحاد الذي قد يحدث خلال الانجاب و/أو في بداية انتاج الحليب.

المجموعة العلاجية- مضادات حيوية للاستخدام داخل الضرع.

4. موانع الاستعمال
لا ينبغي الاستخدام في حالة فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من المكونات غير النشطة.

5. الآثار الجانبية

لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على رابط "الإبلاغ عن الآثار الجانبية
بسبب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي
يوجه للنموذج الإلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبية، أو عن طريق تسجيل الدخول إلى الرابط:
[/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. الحيوانات المستهدفة: الأبقار والجاموس.

7. الجرعة وكيفية الاعطاء

حقنة واحدة في الضرع لكل ربع بعد الحلب الأخير في بداية فترة الجفاف. يجب الحلب كل ربع وضمان
الجفاف الكامل. قم بتنظيف وتطهير كل حلمة، ثم أدخل حقنة بتروكسامين. انزع الغطاء الواقي، أدخل الفوهة
في قناة الحلمة (teat canal) واحقن جميع محتويات الحقنة. أخرج الفوهة وأمسك طرق الحلمة بيد واحدة
وباليد الأخرى قم بالتدليك نحو الأعلى. بعد ذلك ذلك كل ربع الضرع بكلتا اليدين بحركات متواصلة نحو
الأعلى لضمان توزيع متساو للمرهم في كل ربع من الضرع.

8. كيفية استخدام المستحضر

انظر الرسوم التوضيحية في نهاية النشرة.

9. وقت الانتظار:

للحليب: لا حاجة لفترة انتظار.

للحليب: إذا تجاوزت فترة الجفاف 42 يوماً، يكون وقت الانتظار صفراً.

عندما تكون فترة الجفاف أقصر من 42 يومًا، لا ينبغي استخدام الحليب من أول 15 عملية حلب. يجب إرسال عينة من الحليب من البقرة المعالجة لاختبار المواد المسموح بها قبل إدخال الحليب في الخزان العام للقطيع.

10. تحذيرات

- **تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء في علاج الحيوان المستهدف**
 - يمنع استعمال ضرع الحيوانات التي تلقت العلاج لأغراض الطعام.
 - يجب إجراء العلاج قبل أقل من سبعة أسابيع من تاريخ الإنجاب المقدر.
- **تحذيرات خاصة تتعلق بالاستخدام في الحيوانات**
 - إذا أمكن، يجب استخدام الدواء البيطري بناءً على نتائج اختبارات الحساسية. يمكن أن تؤدي إساءة استخدام المنتج إلى زيادة انتشار البكتيريا المقاومة للريفاميسين.
 - يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا لتحسين أساليب التربية من أجل تجنب جميع ظروف الإجهاد المحتملة.
 - يجب تجنب الاستخدام المتكرر أو المطول للدواء، وتحسين إجراءات العلاج والتطهير.
- **تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يتعامل مع المستحضر**
 - يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية معروفة للريفاميسين أو الإنسييميسات الأخرى تجنب ملامسة الدواء. في حالة الاتصال العرضي، اغسل يديك بعناية ومناطق الجلد الأخرى التي كانت على اتصال مع الدواء.
 - في حالة التلامس العرضي مع العينين والأغشية المخاطية، اشطفها على الفور بالكثير من الماء.
- **الحمل والرضاعة الطبيعية للحيوان المعالج**
 - يجب استخدام المستحضر أثناء الحمل، في فترة الجفاف.
- **ردود الفعل مع أدوية أخرى، وأنواع أخرى من التفاعلات**
 - غير معروفة.
- **جرعات زائدة**
 - لا توجد تقارير عن أعراض الجرعة الزائدة المرتبطة باستخدام الدواء.

11. تعليمات التخزين

- امنع التسمم! يجب أن يبقى هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع ومن خلال القيام بذلك سيتم التسمم.
- لا ينبغي أن تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة لا تتجاوز 25°C والحماية من الضوء.

12. تعليمات حول تدمير المنتج / بقايا بعد الاستخدام

يجب التخلص من أي بقايا من المستحضر البيطري أو أي نفايات ناجمة عن استخدام مستحضر بيطري كنفايات سامة، ويجب عدم إلقاؤها في المجاري.

13. مزيد من المعلومات

- بالإضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضًا:

Macrogol cetostearyl ether, Light liquid 55-Glycerol monostearate 40 paraffin

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة
- 5 مل من مرهم برتقالي أحمر متجانس في حقنة للإعطاء داخل الضرع.

تحتوي العبوة على 4 محاقن أو 12 حقنة. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

• صاحب التسجيل:

رومات م.ض، همبيليم 104/39، هرتسليا 4654327


• الشركة المصنعة:

FATRO S.P.A., ITALY
OZZANO EMILIA, BOLOGNA, ITALY, 40064 -VIA EMILIA 285


- رقم التسجيل في سجل المستحضرات الرسمي لدى وزارة الصحة: 081-42-92213
- تم اعداد النشرة في تموز 2021 وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

كيفية استخدام الحقنة داخل الضرع:

الإدخال الجزئي:




1. قم بإزالة الغطاء الواقي




2. أدخل الدواء


الإدخال الكامل:




1. قم بإزالة الغطاء الواقي



2. فك الملانم لإدخال جزئي من خلال البرم



3. قم بإزالة المحول للإدخال الجزئي



4. أدخل الدواء