

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ريفاروكسابان تارو 10 ملغ

أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على:

ريفاروكسابان 10 ملغ (rivaroxaban 10 mg)

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو كان يبدو لك أن مرضهم مشابه.

بالإضافة إلى النشرة، يوجد للمستحضر ريفاروكسابان تارو بطاقة معلومات سلامة للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات سلامة مهمة التي يجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وأثناء العلاج بريفاروكسابان تارو والعمل بموجبها. يجب قراءة بطاقة معلومات السلامة للمتعالج والنشرة للمستهلك بتمعن، قبل بدء استعمال المستحضر. يجب الاحتفاظ بالبطاقة والنشرة لمراجعتها مرة أخرى عند الحاجة.

1. لم أعد هذا الدواء؟

ريفاروكسابان تارو 10 ملغ مخصص لـ:

- منع تشكيل خثرات دموية في الأوردة، لدى البالغين بعد جراحة انتقائية لاستبدال الورك أو الركبة.
- منع عودة الخثرات الدموية في أوردة الساقين (تجلط الأوردة العميقة) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (انصمام رئوي) بعد استكمال 6 أشهر من العلاج لتخثر الأوردة العميقة أو لإنصمام رئوي سابق.

المجموعة العلاجية: ريفاروكسابان ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى مضادات التخثر ويعمل عن طريق تقليل الميل في تشكيل خثرات دموية وهذا عن طريق حصر العامل المشارك في عملية التخثر (العامل 10a).

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجيًا) لـ ريفاروكسابان أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات غير الفعّالة، انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".
- كنت تعاني من نزيف متزايد.
- كان لديك مرض أو حالة في عضو في الجسم يزيدان من الخطر لنزيف حادّ (مثل: قرحة المعدة، كدمات أو نزيف في الدماغ، جراحة في الدماغ أو في العينين التي حدثت مؤخرًا).
- كنت تتناول أدوية لمنع تخثر الدم (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أبيكسيبان أو هيبارين)، إلا في حالات الانتقال من علاج بمضاد للتخثر إلى بديل آخر أو عندما تتلقى هيبارين من خلال قسطار وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحًا.
- كنت تعاني من مرض كبد الذي يسبب زيادة خطر النزيف.
- كنت حاملًا أو مرضعة.

لا تتناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ وأخبر الطبيب إذا كان أيّ من الحالات المذكورة أعلاه ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ.

استعمال ريفاروكسابان تارو 10 ملغ يتطلب حذرًا خاصًا. قبل العلاج بريفاروكسابان تارو 10 ملغ، أخبر الطبيب إذا:

- كنت عرضة لخطر عالٍ للنزيف كما يمكن أن يكون في إحدى الحالات التالية:
 - مرض كلوي بدرجة معتدلة أو وخيمة، حيث يمكن أن يؤثر الأداء الوظيفي للكلى على كمية الدواء التي تعمل في جسمك.
 - كنت تتناول أدوية أخرى لمنع تخثر الدم (مثل: وارفارين، دابيجاتران، أيبكسيبان أو هيبارين)، عندما تنتقل من مضاد للتخثر إلى بديل آخر أو عندما تتلقى هيبارين من خلال قسطار وريدي أو شرياني لإبقائه مفتوحًا (انظر الفصل 2 البند "التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية").
 - كنت تعاني من النزيف.
 - ضغط دم مرتفع جدًا غير المتوازن بواسطة علاج دوائي.
 - مرض في المعدة أو في الأمعاء الذي قد يسبب نزيفًا مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو التهاب في المريء نتيجة، على سبيل المثال، مرض الجزر المعدي المريئي (وهو مرض يرتفع فيه الحمض من المعدة إلى المريء) أو أورام كائنة في المعدة أو في الأمعاء أو في الأعضاء التناسلية أو في المسالك البولية.
 - مشاكل في الأوعية الدموية لشبكية العين (اعتلال الشبكية).
 - مرض رئوي تكون به القصبات الهوائية موسعة وممتلئة بإفرازات متقيحة (bronchiectasis) أو نزيف سابق من الرئة.
- لديك صمام قلب اصطناعي.
- معروف لديك بأنك تعاني من مرض يسمى متلازمة أصداد الشحوم الفسفورية (اضطراب في الجهاز المناعي حيث يسبب زيادة خطر حدوث خثرات دموية)، أخبر الطبيب وهو سوف يقرر ما إذا كان ينبغي تغيير العلاج.
- قرّر الطبيب أن ضغط الدم لديك غير مستقر أو أنه من المقرر لك علاج جراحي أو بعد إزالة خثرة دموية من الرئتين. إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، أخبر الطبيب قبل تناول الدواء. سوف يقرر الطبيب ما إذا كان يجب علاجك بريفاروكسابان تارو 10 ملغ وما إذا كان هناك حاجة إلى إشراف طبي وثيق.

- إذا كان طبيبك يعتقد أنك في خطر متزايد لتطويع قرحة المعدة أو الأمعاء، فمن المحتمل أن يعطيك أيضًا علاجًا لمنعها.

إذا كان من المقرر أن تخضع لعملية جراحية أو إجراء جراحي إجتماعي

- من المهم جدًا أن تتناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ قبل وبعد الجراحة أو الإجراء الجراحي الإجتماعي بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
- إذا كانت عملياتك الجراحية تقتضي قسطار أو حقن داخل العمود الفقري (على سبيل المثال للتخدير فوق الجافية أو النخاعي أو تسكين الألم):
 - من المهم جدًا أن تتناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ قبل وبعد الحقن أو إزالة القسطار بالضبط في الأوقات التي حددها لك الطبيب.
 - توجه فورًا إلى الطبيب المعالج إذا كنت تعاني من أخدرار أو ضعف في الساقين أو من مشاكل في الأمعاء أو في المثانة بعد تلاشي التخدير، حيث إن هناك حاجة لتدخل طبي طارئ.

الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين ما دون سن 18 عامًا. لا توجد معلومات كافية عن الاستعمال لدى الأطفال والمراهقين.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:
 - أدوية معينة ضد حالات عدوى فطرية (مثل: فلوكونازول، إيتراكونازول، فوريكونازول، بوساكونازول) باستثناء تلك المخصصة للدهن على الجلد فقط.
 - أفرص تحتوي على كيتوكونازول لعلاج متلازمة كوشينج – حالة ينتج فيها الجسم فائضًا من الكورتيزول.

- أدوية معينة لعلاج حالات عدوى بكتيرية (مثل: كلاريثروميسين، إريثروميسين)
 - أدوية معينة مضادة للفيروسات لعلاج حالات عدوى فيروس الإيدز (HIV) (مثل: ريتونافير)
 - أدوية أخرى مضادة للخطر (مثل: إينوكساپرين، كلوبيدوجريل أو مُناهضات فيتامين K مثل وارفارين وأسيнокومارول)
 - أدوية مضادة للالتهابات ومسكنات الألم (مثل: نابروكسين أو حمض أسيتيل ساليسيليك [الأسبرين])
 - درونيدرون، دواء لعلاج عدم انتظام ضربات القلب.
 - أدوية معينة لعلاج الاكتئاب (مثبطات انتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين [SSRIs]، أو مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورأدرنالين [SNRIs]).
- إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، أخبر الطبيب قبل تناول الدواء، لأن هذه الأدوية قد تسبب زيادة في فعالية ريفاروكسابان تارو 10 ملغ. سوف يقرر الطبيب ما إذا كان يجب عليك تناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ وما إذا كان هناك حاجة إلى إشراف طبي وثيق.

كذلك، يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- أدوية معينة لعلاج الصرع (epilepsy) (مثل: فينيتوين، كاربامازيبين، فينوباربيتال).
 - المستحضر النباتي لعلاج الاكتئاب سانت جونز ورت (هايبيريكوم).
 - ريفامپيسين (مضاد حيوي).
- إذا كانت أي من الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، أخبر الطبيب قبل تناول الدواء، لأن هذه الأدوية قد تسبب في تقليل فعالية ريفاروكسابان تارو 10 ملغ. سوف يقرر الطبيب ما إذا كان يجب عليك تناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ وما إذا كانت هناك حاجة إلى إشراف طبي وثيق.

استعمال الدواء والغذاء

يُمكن تناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ مع أو بدون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا تتناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ إذا كنت حاملاً أو مرضعة. إذا كانت هناك فرصة للحمل، يجب عليك استخدام وسائل منع الحمل الموثوقة أثناء تناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول الدواء، توجهي إلى الطبيب على الفور، الذي سوف يقرر بشأن استمرار العلاج.

السياقة واستعمال الماكينات

قد يسبب ريفاروكسابان تارو 10 ملغ الدوخة (عرض جانبي شائع) أو الإغماء (عرض جانبي غير شائع) (انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية"). تُمنع السياقة، ركوب الدراجة الهوائية، استعمال معدات أو تشغيل ماكينات أثناء استعمال ريفاروكسابان تارو 10 ملغ إذا كنت تتأثر من هذه العوارض.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على لاكتوز و صوديوم. إذا قيل لك من قبل الطبيب أنك تعاني من عدم تحمل سكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل أن تبدأ بتناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ. يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومول صوديوم (23 ملغ) في كل قرص وبالتالي يعتبر في ماهيته "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

- الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.
- لمنع تشكيل خثرات دموية في الأوردة بعد جراحة لاستبدال الورك أو الركبة، الجرعة المقبولة عادة هي: قرص واحد (10 ملغ) مرة واحدة في اليوم. يجب أن تتناول القرص الأول بعد 6-10 ساعات من الجراحة. ومن ثم يجب تناول قرصاً واحداً كل يوم حتى يأمرك الطبيب المعالج بالتوقف.

- لمنع عودة الخثرات الدموية في أوردة الساقين (تجلط الأوردة العميقة) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (انصمام رئوي) بعد استكمال 6 أشهر من العلاج لتخثر الأوردة العميقة أو لانصمام رئوي سابق، الجرعة المقبولة عادة هي: قرص واحد (10 ملغ) مرة في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

- في جراحة استبدال مفصل الورك، عادة ما تكون مدة العلاج 5 أسابيع.
- في جراحة استبدال مفصل الركبة، عادة ما تكون مدة العلاج أسبوعين.
- لمنع عودة الخثرات الدموية في أوردة الساقين (تجلط الأوردة العميقة) وفي الأوعية الدموية في الرئتين (انصمام رئوي) بعد استكمال 6 أشهر من العلاج لتخثر الأوردة العميقة أو انصمام رئوي سابق، سيتم تحديد مدة العلاج من قبل الطبيب.

طريقة تناول

- من المستحسن بلع الدواء مع الماء.
- سوف يساعدك تناول الدواء في نفس الوقت من كل يوم، على تذكر تناوله.
- إذا وجدت صعوبة في ابتلاع القرص بالكامل، تحدث إلى طبيبك حول طرق أخرى لتناول ريفاروكسابان تارو 10 ملغ. يمكن سحق القرص وخلطه بالماء أو بهريس التفاح، مباشرة قبل تناوله.
- إذا لزم الأمر، سيعطيك الطبيب ريفاروكسابان تارو 10 ملغ مسحوق من خلال أنبوب تغذية إلى المعدة.
- لا توجد معلومات حول الشطر/المضغ.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى يجب عليك التوجه فورًا إلى الطبيب المعالج. إن تناول جرعة كبيرة جدًا من ريفاروكسابان تارو 10 ملغ يزيد من خطر النزيف. إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب عليك تناول جرعة فور تذكرك. يجب تناول القرص التالي في اليوم التالي وأن تستمر في العلاج كالمعتاد. لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعة مضاعفة!

يجب المواظبة على العلاج بموجب ما أوصى به من قبل الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء قبل استكمال العلاج بدون استشارة الطبيب حيث إن ريفاروكسابان تارو 10 ملغ يعالج الحالات الخطيرة ويمنعها.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ريفاروكسابان تارو 10 ملغ أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

مثل أدوية مضادات التخثر الأخرى المماثلة، يمكن أن يسبب ريفاروكسابان تارو 10 ملغ نزيفًا الذي قد يشكل خطرًا على الحياة. قد يسبب النزيف القوي انخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم (صدمة). في بعض الحالات قد يكون النزيف غير ظاهر.

يجب التوجه فورًا إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أحد الأعراض الجانبية التالية:

علامات النزيف:

- نزيف دماغي أو داخل الجمجمة (يمكن أن تشمل الأعراض صداع، ضعف في جانب واحد، تقيؤ، اختلاج، انخفاض في مستوى الوعي وتصلب الرقبة). هذه حالة طبية طارئة خطيرة، يجب التوجه لعلاج طبي فوري!

- نزيف متواصل أو متزايد.
- ضعف غير طبيعي، تعب، شحوب، دوخة، صداع، تورم غير مبرر، ضيق في التنفس، ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (angina pectoris).
- سيقرر الطبيب إذا كان هناك حاجة إلى إشراف وثيق أو مطلوب تغيير في العلاج.

علامات لتفاعلات جلدية خطيرة:

- طفح مكثف ممتد على الجلد، بثور أو جروح في نسيج مخاطي، على سبيل المثال في الفم أو في العينين (Toxic Epidermal Necrolysis/ Stevens-Johnson syndrome).
- رد فعل على دواء الذي يسبب طفحا جلديا، حمى، التهاب أعضاء داخلية، شدوذ في الدم ومرض جهازى (متلازمة DRESS). تواتر هذه الأعراض الجانبية هي نادرة جدا (حتى مستعمل 1 من بين 10,000 مستعملين).

علامات لردود فعل تحسسية خطيرة:

- تورم الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق؛ صعوبات في البلع؛ شرى وصعوبات في التنفس؛ هبوط مفاجئ في ضغط الدم. تواتر ردود فعل التحسس الخطيرة هي نادرة جداً (ردود فعل تأقية، بما في ذلك صدمة تأقية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10,000) وغير شائعة (وذمة وعائية وذمة أرجية؛ قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (Common) (الأعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10):

- انخفاض في خلايا الدم الحمراء التي قد تسبب الشحوب، تعب أو ضيق في التنفس
- نزيف في المعدة أو الأمعاء، نزيف في الأعضاء التناسلية والبول (بما في ذلك دم في البول وزيادة نزيف الطمث)، نزيف من الأنف، نزيف في اللثة
- نزيف داخل العين (بما في ذلك نزيف من بياض العين)
- نزيف داخل نسيج أو تجويف الجسم (نزيف دموي داخلي موضعي، كدمة)
- سعال دموي
- نزيف من الجلد أو تحت الجلد
- نزيف بعد الجراحة
- تسرب دم أو سائل من جرح جراحي
- تورم في الأطراف
- ألم في الأطراف
- خلل وظيفي في الكلى (يمكن أن ينجلي في الاختبارات التي يقوم بها الطبيب)
- حُمى
- ألم في البطن، عسر الهضم، غثيان أو تقيؤ، إمساك، إسهال
- ضغط دم منخفض (الأعراض لهذا يمكن أن تكون دوخة أو إغماء عند الوقوف)
- انخفاض عام في القوة والطاقة (ضعف، تعب)، صداع، دوخة
- طفح جلدي، حكة في الجلد
- يمكن أن تشير اختبارات الدم إلى زيادة في إنزيمات كبد معينة

أعراض جانبية غير شائعة (Uncommon) (الأعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 100):

- نزيف داخل الدماغ أو داخل الجمجمة (انظر أعلاه، علامات النزيف)
- نزيف داخل المفصل الذي يسبب الألم والتورم
- قلة الصفيحات (thrombocytopenia) (عدد صفائح دم منخفض، والتي هي خلايا تساعد في تخثر الدم)
- تفاعلات أرجية، بما في ذلك تفاعلات أرجية في الجلد
- خلل وظيفي في الكبد (يمكن أن ينجلي في الاختبارات التي يجريها الطبيب)
- يمكن أن تشير اختبارات الدم إلى ارتفاع في البيليروبين، في إنزيمات معينة في البنكرياس أو في الكبد أو في عدد الصفائح الدموية
- إغماء
- شعور عام سيء
- نبض مُسرَّع

- جفاف في الفم
- شرى (Urticaria)

أعراض جانبية نادرة (Rare) (الأعراض التي قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 1,000):

- نزيف داخل العضل
- ركود صفراوي (Cholestasis) (انخفاض تدفق الصفراء)، التهاب الكبد (Hepatitis) بما في ذلك تلف خلايا الكبد (كبد ملتهب بما في ذلك إصابة الكبد)
- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
- تورم موضعي
- نزيف دم داخلي موضعي (ورم دموي) في الأربية نتيجة مضاعفات لإجراء قلبي حيث يتم إدخال قسطار في شريان الساق

أعراض جانبية شائعة غير معروف (لا يمكن تقييم شيوها من المعلومات المتوفرة):

- فشل كلوي بعد نزيف خطير
- زيادة الضغط في عضلات الساقين أو الذراعين بعد نزيف، مما يسبب الألم، التورم، تغيرات بالشعور، الخدر أو الشلل (متلازمة الحيز بعد النزيف)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقبيل بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

- يجب التخزين بدرجة حرارة ما دون الـ 25°C.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الدواء (أدوية التي لم تعد قيد الاستعمال). سوف يساعد هذا في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضا على:

microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, pink film coating (contains: hypromellose, lactose monohydrate, titanium dioxide, macrogol, iron oxide yellow, carmine).

كل قرص مطلي من ريفاروكسابان تارو 10 ملغ يحتوي على 28.74 ملغ لآكتوز أحادي الهيدرات.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أقراص مطلية مستديرة، بلون ورديّ. جانب واحد مختوم بـ "□" والجانب الثاني بـ "10". يتم تسويق المستحضر في عبوة تحتوي على 30 قرص مطلية.

اسم صاحب التسجيل والمنتج وعنوانه:

ٲارو للصناعة الدوائية م.ض.، شارع هكٲتور 14، ءليء ءيفا 2624761

تم ءحرير النشرة في آذار 2022 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:
162-53-35228-00

لتنسٲط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد هذا النص بصيغة المذكّر. مع هذا، فالدواء معدّ لكلا الجنسين.