

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986**  
**يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط**

## **سوبوتكس 2 ملغ**

أقراص للإستعمال تحت اللسان

## **سوبوتكس 8 ملغ**

أقراص للإستعمال تحت اللسان

المواد الفعالة:

يحتوي كل قرص من سوبوتكس 2 ملغ على: بوپرينورفين (على شكل هيدروكلوريد) 2 ملغ Buprenorphine (as Hydrochloride) 2 mg

يحتوي كل قرص من سوبوتكس 8 ملغ على: بوپرينورفين (على شكل هيدروكلوريد) 8 ملغ Buprenorphine (as Hydrochloride) 8 mg

المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية: أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" وفي الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء مخصص للإستعمال لدى الكبار والمراهقين ما فوق عمر 16 سنة.

### **1) لأي غرض مخصص الدواء؟**

يُستعمل سوبوتكس لعلاج الأشخاص المدمنين على الأدوية الأفيونية المفعول (المخدرات) مثل المورفين والهيريونين، الذين وافقوا على تلقي علاج لإدمانهم. سوبوتكس مخصص للإستعمال لدى الكبار والمراهقين ما فوق عمر 16 سنة، الذين يتلقون أيضاً دعماً دوائياً، إجتماعياً ونفسياً.

### **الفصيلة العلاجية:**

بوپرينورفين – مستحضر أفيوني المفعول نصف إصطناعي.

### **2) قبل إستعمال الدواء**

#### **2.1 لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

- كنت حساساً (أليرجي) لبوپرينورفين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- كنت مرضعة.
- وُجد لديك مشاكل نفسية شديدة.
- وُجد لديك مشاكل كبدية شديدة.
- كنت طفلاً دون عمر 16 سنة.
- كنت تعاني من النُّمَل بسبب إستهلاك الكحول أو إذا كنت تعاني من إرتجاف، تعرق، إرتباك، قلق، أو هذيان ناتج عن الكحول.

## 2.2 تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

### • سوء الإستعمال، سوء الإستغلال وانحراف

هذا الدواء يمكن أن يشكل هدفاً لأشخاص يسيئون إستعمال الأدوية التي تحتاج وصفة طبية ويجب حفظه في مكان آمن لحمايته من السرقة. يجب أن يتم إستعمال الأفيونيات فقط من قبل الأشخاص الذين وُصفت لهم. لا تعط دواءك لأي شخص آخر. قد يؤدي إستعمال مقادير دوائية أعلى أو متكررة أكثر من الأفيونيات إلى زيادة خطورة الإدمان. يمكن أن يؤدي الإفراط وسوء الإستعمال إلى جرعة دوائية زائدة و/أو الوفاة.

### • مشاكل نفسية

هناك أشخاص ماتوا بسبب فشل تنفسي (عدم القدرة على التنفس) نظراً لأنهم أساءوا إستعمال هذا الدواء أو إستعملوه بالمشاركة مع مثبطات أخرى للجهاز العصبي المركزي مثل الكحول، البنزوديازيبينات (للتهدئة) أو أفيونيات أخرى.

### • التعلق وأعراض الإنسحاب

يمكن أن يؤدي إستعمال هذا الدواء بشكل دائم، وخاصة لفترة طويلة، إلى الإدمان. يمكن أن يسبب الإدمان حدوث أعراض الإنسحاب عند التوقف عن إستعمال هذا الدواء. يمكن لأعراض الإنسحاب أن تشمل عدم هدوء، صعوبة النوم، عصبية، عدم راحة، قلق، الشعور بضربات القلب (خفقان)، زيادة ضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، إسهال، فقدان الشهية للطعام، إرتجاف، إهتزاز أو تعرق. سيناقش طبيبك معك كيفية خفض المقدار الدوائي تدريجياً قبل إيقاف الدواء. من المهم ألا تتوقف عن إستعمال الدواء فجأة، لأنه هنالك احتمالية أكبر بأن تعاني من أعراض الإنسحاب.

يمكن أن يسبب هذا المستحضر أعراض الإنسحاب إذا إستعملته بعد أقل من 6 ساعات من إستعمالك أفيون قصير-الأمد (مثل المورفين، الهيروئين) أو بعد أقل من 24 ساعة من إستعمالك أفيون طويل-الأمد، مثل ميتادون.

### • تضرر الكبد

بُغ عن حدوث ضرر للكبد بعد إستعمال سوبوتكس، بالأخص في حال إساءة إستعمال الدواء. الأمر يمكن أن يحدث أيضاً نتيجة تلوثات فيروسية (التهاب الكبد المزمن من نوع C)، إساءة إستعمال الكحول، فقدان الشهية للطعام (قهم) أو إستعمال أدوية أخرى بإمكانها أن تضر كبدك (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية"). من شأن طبيبك أن يوصيك بإجراء فحوص دم روتينية من أجل متابعة وضع كبدك. إذا كنت تعاني من أية مشاكل في الكبد، فعليك إبلاغ الطبيب قبل بدء العلاج ب سوبوتكس.

### • ضغط الدم

هذا الدواء يمكن أن يسبب إنخفاضاً مفاجئاً بضغط الدم والشعور بدوار عند نهوضك بشكل أسرع مما ينبغي من وضعية الجلوس أو الإستلقاء.

### • تشخيص حالات طبية ليست ذات صلة

قد يخفي هذا الدواء أعراض الألم التي يمكن أن تساعد في تشخيص أمراض معينة. لا تنسى إبلاغ الطبيب بأنك تستعمل هذا الدواء.

**قبل العلاج ب سوبوتكس، إحك للطبيب إذا:** كنت تعاني من إختلاجات، نوبات أو تقلصات.

- كنت تعاني من الربو أو من مشاكل تنفسية أخرى.
- كنت تعاني من أي مرض في الكبد، مثلاً إلتهاب الكبد (hepatitis).
- كنت تعاني من ضغط دم منخفض.
- عانيت مؤخراً من إصابة في الرأس أو من مرض في الدماغ.
- كنت تعاني من مرض كلوي أياً كان.
- كنت تعاني من إضطراب في الجهاز البولي {مرتبطاً بالأخص بتضخم البروستات لدى الرجال}.
- كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية.
- كنت تعاني من خلل في جهاز الغدد الصماء (مثل مرض أديسون).

– كنت تعاني من إكتئاب أو من حالات أخرى يتم مُعالجتها بمضادات الإكتئاب. إن إستعمال هذه الأدوية مع سوبوتكس يمكنه أن يؤدي لحدوث متلازمة السيروتونين، حالة من شأنها أن تشكل خطراً على الحياة (أنظر في السياق "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

### 2.3 الأطفال والمراهقون

الدواء غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 16 سنة.

### 2.4 التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

قد تزيد أدوية معينة من الأعراض الجانبية لـ سوبوتكس وقد تسبب أحياناً ردود فعل شديدة جداً. لا تتناول أدوية أخرى أثناء إستعمال سوبوتكس دون التحدث إلى طبيبك أولاً. بالأخص، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

- **بنزوديازيبينات** (المستعملة لعلاج القلق أو اضطرابات النوم) مثل ديازيبام، تيمازيبام، ألبرازولام. إن الإستعمال المتزامن بـ سوبوتكس وأدوية للتهدئة مثل بنزوديازيبينات أو أدوية مشابهة، يزيد من الخطورة للنعاس، صعوبات التنفس (تثبيط تنفسي)، لحدوث غيبوبة وقد يشكل خطراً على الحياة. لهذا السبب، يجب التفكير في الإستعمال المتزامن، فقط عندما تكون خيارات العلاج الأخرى غير ممكنة. مع ذلك، إذا وصف لك طبيبك سوبوتكس مع أدوية للتهدئة، فإن المقدار الدوائي ومدة العلاج المشترك يجب أن تكون محدودة من قبل طبيبك. رجاءً إحك لطبيبك عن كافة أدوية التهدئة التي تتناولها واتبع توصية الطبيب بالنسبة للمقدار الدوائي عن كثب. قد يكون من المجدي إبلاغ أصحابك أو أقارب عائلتك ليكونوا على دراية بالعلامات والأعراض المفصلة أعلاه. إتصل بطبيبك إذا قاسيت من مثل هذه الأعراض.
- **مضادات الإكتئاب**، مثل موكلوبميد، ترانيلسيبرومين، سيتالوبرام، إسيالوبرام، فلوأوكسيتين، فلوثوكسامين، پاروكسيتين، سيرترالين، دولوكسيتين، فينلافاكسين، أميتريبتيلين، دوكسامين، أو تريميميرامين. لهذه الأدوية قد تكون تداخلات مع سوبوتكس ومن شأنك أن تقاسي أعراضاً مثل تقلصات نظمية لا إرادية للعضلات، بما في ذلك العضلات المسيطرة على حركة العين، قلة راحة، هلوسة، غيبوبة، فرط التعرق، إرتجاف، منعكسات مفرطة، زيادة في توتر العضلات، سخونة الجسم فوق 38 درجة مئوية. إتصل بطبيبك إذا قاسيت مثل هذه الأعراض.
- **أدوية أخرى التي قد تسبب لك الشعور بالنعاس** المخصصة لعلاج أمراض مثل القلق، الأرق، التقلصات/الإختلاجات، الألم. أدوية من هذا النوع قد تضعف من مستوى اليقظة لديك وتُصعّب عليك القيادة أو تشغيل الماكينات. كذلك، يمكنها أيضاً أن تسبب تثبيط جدي جداً للجهاز العصبي المركزي. فيما يلي قائمة أمثلة لهذه الأنواع من الأدوية:
  - أدوية أخرى الحاوية على أفيونيات مثل ميتادون، مسكنات معينة للألام ومثبطات السعال.
  - مضادات الإكتئاب (مستعملة لعلاج الإكتئاب) مثل إيزوكاربوكسازيد، فينلزين، سيليجيلين، ترانيلسيبرومين و-قالبروات قد تزيد من تأثير هذا الدواء.
  - مضادات المستقبل H<sub>1</sub> المهدئة (مخدرة) (تستعمل لعلاج ردود الفعل التحسسية) مثل ديفينهيدرامين وكلورفينامين.
  - باربيتورات (تُستعمل للنوم والتهدئة) مثل فينوباربيتال، سيكوباربيتال.
  - أدوية مهدئة (تُستعمل للنوم والتهدئة) مثل كلورال هيدرات.

● يمكن لـ نالتريكسون أن يمنع سوبوتكس من العمل. إذا كنت تتناول نالتريكسون أثناء إستعمال سوبوتكس، فقد تعاني من هبة مفاجئة لأعراض إنسحاب متواصلة وشديدة.

● كلونيدين (يُستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع)، قد يُطول من تأثير هذا الدواء.

● أدوية مضادات الفيروسات الرجعية (تستعمل لعلاج الإيدز) مثل ريتونافير، نيلفينافير، إيندينافير، قد تزيد تأثيرات هذا الدواء.

● أدوية معينة لعلاج التلوثات الفطرية مثل كيتوكونازول وإيتراكونازول، مضادات حيوية معينة (ماكروليدات)،

قد تزيد من تأثيرات هذا الدواء.

- أدوية معينة يمكن أن تقلل من تأثير سوبوتكس. هذه تشمل أدوية لعلاج الصرع (مثل كاربامازيبين وفينيتوين) وأدوية تُستعمل لعلاج السل (ريفامبيسين).

للحصول على الفائدة الكبرى من استعمال سوبوتكس، عليك إبلاغ طبيبك عن كل الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الكحول، الأدوية الحاوية على الكحول، المخدرات المتداولة وكل دواء يحتاج وصفة طبية تتناوله ولم يوصف لك من قبل طبيبك.

## 2.5 استعمال الدواء مع الطعام، الشراب والكحول

قد يزيد الكحول النعاس وقد يزيد الخطورة لحدوث فشل تنفسي (عدم القدرة على التنفس) إذا تم تناوله سوية مع سوبوتكس.

لا يجوز استعمال سوبوتكس سوية مع كحول.

لا يجوز البلع، أو إستهلاك طعام أو شراب حتى ذوبان القرص تماماً.

## 2.6 الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقد أنك حامل أو تخططين للحمل، يجب إستشارة طبيبك أو الصيدلي قبل إستعمال هذا الدواء.

لا يجوز إستعمال سوبوتكس إذا كنت حاملاً أو تعتقد أنك حامل، ما لم تناقشي هذا مع طبيبك وتعتبر فوائد العلاج تفوق الضرر المحتمل للرضيع.

إذا كنت تستعملين سوبوتكس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، فقد يطوّر طفلك تعلقاً وقد يعاني من أعراض الإنسحاب، بما في ذلك مشاكل في التنفس بعد الولادة التي قد تدعوا الحاجة إلى علاجها. يمكن أن تظهر هذه الأعراض حتى عدة أيام بعد الولادة.

لا يجوز إستعمال سوبوتكس إذا كنت مرضعة، لأن بوبرينورفين ينتقل إلى حليب الأم ويؤثر على رضيعك.

## 2.7 السياقة وإستعمال الماكينات

إذا شعرت بالنعاس أو الدوار أثناء إستعمال هذا الدواء، فلا تقم بتشغيل الماكينات.

يمكن أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على السياقة، حيث قد يجعلك تشعر بالنعاس أو الدوار.

لا تقم بالقيادة أثناء إستعمال هذا الدواء حتى تعرف كيف يؤثر عليك.

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان من الآمن لك السياقة أثناء إستعمال هذا الدواء.

## 2.8 معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

سوبوتكس يحتوي على لاكتوز و صوديوم. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأنك تعاني من عدم التحمل لسكريات معينة، بلغ الطبيب قبل إستعمال هذا الدواء.

يحتوي كل قرص من سوبوتكس 2 ملغ على حوالي 48 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

يحتوي كل قرص من سوبوتكس 8 ملغ على حوالي 192 ملغ لكتوز مونوهيدرات.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميلليمول صوديوم (23 ملغ) في القرص، أي أنه في الواقع "خالٍ من الصوديوم".

## (3) كيفية إستعمال الدواء؟


- يجب الإستعمال دائماً حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.
- المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
- لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
- من أجل تفادي أعراض الإنسحاب المفاجئة، يجب بدء العلاج ب سوبوتكس في حال وجود علامات واضحة للإنسحاب.
- خلال العلاج، بإمكان الطبيب زيادة المقدار الدوائي ل سوبوتكس حتى مقدار دوائي أعظمي قدره 32 ملغ، كأمر متعلق بإستجابتك. بمجرد أن تستقر لفترة من الوقت، سيفلّل الطبيب المقدار الدوائي تدريجياً ومن الجائز أن يكون من الممكن إيقافه تماماً.
- لا تتوقف عن إستعمال الدواء بشكل مفاجئ، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أعراض الإنسحاب.

## كيفية الإستعمال

- يجب وضع القرص تحت اللسان ودعها تذوب. هذا قد يستغرق 5-10 دقائق.
- هذه الطريقة الوحيدة لإستعمال القرص. لا يجوز شطر، مضغ أو سحق القرص، نظراً لأن الدواء لن يعمل وأنت قد تعاني من أعراض الإنسحاب.
- أثناء ذوبان سوبوتكس، لا يجوز مضغ أو لا يجوز بلع الأقراص بشكلها الكامل لأنها لن تؤثر.

## كيفية إخراج القرص من عبوة البليستر:

1. إنزع فقط جزءاً واحداً من عبوة البليستر، عن طريق تمزيقه على طول الخط المتقّب.
2. إبدأ من الطرف الذي يكون فيه الغلاف الساد مرفوعاً، إسحب للخلف غلاف الألومنيوم من أجل إخراج القرص.



## إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

- إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك، نظراً لأن مقداراً دوائياً مفرطاً من سوبوتكس بإمكانه أن يسبب مشاكل تنفسية خطيرة وتشكل خطراً على الحياة.

## إذا نسيت تناول الدواء

- إتصل بالطبيب بأسرع ما يمكن، وتصرف بحسب تعليماته.
- لا يجوز إستعمال مقداراً دوائياً مضاعفاً للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

## إذا توقفت عن إستعمال الدواء

- لا يجوز تغيير أو إيقاف العلاج بأي طريقة بدون موافقة الطبيب الذي يعالجك.
- إن التوقف عن العلاج بشكل مفاجئ قد يسبب أعراض الإنسحاب.
- يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
- لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
- إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

## (4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سوبوتكس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

## توجه حالاً الى الطبيب أو لتلقي علاجاً طبياً طارئاً إذا كنت تقاسي من أعراض جانبية، مثل:

- صفير مفاجئ، صعوبة في التنفس، إنتفاخ الجفنين، الوجه، اللسان، الشفتين، البلعوم أو اليدين؛ طفح أو حكة بالأخص تلك التي تغطي كافة الجسم. هذه قد تكون علامات لرد فعل تحسسي يشكل خطراً على الحياة.
- إذا بدأت بالتنفس أبطأ أو أضعف من المتوقع (تثبيط تنفسي).
- إذا شعرت أنك على وشك الإغماء، لأن ذلك يمكن أن يكون علامة على إنخفاض ضغط الدم.

## كذلك، بلغ طبيبك حالاً إذا كنت تقاسي أعراض جانبية مثل:

إرهاق شديد، قلة الشهية للطعام أو إذا بدت بشرتك أو عينيك صفراء. يمكن أن تكون تلك أعراض لتضرر الكبد.

## أعراض جانبية إضافية

|  |
|--|
| <p>أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):</p>   |
| <p>متلازمة الإنسحاب من المخدرات، صداع، تعرق (فرط التعرق)، أرق (عدم القدرة على النوم)، غثيان، ألم.</p>  |
| <p>أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين):</p>  |
| <p>ألم بطني، عدم راحة، قلق، آلام المفاصل، ضعف، ألم الظهر، ألم في العظام، إتهاب القصبات الهوائية، ألم في الصدر، قشعريرة، إمساك، سعال، انخفاض الشهية للطعام، إكتئاب، إسهال، دوار، جفاف الفم، آلام الدورة الشهرية، فساد المعدة، ضيق في التنفس، غازات، اضطراب في الجهاز الهضمي، عدائية، زيادة في توتر العضلات، تلوث، إنفلوإنزا، عصبية، اضطراب في الدمع (عيون دامعة)، إنتفاخ الغدد (الغدد الليمفاوية)، الشعور بوعكة، الشقيقة، تقلصات في العضلات، آلام العضلات، إتساع حدقة العين، ألم في العضلات، ألم في الرقبة، خفقان القلب، جنون العظمة، الشعور بحرقان أو وخز في راحتي اليدين والقدمين، إنتفاخ (في اليدين والرجلين)، سيلان أو إنسداد الأنف، ألم الحنجرة وألم عند البلع، سخونة، طفح، نعاس، إغماء (syncope)، تفكير غير طبيعي، اضطرابات في الأسنان، إرتجاف، تورّد، تقيؤ، تشاؤب.</p> |
| <p>أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعطيات المتوفرة):</p>  |
| <p>التعلق بالمخدرات والإدمان على المخدرات، إختلاجات، متلازمة الإنسحاب من المخدرات عند حديثي الولادة، هلوسة (الشعور بأشياء غير حقيقية)، انخفاض ضغط الدم عند تغيير الوضع من الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف، صعوبة في التبول، فير تيغو. يمكن أن يؤدي إستعمال غير صحيح لهذا الدواء عن طريق الحقن إلى ظهور أعراض إنسحاب، تلوّثات، ردود فعل جلدية أخرى ومشاكل في الكبد يمكن أن تكون خطيرة.</p>   |

### الإنسحاب من الدواء

عندما تتوقف عن إستعمال سوبوتكس، فإنك قد تقاسي أعراض الإنسحاب من الدواء، التي تشمل عدم هدوء، صعوبة النوم، سخط، عدم راحة، قلق، الشعور بضربات القلب (خفقان)، زيادة ضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، إسهال، إرتجاف، إهتزاز أو تعرق.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

### 5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية أفراد العائلة الآخرين، الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال سوبوتكس بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

## (6) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Lactose monohydrate, Mannitol, Maize Starch, Povidone K30, Citric acid anhydrous, Magnesium stearate, Sodium citrate.

- كيف تبدو أقراص سوبوتكس وما هو محتوى العبوة

سوبوتكس 2 ملغ هي أقراص للإستعمال تحت اللسان، بيضوية، بيضاء، بحجم 10 مم x 5 مم، مطبوع عليها «B2» من جانب واحد.

سوبوتكس 8 ملغ هي أقراص للإستعمال تحت اللسان، بيضوية، بيضاء، بحجم 14 مم x 7 مم، مطبوع عليها «B8» من جانب واحد.

الأقراص معبأة في علب ذات 7 و - 28 قرصاً.

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

إسم المنتج وعنوانه: إنديفيور UK م.ض.، هال، إنجلترا.

صاحب الإمتياز وعنوانه: نعومي شاكرو - عزرا م.ض.، ص.ب. 6825، رامات چان 52167

تم إعدادها في كانون الأول 2020.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سوبوتكس 2 ملغ: 133 88 29872

سوبوتكس 8 ملغ: 133 87 29873

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.