

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

فيتفن[™] 50 ملغ أقراص مطالية

فيتفن[™] 200 ملغ أقراص مطالية

فيتفن[™] 40 مللي متر مسحوق لتحضير معلق للإعطاء عن طريق الفم

**اقراص مطالية: فوريكونازول 50 ملغ، 200 ملغ
وريونيزول 40 ملغ**
يحتوي كل ملليلتر من المعلق الجاهز على: فوريكونازول 40 ملغ

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية: انظر البند 2 تحت "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
هذا الدواء وصف لعلاج مرض. لا تعطه للأخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى لو كان يبدو لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

فيتفن[™] هو مستحضر مضاد للفطريات واسع الطيف مخصص لعلاج:

- داء الرشاشيات الغروي (عدوى ناجمة عن فطريات من صنف الرشاشية - *Aspergillus*)
 - حالات العدوى بالمبنيات (candida) في الجهاز الدموي (candidemia) في المرضى الذين ليس لديهم قلة العدوى
 - حالات العدوى الغروية بالمبنيات المقاومة للفلوكونازول (دواء مضاد للفطريات آخر) بما في ذلك *C. krusei*
 - حالات عدوى خطيرة ناجمة عن فطريات من صنف *Scedosporium* و- *Fusarium*.
- فيتفن[™] مخصص للمرضى لديهم حالات عدوى فطرية خطيرة، لا بل ربما تشكل خطرًا على الحياة.
فيتفن[™] مخصص لمنع حالات عدوى فطرية غروية لدى من لديهم زرع نخاع العظم الذين في انتظار مرتفع.

الفصيلة العلاجية:

مضاد للفطريات من فصيلة التريازولات. يعمل عن طريق قتل أو وقف نمو الفطريات المختلفة التي تسبب حالات العدوى.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجياً) لل المادة الفعالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- يُمنع تناول هذا الدواء مع ترفيدندين (الحساسية)، أستيميزول (الحساسية)، سيسابيريد (المشاكل في المعدة)، بيموزيد (المشاكل النفسية)، كينيدين (المشاكل في نظم القلب)، إيفابراديدين (علاج قصور القلب المزمن)، ريفابوتين (العلاج السل)، ريبامبيسين (العلاج السل)، ريفامبيسين (العلاج السل)، كاربامازيبين (العلاج الاختلاجات)، فينوباربิตال (العلاج الاختلاجات والأرق الشديد)، مشتقات الإرغوت (إرغوتامين، ثئاني هيدروإرغوتامين؛ لعلاج التشنج)، سيروليموس (في المرضى الذين يضعوا لزراعة أعضاء)، إيفافيرينز الذي يعطى بجرعة مقدارها 400 ملغ وما فوق مرة واحدة يومياً (العلاج HIV)، ريتونافير في جرعتات تخطى مرتين في اليوم، بمقدار 400 ملغ وما فوق في كل مرة (العلاج HIV)، بنتة هيبيريكوم (St. John's Wort)، نالوكسيچول (العلاج الإمساك الناجم خاصة عن استعمال مسكنات الآلام الأفيونية (مثل المورفين، أو كسيكودون، فنتانيل، ترامادول، كوداين)، تولفابتان (العلاج نقص صوديوم الدم) (hyponatremia) أو لإبطاء الإنفاس في وظائف الكلى في المتعالجين الذين يعانون من مرض الكلى المتعدد الكيسيات)، لوراسيدون (العلاج الاكتئاب)، فينتوكلاكس (العلاج متعالجين لديهم ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن CLL).

قبل العلاج بـ فيتفن[™]، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من تفاعل تحسسي لمستحضرات من فصيلة الأزوارات.
- كنت تعاني من اعتلال عضلة القلب (cardiomyopathy)، نظم قلب غير منتظم أو بطيء أو شاذ في مخطط كهربائية القلب (ECG) الملقب بـ 'متلازمة QTc المطولة'.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مرض كبد. سوف يراقب الطبيب وظائف الكبد من خلال إجراء فحوصات دم.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- يجب تجنب أي ضوء شمس والتعرض للشمس أثناء استعمال الدواء. من المهم تغطية مناطق الجلد المعرضة للشمس واستعمال كريم واقي مع عامل حماية عالي (SPF)، حيث قد تكون هناك زيادة في حساسية الجلد لأشعة الشمس (UV). ينطبق هذا التحذير أيضاً على الأطفال.
- أثناء استعمال الدواء، أخبر الطبيب على الفور إذا كنت تطور حرق شمسي أو طفح جلدي شديد أو بثور في الجلد أو ألم في العظام. إذا ظهر أي من هذه الأعراض الجلدية، فمن المرجح أن يوجهك الطبيب إلى طبيب أمراض جلدية. هناك احتمال ضئيل لتطور سرطان جلد عند استعمال فيفند™ على المدى الطويل.
- إذا كنت تطور علامات "فشل الغدة الكظرية"، حالة طبية لا تنتهي فيها الغدد الكظرية كميّات كافية من بعض هرمونات الستيرويد مثل الكورتيزول، الذي قد يسبب أعراضًا مثل التعب المزمن أو المستمر، ضعف العضلات، فقدان الشهية، فقدان الوزن، آلام البطن، يرجى منك إخبار الطبيب.
- إذا كنت تطور أعراض "متلازمة كوشينغ" التي ينتج فيها الجسم فائضاً من هرمون الكورتيزول الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل زيادة الوزن، نسيج دهني بين الكتفين، استدارة الوجه، اسمرار الجلد في البطن، في الفخذين، في الثديين والذراعين، جلد رقيق، الميل إلى الخدمات بسهولة، ارتفاع السكر في الدم، فرط الشعرانية، فرط التعرق، يرجى منك إخبار الطبيب.
- سيقوم الطبيب بمراقبة وظائف الكبد والكلوي عن طريق إجراء فحوصات دم أثناء العلاج بـ فيفند™.
- قبل بدء العلاج وخالله يجب إجراء مراقبة لاضطرابات مستوى الشوارد الكهربائية مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم، المغنيسيوم والكالسيوم.

الأطفال والمرأهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر ستين.

الفحوصات والمتابعة

نظراً لأن فيفند™ يؤثر على الكبد والكلوي، فسوف يقوم الطبيب بمراقبة عمل الكبد والكلوي عن طريق إجراء فحوصات دم. يرجى منك إخبار الطبيب إذا كنت تشعر بألم في البطن أو إذا كان هناك تغيير في قوام البراز.

أدوية أخرى وفيفند™

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تتناول:

- أدوية التي يجب تجنب إعطاؤها بتوقيف مع فيفند™ إن أمكن ويجب ملائمة الجرعة إذا تم إعطاؤها سوية:
- فينتوتين (العلاج الصرعي) إذا كنت تتناول هذا الدواء فيجب رصد مستوى الفينوتوتين في الدم.
- ريتونافير (العلاج HIV) بجرعة منخفضة بمقدار 100 ملغ مرتين في اليوم. جرعات معينة من ريتونافير لا يمكن تناولها مع فيفند™، أنظر "لا يجوز استعمال الدواء إذا"، تحت هذا البند.
- چلاسيديجip (العلاج السرطان) – إذا طلب منك استعمال الدواعين، سيقوم الطبيب بمراقبة نظم القلب في أوقات متقاربة أكثر.

أدوية بتوقيف مع فيفند™ قد يطلب منك ملائمة الجرعة والمتابعة بأن الأدوية وأو فيفند™ ما تزال ذات الفائدة المرغوبة:

- وارفارين ومضادات تخثر أخرى (مثل بنيروكومون، أسينوكومرون)
- سيكلوسيپرين، تاكروليموس (المتعالجين خضعوا لزراعة عضو)
- أدوية من نوع سولفونيل أوريا (مثل تولبوميد، غلبيزيد وغليبوريد) (العلاج السكري)
- ستاتينات (مثل أتروفاستاتين، سيمافاستاتين، لوڤاستاتين) (الخفض مستويات الكوليسترول)
- بنزوديازيبين (مثل ميدزولام، ألبروزalam وتريازولام) (اللارق الشديد وللتهدئة)
- أو مبرازول (العلاج قرحة المعدة)
- حبوب منع الحمل (تحتمل أعراض جانبية مثل غثيان واضطرابات في الدورة الشهرية)
- مشتقات فينيكا (مثل فينكريسين، فينبلاستين)، (العلاج السرطان)
- مثبطات كيناز التيروزين (مثل أكسينتنيب، كيوزنتينيب، سريتنيب، كوبيمتنيب، دزاتينيب، نيلوتينيب، سونيتنيب، إبروتينيب، ريبوتسليب (العلاج السرطان))
- تريتنينين (العلاج أبيضاض الدم)
- إيندينافير ومثبطات إنزيم HIV پروتياز أخرى (العلاج HIV)
- أدوية من فصيلة NNRTI لعلاج HIV (مثل ديلاقيردين، نيفيرلين، إفافيرينز) (يمنع تناول جرعات بمقدار معينة من إفافيرينز سوية مع فيفند™، أنظر تحت هذا البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا")
- ميثادون (العلاج الإدمان)
- الأفيون قصير الأمد (مثل أفيتاتانيل، فنتانيل، سوفيتانيل، (مسكنات الألم بإجراءات جراحية)
- اوكتسيكودون وهيدروكودون (التسكين آلام معتدلة حتى شديدة)
- أدوية مضادة للالتهاب غير ستيرويدية (مثل إيبوبروفين وديكلوفيناك) (العلاج الألم والالتهاب)
- فلوكونازول (العلاج حالات عدوى فطرية)
- إفروميلوس (العلاج سرطان متقدم في الكلية ولدى متعالجين اجتازوا زراعة أعضاء)
- لتروموفير (المنع مرض ناجم عن الفيروس المُضخم للخلايا (CMV) بعد زرع نخاع العظم)
- إفاكافتور (العلاج التليف الكيسي (CF))

للقائمة الأدوية التي يمنع تناولها بالتزامن مع فيفند™، الرجاء انظر تحت هذا البند "لا يجوز استعمال الدواء إذا".

الحمل والإرضاع
يمنع استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، إلا إذا تلقيت أمراً صريحاً من الطبيب بذلك. يجب على النساء بسن الخصوبة استعمال وسائل منع ناجحة أثناء استعمال الدواء. إذا أصبحت حاملاً أثناء تناول فيفند™ توجه إلى الطبيب.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعرفي أنك حاملاً أو تحظين للحمل، استشيري الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

القيادة واستعمال الماكينات
فيفند™ قد يتسبب بتشوش الرؤية أو التحسس من الضوء. إذا كنت تتأثر من ذلك فلا يجوز القيادة أو تشغيل الماكينات الخطيرة. إما بالنسبة للأطفال فيجب تحذيرهم من ركوب الدراجات الهوائية أو من الألعاب بمقربة الشارع وما شابه.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء مُعلق

- يحتوي الدواء على سُكروز ولذلك إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، ارجع إلى الطبيب قبل تناول الدواء. يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار لدى مرضى السكري. قد يسبب ضرراً للأسنان.
- يحتوي الدواء على أقل من 1 مليمول صوديوم (23 ملغ) صوديوم لجرعة بمقدار 5 مل مُعلق، بمعنى آخر يعتبر "خل من الصوديوم".
- يحتوي المُعلق على بنزوات الصوديوم.

أقراص مطلية

- تحتوي الأقراص على لاكتوز ولهذا إذا قيل لك من قبل طبيب إن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى الطبيب قبل تناول الدواء.
- يحتوي قرص 50 أو 200 ملغ على أقل من 1 مليمول (23 ملغ) صوديوم للقرص الواحد، بمعنى أنه يعتبر "خل من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا وفقاً لتعليمات الطبيب.
يجب عليك التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بشأن الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.
الجرعة وطريقة العلاج سيحددان من قبل الطبيب فقط. سوف يتم تحديد الجرعة اعتماداً على وزنك وصنف العدوى.

بالاعتماد على استجابتك للعلاج، من المرجح أن يرفع أو يخفض الطبيب الجرعة اليومية.

إذا كان لديك مرض كبدي، فمن المرجح أن يخفض الطبيب جرعتك.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها!

إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان فيفند™ لمنع حالات العدوى الفطرية، فمن الجائز أن يقوم الطبيب بوقف العلاج إذا كنت أو طفلك تطوراً أعراضًا مرافقة للعلاج.

- يجب إعطاء الأقراص فقط إذا كان الطفل قادرًا على ابتلاع الأقراص.
أقراص مطلية: يجب تناول القرص على الأقل ساعة قبل أو ساعة بعد وجبة الطعام.
يجب بلع القرص بكامله مع قليل من الماء.
ممنوع السحق/الشطر/المضغ، وذلك لأن القرص مطلي.


المُعلق: يجب تناول المُعلق ساعة على الأقل أو ساعتين بعد وجبة الطعام.
يُمنع خلط المُعلق مع أي دواء آخر ويُمنع تخفيف المُعلق الجاهز بالماء أو أي سائل آخر.

تعليمات تجهيز المُعلق:

سوف يجهز الصيدلي المُعلق قبل صرفه.


- يكون المُعلق جاهزاً للاستعمال إذا كان على شكل سائل. إذا كان يبدو المسحوق جافاً، يجب تجهيز المُعلق بموجب التعليمات فيما يلي.
- انقر على القنبلة بطرف الأصبع لتحرير المسحوق.
 - قم بإزالة الغطاء.

- أضف كأس قياس معياري (كأس القياس المعياري مرافق داخل العبوة) من الماء (ما مجموعه 46 مل) إلى القنينة. املأ كأس القياس حتى الخط المحدد وأضف الماء إلى القنينة. يجب عليك دائمًا إضافة كمية إجمالية قدرها 46 مل من الماء، بغض النظر عن الجرعة التي تتناولها.
- أعد الغطاء وحضن القنينة جيداً لمدة دقيقة. بعد التعليق، يجب أن تكون الكمية الإجمالية للسائل في المعلق 75 مل.
- قم بإزالة الغطاء. اضغط على ملائم القنينة (المرفق داخل العبوة) لداخل عنق القنينة (كما هو موضح في الرسم أدناه). يتم إعطاء الملائم للسماح بخلع المعلق بالدواء من القنينة. قم بإعادة الغطاء للقنينة.
- سجل تاريخ انتهاء صلاحية المعلق الجاهز على ملصق القنينة. يجب استعمال المعلق الجاهز في غضون 14 يوما. يجب إتلاف جميع بقايا المعلق بعد هذا التاريخ.



تعليمات الاستعمال:

1. يجب استعمال المحقنة للاستخدام عن طريق الفم (المرفقة داخل العبوة) لقياس جرعة الدواء. حضن المعلق الجاهز في القنينة المغلقة قبل حوالي 10 ثوان من كل استخدام. قم بإزالة الغطاء.
2. ضع القنينة على سطح مستو وأنزل حافة المحقنة في الفتحة الموجودة في ملائم القنينة.
3. أقلب القنينة بينما تحافظ على ثبات المحقنة في مكانها. اسحب مكبس المحقنة ببطء حتى العلامات الصحيحة للجرعة التي تم ملائمتها من أجلك. من المفترض أن يكون الطرف العلوي من الحلقة السوداء على خط واحد مع الجرعة المناسبة المدونة على المحقنة.
4. إذا كنت تلاحظ وجود فقاعات كبيرة، فادفع مكبس المحقنة ببطء مرة أخرى إلى المحقنة، حتى يعود معلق الدواء إلى القنينة. كرر الخطوة رقم 3.
5. أقلب القنينة مرة أخرى إلى وضع مستقيم بينما ما تزال المحقنة في مكانها. أخرج المحقنة.
6. أدخل طرف المحقنة في فمك. اضغط ببطء على مكبس المحقنة لإخراج المعلق إلى داخل فمك (نحو الجهة الداخلية من الخ). لا تضغط بسرعة لإخراج الدواء. إذا تم إعطاء المعلق لطفل، فتأكد من أن الطفل يجلس أو يتم إبقاؤه في وضع منتصب قبل الإعطاء.
- 7.أغلق القنينة بالغطاء، يبقى ملائم القنينة في مكانه.
8. يجب غسل المحقنة بعد كل استخدام. قم بتنظيف الجزئين من المحقنة بالماء والصابون وأشطفهما بالماء. جفف الجزئين. احتفظ بالمحقنة في مكان نظيف بمصاحبة الدواء.



إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، فنوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عبوة الدواء معك. من الجائز أن تشعر بزيادة الحساسية للضوء نتيجة لتناول مفرط.

إذا نسيت تناول الدواء

من المهم تناول الدواء كل يوم في وقت محدد.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد، ولكن يُمنع بأي حال من الأحوال تناول جرعة مضاعفة للتتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب الموافقة على العلاج كما أوصي به من قبل الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

استمر في تناول الدواء حتى يأمرك الطبيب بالتوقف. إذا توقفت عن تناول الدواء مبكراً، فقد تستمر العدوى أو تعود. في المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو مع حالات عدوى صعبة فمن الجائز أن تكون هناك حاجة إلى علاج طويل الأمد لمنع تكرار العدوى.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، قد يسبب استعمال فيفند™ أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندesh عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيٍ منها.

أعراض جانبية خطيرة – يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب

- طفح
- يرقان، تغير في نتائج فحص وظائف الكبد بفحص الدم
- التهاب البنكرياس (pancreatitis)

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة جداً (من المرجح أن تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص):

- ضعف بالرؤية (تغيرات في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية، تغيرات في الألوان، زيادة الحساسية للضوء، عمى ألوان، ضعف بالعين، رؤية هالة، عمى ليلي، تقلب بصرى، رؤية أورّة، انخفاض حدة البصر، بهر (الجهر من شدة الضوء)، تضيق مجال الرؤية، بقع/نقطاط في مجال الرؤية)
- سخونة عالية
- طفح
- غثيان، تقيؤ، إسهال
- صداع
- تورم في الأطراف
- أوجاع في البطن
- صعوبة في التنفس
- زيادة في إنزيمات الكبد

أعراض جانبية شائعة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- التهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللثة، قشعريرة، ضعف
- انخفاض مستوى، بما في ذلك خطير، بعض خلايا الدم الحمراء وأو البيضاء (محظوظ أحياناً بسخونة)، انخفاض مستوى الصفائح الدموية التي تساعد على تجلط الدم
- انخفاض مستوى السكر في الدم، انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم، انخفاض مستوى الصوديوم في الدم
- قلق، عدم راحة، اكتئاب، ارتباك، صعوبة النوم، هلوسة
- اختلالات، رجفان أو حرکات للعضلات لا إرادية، إحساس بالوخز أو أحاسيس جلدية غير عادية، زيادة في توتريّة العضلات، نعاس، دوخة
- نزيف في العين
- مشاكل في نظم القلب بما في ذلك نبض سريع/بطيء جداً، إغماء
- انخفاض ضغط الدم، التهاب وريدي (phlebitis)
- صعوبات خطيرة في التنفس، ألم في الصدر، تورم في الوجه (الفم، الشفتين وحول العينين)، احتباس السوائل في الرئتين
- إمساك، عسر الهضم، التهاب الشفتين
- يرقان، التهاب الكبد (hepatitis) وتلف الكبد
- أطاح جلدية التي يمكن أن تسبب تشقّراً خطيراً وبثوراً في الجلد التي تتميز بمنطقة مسطحة، حمراء في الجلد مغطاة بنتوءات صغيرة متصلة، احمرار في الجلد
- حكة
- تساقط الشعر

- آلام الظهر
- فشل كلوي، دم في البول، تغيرات في فحوصات وظائف الكلى

أعراض جانبية غير شائعة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):

- أعراض شبيهة بالإنفلونزا، تهيج والتهاب في الجهاز الهضمي، التهاب الجهاز الهضمي الذي يسبب الإسهال، التهاب الأوعية الملفاوية
- التهاب النسيج الرقيق الموجود في الجدار الداخلي للبطن والذي يغطي تجويف البطن
- تضخم الغدد الليفافية (مؤلم في بعض الأحيان)، فشل نخاع العظم، زيادة في مستوى الخلايا الليمفاوية في الدم
- تراجع في الأداء الوظيفي للغدة الكظرية، قصور الغدة الدرقية
- أداء وظيفي غير سليم للدماغ، أعراض شبيهة بمرض الباركنسون، ضرر عصبي الذي يسبب الت Tremor ، الألم أو الوخز أو الإحساس بالحرقة في الأطراف
- مشكلة في التوازن أو التنسيق
- تورم في الدماغ
- رؤية مزدوجة، حالات خطيرة في العين والتي تشمل الالتواء والتهابا في العينين والجفنين، حركة غير عادية للعين، وتلف العصب البصري مما يسبب اضطراباً بصرياً، تورم القرص البصري
- انخفاض الحساسية للمس
- تغير في حاسة التذوق
- اضطرابات في السمع، رنين في الأذنين، الدوار (الشعور بالدوران)
- التهابات في أعضاء داخلية معينة - البنكرياس والأمعاء، تورم والتهاب اللسان
- تضخم الكبد، فشل الكبد، حصى أو مرض في كيس المرارة
- التهاب المفاصل، التهاب وريدي المصحوب بتشكل خثر دموية (تجلط الدم)
- التهاب الكلوي، بروتين في البول، تضرر الكلية
- نظم قلب سريع جداً أو تقوية ضربات، مصحوب أحياناً بنوبات كهربائية غير منتظمة
- تغيرات في مخطط كهربائية القلب (ECG)
- زيادة في مستوى الكوليستيرول في الدم، زيادة في مستوى البيريا في الدم
- ردود فعل تحسسية للجلد (خطيرة في بعض الأحيان) بما في ذلك حالات في الجلد تشكل خطراً على الحياة والتي تسبب ظهور بثور مؤلمة، جروح جلدية/ثاليل وفي الأغشية المخاطية، وخاصة في الفم، التهاب جلد، شرى، حروق شمس أو ردود فعل جلدية خطيرة نتيجة التعرض للضوء أو للشمس، جلد أحمر ومتهاجم، بقع حمراء أو أرجوانية في الجلد بسبب انخفاض تعداد الصفائح الدموية، أكزيما رد فعل تحسسي أو استجابة مناعية غير طبيعية

أعراض جانبية نادرة (من المرجح أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص):

- فرط نشاط الغدة الدرقية
- تدهور في أداء وظائف الدماغ (مضاعفات خطيرة لمرض كبد)
- تضرر خطير في العصب البصري، تعرق القرنية، حرکات لا إرادية للعينين
- ظهور بثور نتيجة الحساسية/التعرض للضوء
- اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي للجسم جزءاً من الجهاز العصبي المحيطي
- مشاكل في نظم القلب أو التوصيل الكهربائي (يشكل خطراً على الحياة في بعض الأحيان)
- رد فعل تحسسي يشكل خطراً على الحياة
- اضطراب في جهاز تنفس الدم
- تشمل ردود الفعل التحسسية في الجلد (أحياناً خطيرة) تورماً سريعاً (وذمة) في الجلد، بقع حاكمة أو مؤلمة لجلد سميك، محمّر مع قشور، حكة في الجلد والأغشية المخاطية، وهي حالة جلدية تشكل خطراً على الحياة تتسبب في انفصال أجزاء كبيرة من البشرة (الطبقة الخارجية من الجلد) عن الطبقات السفلية من الجلد.
- بقع جلدية صغيرة، جافة وحرشفية، أحياناً سميك مع "قرون"

أعراض جانبية التي شيوها غير معروفة (أعراض لم يتم تحديد شيوها بعد):

- نمش وبقع صبغية

- أعراض جانبية التي شيوها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتم تحديد شيوها بعد)، ولكنها ذات اعتبار ويجب التبليغ عنها إلى الطبيب المعالج على الفور:
- سرطان الجلد
 - التهاب النسيج المحيط بالعظم
 - مناطق حمراء ومتقدمة في الجلد أو كدمات في الجلد على شكل يشبه الحلقة التي قد تكون عارض لمرض مناعة ذاتية يسمى ذاتية حمامية جلدية

هناك تقارير عن تطور سرطان الجلد في مرضى قد تناولوا ثيفند™ لفترة طويلة من الزمن.

لقد تم ملاحظة حرائق شمس أو رد فعل جلدي خطير، نتيجة التعرض للضوء أو للشمس، بتوافر أعلى لدى الأطفال. إذا كنت أنت/طفلك تطهران اضطرابات جلدية، فمن الجائز أن يوجهك الطبيب المعالج إلى طبيب الأمراض الجلدية، الذي سيقرر بعد التشاور ما إذا كان من المهم أن تصل أنت/طفلك للمتابعة على أساس منتظم. ولقد تم أيضاً ملاحظة زيادة في إنزيمات الكبد بتوافر أعلى لدى الأطفال.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تتعارى مع عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن تتبع وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبلیغ عن اعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترن特 للتبلیغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبّب التقليد بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يناسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

- **أقراص مطلية:** يجب أن تحفظ في مكان بارد.
المعلق: قبل الإعداد، يجب تخزين المعلق في البراد (2° - 8°C).
بعد الإعداد: يجب تخزين المعلق الجاهز ما دون الـ 30°C، ليس في البراد وليس في المجمد، ويجب استعماله في غضون 14 يوم من يوم إعداده.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على:
أقراص مطلية:

Lactose monohydrate, pregelatinised starch, croscarmellose sodium, povidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol triacetate.

المعلق:

Sucrose, citric acid (anhydrous), natural orange flavour, sodium citrate dihydrate, sodium benzoate, xanthan gum, silica colloidal anhydrous, titanium dioxide.

أقراص مطلية:

يحتوي كل قرص من **فيفندر™ 50** ملغ على 62.5 ملغ أحادي هيدرات اللاكتوز.
يحتوي كل قرص من **فيفندر™ 200** ملغ على 250 ملغ أحادي هيدرات اللاكتوز.

المعلق:

يحتوي كل 1 مل معلق على: 0.54 غرام سكروز.
تحتوي جرعة بمقادير 5 مل من المعلق على 12 ملغ بنزوات الصوديوم.

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

فيفندر™ 50 ملغ أقراص مطلية: قرص مدور بلون أبيض-أوف وايت، مختوم على جانب واحد "Pfizer" ومن الجانب الثاني "VOR 50". يتم تسويقه في عبوات من 2، 10، 14، 20، 28، 30، 50، 56، 100 قرص.
فيفندر™ 200 ملغ أقراص مطلية: قرص بشكل بيضاوي بلون أبيض-أوف وايت حيث مختوم على جانب واحد "Pfizer" ومن الجانب الثاني "VOR 200". يتم تسويقه في عبوات من 2، 10، 14، 20، 28، 30، 50، 56، 100 قرص.
قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

فيفندر™ 40 ملغ/ملل مسحوق لإعداد معلق يعطى عن طريق الفم: مسحوق بلون أبيض - أوف وايت لإعداد معلق بلون أبيض - أوف وايت بنكهة البرتقال. يتم تسويقه في قنينة التي تحتوي على 45 غرام مسحوق لإعداد 75 مل معلق.

صاحب التسجيل وعنوانه: فايزر بي أف إي مستحضرات دوائية إسرائيل م.ض.، شارع شنكار 9، هرتسليا بيتواخ 46725.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

فيفندر™ 50 ملغ أقراص مطلية: 126-69-30596

فيفندر™ 200 ملغ أقراص مطلية: 126-70-30597

فيفندر™ 40 ملغ/ملل مسحوق لإعداد معلق يعطى عن طريق الفم: 134-48-31157

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

تم تحرير النشرة في 11/2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.