

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986
התרופה משוקת ללא מרשם רפואי

דיפירץ טיפולת לפה

טיפולת למtan דרך הפה

הרכב

כל 1 מ"ל (20 טיפולות) מכיל:

דיפירון 500 מ"ג (Dipyrrone 500 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וועיף 6 - "מידע נוספת".

קראו בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עלייך ליטול את התרופה על פי ההוראות בסעיף המינון בעalon זה. היועץ ברוקח אם הינך צריך למידע נוספת.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רפואי. עלייך ליטול את התרופה בצורה נכונה. הטיפולות אין מיעדות לתינוקות בממשק גוף מ- 5 ק"ג. עלייך לפנות לרופא באם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או הכאב נמשך יותר מ- 7 ימים, למרות השימוש בתרופה. הסיכון לאגרנולוציטוזיס עולה אם הטיפול נמשך מעבר ל- 7 ימים (ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי").

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכור כאבים בינוניים עד חזקים כגון כאבי ראש, שיניים וכאבי סות ולהורדת חום גבוהה שאינו מגייב לאירועי טיפול אחרים.
קבוצה Terapeutic: החומר הפעיל שייר לתק Shirim ממפלחת פירוזילון.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל דיפירון (מטאמיזול) או לתק Shirim פירוזילון אחרים (כגון פרופיפנאנזון, פנאצזון) או לתק Shirim פירוזילון (כגון פנילבוטאצון, אוקסיפנובוטאצון), כולל גם מטופלים אשר הגיבו, לדוגמה, בירידה משמעותית בספרית תא דם לבנים מסוימים (אגרנולוציטוזיס) לאחר שימוש בחומרים פעילים אלה.
- אתה רגיש (אלרגי) לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 - "מידע נוספת").
- יש לך רגשות ידועה למacky כאבים (תסמונת אסתמה כתוצאה מננטילת משacky כאבים או רגשות למacky כאבים המתבטאת בפריחה/אנגיאודמה). הכוונה למטופלים המגיבים למacky כאבים (כגון סליציליטים, פראצטמול, דיקלופנק, איבופרופן, אינדומטצין או נפרוקסן) בהתקומות של דרכי הנשימה התחרחות או בתגובה רגשות יתר אחרות כגון פריחה עם גרד וחבורות, נזלת ונפיחות (פריחה, דלקת באף, אנגיואדמה).
- אתה סובל מליקוי בתפקוד מה העצם, למשל לאחר טיפול בתרופות מסוימות המשמשות לטיפול בסרטן.
- אתה סובל מהפרעות בייצור תא דם.
- אתה סובל ממחלה תורשתית הכלולת הפרעה בייצור הצבע של תא הדם האדום (פורפריה כבדית חריפה לסירוגין).

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה

- דיפירץ טיפולת לפה מכיל דיפירון, והוא הקשור לסיכונים נדרים, אך מסכני חיים הבאים:
 - כשל פתאומי בזרימת הדם
 - אגרנולוציטוזיס (מחלה חמורה הנגרמת עקב ירידת חדה בספרית תא דם לבנים מסוימים).
- יש להפסיק ליטול דיפירץ טיפולת לפה ולהתיעץ עם הרופא מיד אם מופיעים הסימנים הבאים המצביעים על אפשרות לאגרנולוציטוזיס:
 - החמרה פתאומית במהלך הבריאות (למשל חום, צמרמות, כאב גרון, קושי בבליעה).

- חום שאינו חולף או חום המופיע שוכן ושוב.
- שינויים בקרומיים ריריים המלווים בכאב, במינוח בפה, באף ובגרון או באברי המין או באזור פ' הטבעת. ראה סעיף 4 – "תופעת לווואי".
- אם אתה מפתח סימנים של ירידה בספרת תא הדם השונים (פנציטופניה) (כגון הריגשת חולית, דלקת או חום מתמשך, חבורות, דימום וחיוורון), או סימנים של ירידה בספרת הטסיות (תרומבוציטופניה) (כגון עליה בנטיה לדם, שטפי דם זעירים בעור ובקרומיים ריריים), יש להפסיק ליטול דיפירץ טיפול לפה מיד ולהיעזר ברופא ללא דיחוי (ראה סעיף 4 – "תופעת לווואי").
- יתכן כי הרופא יעקוב אחר ספרת הדם שלך באופן קבוע ויפסיק טיפול במידה ומתרחשים שניים מסויימים.
- אם אתה מפתח תגובה אלרגית לדיפירץ טיפול לפה, אתה נמצא בסיכון גבוהה לפתח תגובה דומה לששכי כאבים אחרים.
- אם אתה מפתח תגובה אלרגית לדיפירץ טיפול לפה או תגובה אחרת המתווכת על ידי המערכת החיסונית (כגון אגרנו-ציטוזיס), אתה נמצא בסיכון גבוהה לפתח תגובה דומה לתכשירי פירולזין ופירולידין אחרים (חומרים דומים מבחינה כימית), כגון משככי הכאב פנאזון, פרופיפנאזון, פנילבוטאזון ואוקסיפנובטאזון. אם אתה מפתח תגובה אלרגית לתכשירי פירולזון ופירולידין אחרים או לששכי כאבים אחרים או תגובה אחרת המתווכת על ידי המערכת החיסונית, אתה בסיכון גבוהה לפתח תגובה דומה לדיפירץ טיפול לפה.

תגובהות רגישות יתר חמורות

- אם אתה סובל מażת התופעות המפורטוות להלן, הסיכון להופעת תגובהות רגישות יתר חמורות לדיפירץ טיפול לפה, עולה באופן משמעותי:
- רגישות לתרופות לשיכוך כאבים ולתרופה אנט-ריאומטיות, המתבטאת בתסמינים כמו פרירה עם גירוד וחברות או נפיחות. במקרה זה, אין ליטול דיפירץ טיפול לפה. למידע נוסף, ראה סעיף 2 – "אין להשתמש בתרופה אם".
 - התקפים של קוצר נשימה הנגרמים למשל מסתמה, במיוחד אם אתה סובל גם מפוליפים באף או מדלקת האף והסינוסים.
 - פרירה (אורטיקרייה) חרונית.
 - רגישות יתר לחומרי צבע (כגון טרטרצין) או לחומרים לשמור (כגון בנזואטים).
 - רגישות לאלכוהול: המתבטאת בהתקעשות, עינים דומות והסמקה חמורה בפנים, המתרחשות גם בעת צריכת כמויות אלכוהול קטנות. רגישות לאלכוהול מסווג זה עשויה להוות סימן לרגישות לששכי כאבים שלא אובחנו עד כה (ראה סעיף 2 – "אין להשתמש בתרופה אם").

במטופלים המצויים בסיכון מוגבר לתגובהות רגישות יתר, השימוש בדיפירץ טיפול לפה יעשה אריך לאחר הערכה קפדנית של הסיכונים האפשריים כנגד התועלת הצפואה (ראה גם סעיף 2 – "אין להשתמש בתרופה אם").

אם נעשה שימוש בדיפירץ טיפול לפה במקרים אלו, על המטופל להיות במצב רפואי צמוד, לצד טיפול חירום הזמן לשימוש מיידי.

הלם אנפילקטטי עלול להתרחש, במיוחד במטופלים רגישיים (ראה סעיף 4 – "תופעת לווואי"). נדרשת זהירות מיוחדת בחולי אסתמה או במטופלים בעלי נתיחה לפתח תגובהות אלרגיות.

תופעות עוריות חמורות

ישנם דיווחים על תופעות עוריות מסוימות חיים (תשומות סטיבוס-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס) לאחר שימוש בדיפירזו. אם מתפתחת פרירה עורית, המלאה לעתים קרובות בשלפוחיות או בנזק לקרומיים הריריים, עליך להפסיק מיד את הטיפול בדיפירץ טיפול לפה. לעומת זאת שוב דיפירזו (ראה סעיף 4 – "תופעת לווואי").

ירידת לחץ דם

דיפירץ טיפול לפה עלול לגרום לירידת לחץ הדם (ראה סעיף 4 – "תופעת לווואי").

סבירו זה עולה במידה ואתה:

- סובל מלחץ דם נמוך, מחסור נזליים משמעותיים (התיבשות), מזירתם דם לקויה או מסימנים ראשוניים של כשל בצרימת דם (למשל בעקבות התקף לב או פצעות חמורות).
- סובל מחום גבוה.

הרופא ישකול בקפידה את הטיפול בדיפירץ טיפות לפה, ינהל מעקב צמוד אחר המטופל וינתקו
באמצעים מניעתיים (כגון ייזוב זרימת הדם) על מנת להפחית את הסיכון לירידת לחץ דם.
יש לשמש בדיפירץ טיפות לפה רק תחת מעקב קפדי אחר זרימת הדם במדיה ויש צורך להימנע
mirida blichz ha'dem, l'mashl b'makraha shel:
- מחלת לב כלילית חמורה.
- היצרות החוסמת את זרימת הדם בכל' הדם המספקים דם למוח.

בעיות בתפקוד הכבד

דווחו מקרים של דלקת כבד במטופלים שנטולו דיפירן, אשר פיתחו תסמים תוך מספר ימים עד
מספר חדשים לאחר תחילת הטיפול.
עליך להפסיק ליטול דיפירץ טיפות לפה ולהיזעך ברופא אם אתה מפתח תסמים של בעיות בתפקוד
הכבד, כגון:
בחילה או הקאה, חום, עייפות, איבוד תיאבון, שטן כהה, צואה בהירה, הצהבה של העור או החלק
הלבן בעיניים, גירוד, פריחה או כאב בבטן העליון. במקרים אלו הרופא יבודק את תפקוד הכבד.
אין ליטול דיפירץ טיפות לפה אם נטלה בעבר תרופה המכילה דיפירן ופיתחת בעיות בתפקוד הכבד.

ליקוי בתפקוד הכל潦ות או הכבד

במקרה של ליקוי בתפקוד הכל潦ות או הכבד, יש ליטול דיפירץ טיפות לפה רק לאחר שהרופא ביצע
הערכתה קפדיית של הסיכון מול התועלות ונקט באמצעי זהירות מתאימים (ראה סעיף 3 - "חולים בעלי
ליקוי בתפקוד הכל潦ות או הכבד").

שימוש בילדים

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות בממשקן נמור מ-5 ק"ג. ראה טבלת מינונים לפי משקל וגיל בסעיף 3.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה**,
ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- ציקלוספורין, תרופה לדיכוי מערכת החיסון – הרופא יעקוב אחר רמות ציקלוספורין בدمך אם ניתן בו-זמןית.
- מתוטרקסאט, תרופה לטיפול במחלות סרטן ובמחלות ריאומיטיות- שימוש בו-זמןני עלול להגבר את הסיכון לפגיעה אפשרית בייצור דם על ידי מתוטרקסאט, במיוחד במטופלים קשיים. לפיכך, יש להימנע משילוב זה.
- חומצה אצטיל-סליצילית (אספירין) – אם אתה נוטל חומצה אצטיל-סליצילית במינון נמור על מנת להגן על הלב, דיפירץ טיפות לפה עלול להפחית את השפעתה על טסיות הדם.
- בופרופין, לטיפול בדיכאון ולהפסקת עישון – דיפירץ טיפות לפה עלול לגרום לירידה ברמות של בופרופין בדם.
- קלורפרומדין, תרופה לטיפול בהפרעות נפשיות – שימוש בדיפירץ טיפות לפה בו-זמןית, עלול לגרום לירידה חמורה בחום גופך.
- אפאבירין, תרופה לטיפול ב-7IH/איידס.
- מתడון, תרופה לטיפול בכאוב חמור או בגמילה מההתמכרות לחומרים נרכוטיים.
- ואלפרואט, תרופה לטיפול באפילפסיה או הפרעה זו קוטבית.
- טקרולימוס, תרופה המשמשת למניעת דחית איברים במטופלים מושתלים.
- סרטרליין, תרופה לטיפול בדיכאון.

שימוש בתכשיiri פירוזילון (קבוצת התרופות אליה משתייך דיפירץ טיפות לפה) עלול לגרום לתגובהות בין-תרופתיות עם תרופות מסוימות:

- תרופות למניעת קריישת דם.
- קפטופריל, תרופה לטיפול ביתר לחץ דם ובמחלות לב מסוימות.
- ליתיום, תרופה לטיפול בהפרעות נפשיות.
- תרופות משתנות, כגון טריאמטראן.
- תרופות להורדת לחץ דם.

לא ידוע באיזו מידת דיפירץ טיפות לפה גורם לתגובהות בין-תרופתיות אלו.

השפעה על בדיקות מעבדה

דוח לרופא שאתה נוטל דיפירץ טיפות להפה לפני ביצוע בדיקות מעבדה, מפני שהחומר הפעיל, דיפירון עלול להשפיע על תוצאות של בדיקות מסוימות (כגון: בדיקת רמות קראטינין בدم, שומנים, כולסטרול מסוג HDL או חומצה אורתית). אם הינך צריך למסור דגימת דם לצורך אחת מהבדיקות הנ"ל, יש ליטול את התרופה רק לאחר מתן הדגימה.

שימוש בתרופה ואלכוהול

רצוי להימנע משתית אלכוהול מכל סוג בעת השימוש בדיפירץ טיפות להפה.

שימוש בדיפירץ טיפות להפה ומזון

מומלץ ליטול את הטיפות עם מים. ניתן ליטול דיפירץ טיפות להפה לפני או אחריו ארוחה.

הירין והנקה

אם את בהירין או מיניקה, חשוב שתאת בהירין, או מתכנתת הירין, יש להיעזר עם הרופא או הרוקח לפניהם נטילת תרופה זו.

הירין

השימוש במהלך ההירין יעשה רק לאחר התיעצות עם הרופא ולאחר שהוא ביצע הערכת תועלת-סיכון יסודית. בשליש השלישי להירין (לאחר שבוע 28), ניתן להשתמש בדיפירץ טיפות להפה רק במינון הייעיל הנמוך ביותר. לאחר שבוע 28: אין ליטול יותר משלושה גרים (120 טיפות) ביום, לא יותר מ-3-4 ימים ברצף.

הנקה

חומר הפירוק של דיפירון מופרשים לחלב אם. בתקופת ההנקה ניתן להשתמש בדיפירץ טיפות להפה רק במקרים בהם אין תגובה לפראצטמול או לאיבופרופן.

נהיגה ושימוש במכוניות

בטווח המינונים המומלץ לא ידוע על פגיעהVIC ביכולת הריכוז והתגובה. עם זאת, שימוש זה לפחות במינונים גבוהים יותר, עליך לשקו את האפשרות לפגיעהVIC ביכולת הריכוז והתגובה ולהימנע משימוש במכוניות, מנהיגת כלי רכב ומבצע פעילויות מסוימות אחרות, במיוחד אם שתית אלכוהול.

מידע חשוב על חלק המרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה 38 מ"ג גנרטן (המרכיב העיקרי במלח בישול/שולחן) ב-1 מ"ל (20 טיפות). כמות זו שווה ל-1.9% מהצריכה היומיית המקסימלית המומלצת של נתרן עבור מבוגר.

אתנול: התרופה מכילה כ- 6 מ"ג אלכוהול (אתנול) ב-20 טיפות. כמות זו שווה לפחות מ-1 מ"ל של בירה או 1 מ"ל של יין.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון יקבע בהתאם לעוצמת הכאב או החום ובהתאם לתגובה של כל אדם לדיפירץ טיפות להפה. המינון יכול להיקבע על פי גיל או משקל המטופל. יש ליטול את המינון הייעיל הנמוך ביותר.

המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא הוא:

-יש ליטול את המינון המתאים כפי שמופיע בטבלה מטה. יש ליטול התרופה במרוחוי זמן של 6-8 שעות.

-מומלץ לחתת את המינון לפי משקל הילד בהתאם לטבלה. רק במקרה שלא ידוע משקל הילד - יקבע המינון על פי גיל הילד.

-אין ליטול מנה יותר מ-3 פעמיים ב-24 שעות.

הטיפולים אינם מיועדים לתינוקות במשקל נמוך מ-5 ק"ג.

מבוגרים ומתבגרים מגיל 15 שנים ומעלה (מעל משקל גוף של 53 ק"ג):
40-20 טיפולות, עד 3 פעמיים ביום.

תינוקות וילדים:

גיל	משקל גוף (ק"ג)	מיןון (מספר טיפולות)
3-11 חודשים	5-8	4-2 טיפולות, עד 3 פעמיים ביום
1-3 שנים	9-15	3-10 טיפולות, עד 3 פעמיים ביום
4-6 שנים	16-23	5-15 טיפולות, עד 3 פעמיים ביום
7-9 שנים	24-30	8-20 טיפולות, עד 3 פעמיים ביום
10-12 שנים	31-45	10-30 טיפולות, עד 3 פעמיים ביום
13-14 שנים	46-53	15-35 טיפולות, עד 3 פעמיים ביום

אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או הכאב נמשך מ-7 ימים, למרות השימוש בתרופה, יש לפנות לרופא. **הסיכון לאגרנולוציטוזיס עולה אם הטיפול נמשך מעבר ל-7 ימים (ראה סעיף 4 "טופעות לוואי").**

מטופלים קשישים, מטופלים במצב רפואי כלילי ירוד או בעלי ליקוי בתפקוד הכלליות יש להפחית את המינון לאחר שהפרשת תוצר הפירוק של דיפירז טיפולות לפחות מועכבות.

מטופלים בעלי ליקוי בתפקוד הכלליות או הכבד

אחר שקצב הפיני מהגוף יורד כאשר קיים ליקוי בתפקוד הכלליות או הכבד, יש להימנע ממתן חזר של מינונים גבוהים. הפחתת מינון אינה הכרחית אם השימוש הוא לתקופה קצרה בלבד. אין ניסיון בשימוש ארוך טווח. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

אופן השימוש הטיפול מיעדתו למתן דרך הפה. מומלץ ליטול את הטיפול עם מים. ניתן ליטול לפני או אחרי ארוחה. **יש לוודא שפנק הבקבוק סגור היטב לאחר השימוש.**

אם נטלה בטיעות מנת יתר או אם בטיעות בלבד ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

סימנים של מינון יתר כוללים:
בחילות, הקאות, כאב בطن, ירידת בתפקודי כליה ועד כשל כליתי, סחרחוורת, נמנום, איבוד הכרה, פרכוסים, ירידת חדה בלחץ הדם ועד כשל בזרימת הדם, קצב לב מהיר.
במקרה של חשד למינון יתר יש לידע את הרופא מיד על מנת לנקט באמצעים מתאימים.

הערה: בנטילת מינונים מאד גבוהים של התרופה, הפרשת תוצר פירוק בלתי מזיק של דיפירז, עלולה לגרום לשינוי צבע השתן לאדום.

אם שכחת ליטול את התרופה, אין ליטול מנת כפולה על- מנת לפצوت על המנה שנשכחה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם שהינך נוטל תרופה.** הרכב משקפיים או הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. טופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדיפירז טיפולות להריגת תופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשיימת תופעות לוואי. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

תופעות הלואאי הבאות עלולות להוביל להשלכות חמורות; יש להפסיק מיד את השימוש בדיפירז טיפות לפה ולפנות לרופא בהקדם האפשרי:

אם אחת מתופעות הלואאי המפורטות להלן מופיעה באופן פתאומי או מהמירה במידה משמעותית, יש לידע את הרופא באופן מיידי. תופעות לוואי מסוימות (כגון תגובות רגישות יתר חמורות, תגובות עוריות חמורות כגון תסמנת סטיבנס-ג'נסון או טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס, אגרנולוציטוזיס או פנציטופניה) עלולות להיות לעיתים מסכנות חיים. במקרים אלה, בשום אופן אין להמשיך ליטול דיפירז טיפות לפה ללא השגחה רפואית. הפסקת טיפול מוקדמת עשויה להיות בעלת חשיבות קריטית להחלמה.

- אם מופיעים סימנים של אגרנולוציטוזיס, פנציטופניה או תרומבולוציטופניה (ראה להלן וסעיף 2 – "ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"), יש להפסיק את השימוש בדיפירז טיפות לפה באופן מיידי ועל הרופא לבצע ספירת דם (כולל ספירת דם מבטלת). יש להפסיק את הטיפול עוד לפני התקבלו התוצאות של בדיקות המעבדה.
- אם מופיעים התסמינים הבאים שעשויים להיות סימנים לפגעה בכבד (ראה גם סעיף 2 "ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"): בחילה או הקאה, חום, עייפות, אי-בוד תיאבון, שתן כהה, צואה בהירה, הצהבה של העור או החלק הלבן בעיניים, גירוד, פריחה או כאב בבטן העליונה.

תופעות לוואי אפשריות אחרות

תופעות לוואי שאין שכיחות (עלולות להופיע ב-עד 1 מתוך 100 מטופלים):
פריחה בצעב סגול עד אדום כהה, לעתים מלאה בשלפוחיות (תגובה עורית לתרופה במקום קבוע (fixed drug eruption)).
ירידה חרדה בלחץ הדם, אשר יתכן שנגמרת בגין השפעה ישירה של התרופה, אינה מלאה בסימנים אחרים של תגובת רגישות יתר. תגובה מסווג זה גרמה לירידה חרודה בלחץ הדם במקרים נדירים בלבד. הסיכון לירידה בלחץ הדם עלול להעלות במקרה של חום גבוה באופן חריג.
תסמינים אופייניים לירידה חרדה בלחץ הדם הם קצב לב מהיר, חיוורון, רעד, סחרחות, בחילות ועילפון.

תופעות לוואי נדירות (עלולות להופיע ב-עד 1 מתוך 1,000 מטופלים):
תגובהות רגישות יתר (תגובהות אנפילקטואידיות או אנפילקטיות).
הסימנים לתגובהות קלות יותר כוללים:
תשוחת צריבה בעיניים, שיעול, נזלת, התעטשות, לחץ בחזה, אודם בעור (במיוחד באזור הפנים והראש), פריחה ונפיחות בפנים, ובמקרים פחות שכיחים: בחילות וועוינות בבטן.
תסמיני אזהרה מיוחדים כוללים צריבה, גרד ותשוחת חום על פני הלשון ומתחת הלשון, ובמיוחד בכפות הידיים ובכפות הרגליים.
תגובהות קלות יותר מסווג זה עלולות להתפתח לצורות חמורות יותר הכוללות: פריחה חרודה, אנגיאו-אדמה חרודה (נפיחות, כולל באזורי הגרון), היוצרות עויתיות (התכווצות) חרודה של דרכי הנשימה התחתונות, קצב לב מהיר (לעתים קצב לב איטי מיידי), הפרעות בקצב הלב, ירידה חרדה בלחץ דם, לעתים עם עלייה קודמת בלחץ הדם, אי-בוד הכרה וכשל של מחזור הדם.
תגובהות אלו עלולות להתרחש גם אם נטלה בעבר את התרופה מספר פעמים ללא סיבוכים. תגובהות אלו עלולות להיות חמורות עד מסכנות חיים, ובמקרים מסוימים אף לגורם למות.
במטופלים הסובלים מתסמונת אסתמה כתוצאה מנטיילת משככי כאבים, תגובהות רגישות יתר מתבטאות בדרך כלל כהתקפי אסתמה (ראה סעיף 2 – "אין להשתמש בתרופה אם").
ירידה במספר תאי הדם הלבנים (לויקופניה).
פריחה עורית (כגון פריחה מקולופפלרית).

תופעות לוואי נדירות מאוד (עלולות להופיע ב-עד 1 מתוך 10,000 מטופלים):
ירידה חרודה בספירת תאי דם לבנים מסוימים (אגרנולוציטוזיס), כולל מקרים המסתויימים במות, או ירידה בספירת הטסיות (תרומבולוציטופניה). תגובהות אלו כלול הנראות ונוצרות על ידי מערכת החיסון. הן עלולות להתרחש גם אם דיפירז ניתן בעבר ללא סיבוכים. קיימות עדות לכך שהסיכון לאגרנולוציטוזיס עולה אם נוטלים דיפירז טיפות לפה למשך יותר משבוע.
אגרנולוציטוזיס מתבטא כחום גבוה, צמרמות, כאב גרון, קשיי בליעה ודלקת בפה, באף, בגרון, ובאזור אברי המין או פי הטבעת. תסמינים אלה עשויים להתרbetaה במידה קלה בלבד במטופלים

הנוטלים אנטיביוטיקה (תרופה לטיפול בדלקת הנגרמת על ידי חיידקים). קצב שקיית הדם מוגבר באופן ממשועתי, בעוד שבולטות הלימפה לרוב אין מוגדלות כלל או מוגדלות במידה מועטה בלבד. סימנים אופייניים למספר טסיות נמוכה כוללים נתיה מוגברת לדימום והופעת נקודות אדומות尉ות בעור ובקרום ריריים הנגרמות על ידי דימום.

-התקף אסתמה

-אזורים נרחבים של שלפוחיות בעור וקילוף עור (**תסמונת סטיבנס-ג'ונסון או טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס**).

-הידדרות חדה בתפקוד הכליאות, במקרים מסוימים עם כמות שタン קטנה באופן חריג או ללא מתן שタン, הפרשת חלבוני הדם בשタン, כשל כליתי חריף, **דלקת כליאות** (נפריטיס אינטרסטיציאלית חריפה).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (השכיחות אינה ניתנת להערכת על סמך הנתונים הקיימים):

- כשל פתאומי בזרימת הדם הנגרם מתגובה אלרגית חריפה (שוק אנפילקט).
- התקף לב הנגרם מתגובה אלרגית (תסמונת קוני).
- א נמייה המלווה בלקוי בתפקוד מה עצם (**אנמייה אפלסטית**), ספירה נמוכה של תא אדם לבנים ואדומים ושל טסיות (**פנציטופניה**), כולל מקרים המסתםים במות.

הסימנים לשינויים אלו בדם כוללים: תחושת חוליה כללית, זיהום, חום מתמשך, חברות, דימום וחיוורון.

- דימום במערכת העיכול.

- דלקת של הכבד, הצהבה של העור והחלה הלבן בעיניים, עליה ברמות אנזימי הכבד בדם.

תוצר פירוק של דיפירון שאינו מזיק עשוי לגרום לשינוי צבע השタン לאדום.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חממייה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (il. www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה ! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרית תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל ל- 25°.
- ניתן להשתמש בתרופה עד 6 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, אך לא לאחר תאריך התפוגה המצוין על גבי האזינה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium Phosphate monobasic * 2H₂O , Sodium Phosphate bibasic * 12 H₂O, Raspberry aroma, Saccharin sodium, Purified water.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

תמיישה צלולה חסרת צבע או בעלת צבע צהוב בהיר, עם טעם וריח של פירות. הבקבוקן עשוי זכוכית, עם טפטפת וסגירה בטיחותית לילדים. אזינה של 20 מ"ל.

שם בעל הרישום וכותבתו: ר' רוקחות בע"מ, רחוב המתוכת 6, קדיימה.

שם היוצרים וכתובתו: א.י.ב.ו. פארםסאוטיס', איטליה .

העלון נערך בדצמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00-34423-21-157

RAZP1179-02