

## **نشرة للمستهلكة بموجب أنظمة الصيدلة**

**(مستحضرات) - 1986**

**يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط**

# **دياميلا**

## **أقراص مطلية**

**المادة الفعالة**

**يحتوي كل قرص على: ديسوجسترييل 0.075 ملغ -**

**Desogestrel 0.075 mg**

**لمعلومات حول المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية أنظر الفقرة 2 «معلومات هامة عن بعض مركبات ديارميلا» والفقرة 6 «معلومات إضافية».**

**اقرئي النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن ديارميلا. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك. **وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه لآخرين.** فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

### **1) لأي غرض مخصص الدواء؟**

**دياميلا يستعمل لمنع الحمل.**

**الفصيلة العالجية:** بروجستوجينات، وسائل منع حمل هورمونية.

**\* هناك نوعين أساسيين من الهرمونات لمنع الحمل.**

**- القرص المركب، «قرص منع الحمل»، الذي يحتوي على نوعين من الهرمونات الجنسية الأنثوية: إستروجين وبروجستوجين.**

**- القرص الذي يحتوي على بروجستوجين فقط (progesterone-only-pill) POP، الذي لا يحتوي على إستروجين.**

**دياميلا هو عبارة عن قرص لمنع الحمل يحتوي على بروجستوجين فقط (POP)**

**أو قرص منع حمل ميني).**

**\* ديارميلا يحتوي على كمية صغيرة لنوع واحد من الهرمونون الجنسي الأنثوي،即 البروجستوجين ديسوجسترييل.**

**\* أغلب الأقراص التي تحتوي على بروجستوجين فقط (POPs) تعمل أساساً عن طريق منع دخول خلايا النطاف إلى الرحم، لكنها لا تمنع دائماً إنساض البويضة، التي تعتبر الطريقة الأساسية التي تعمل بها أقراص منع الحمل المركبة.**

**\* ديارميلا يختلف عن غالبية أقراص منع الحمل التي تحتوي على بروجستوجين فقط (POPs) بأن مقداره الدوائي في أغلب الحالات يمنع إنساض البويضة. نتيجة لذلك، يعتبر ديارميلا وسيلة منع حمل ناجحة جداً.**

**\* يعكس أقراص منع الحمل المركبة، بالإمكان إستعمال ديارميلا لدى النساء غير القادرات على تناول إستروجين ولدى النساء المرضعات.**

**\* مساواه هو أنه خلال فترة إستعمال ديارميلا من الجائز أن يحدث نزف مهبلي غير منتظم. من جهة أخرى، من الجائز أن تقايسن من نزف أبداً.**

### **2) قبل إستعمال ديارميلا**

**دياميلا، بالمشابه لوسائل منع الحمل الهرمونية الأخرى، لا يحمي من العدوى بـ HIV (الإيدز) أو أي مرض آخر ينتقل بالإتصال الجنسي.**

**2.1 لا تستعمل ديارميلا إذا:**

**\* كنت حساسة (لديك اليرجيا) لديسوجسترييل أو لكل واحد من مركبات ديارميلا الأخرى (لائم المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6.1).**

**\* كنت تعانين من جلطة. الجلطة هي عبارة عن تشكّل خثرة دموية في الأوعية الدموية [مثلاً في الرجلين (جلطة الأوردة العميق) أو في الرئتين (انصمام رئوي)].**

**\* وُجد لديك الآن أو كان لديك يرقان (إصفار الرجل) أو مرض كبدي خطير وكبدك حتى الآن لا يعمل بشكل سليم.**

**\* كنت تعانين أو هناك شك بأن لديك سرطان الذي يتتطور بتاثير الهرمونات الجنسية، مثل بعض أنواع سرطان الثدي.**

**\* وُجد لديك نزف مهبلي مجدهول السبب.**

**إذا انتطبقت عليك إحدى تلك الحالات، بلغي طبيبك قبل البدء بإستعمال ديارميلا.** من شأن الطبيب أن يرشدك بإستعمال طريقة غير هورمونية لمنع الحمل.

**إذا ظهرت إحدى تلك الحالات للمرة الأولى أثناء إستعمال ديارميلا، استشيري طبيبك فوراً.**

### **2.2 تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال ديارميلا**

**قبل العلاج بدياميلا، إحكى لطبيبك إذا:**

**- مرضت ذات مرة بسرطان الثدي.**

**- وُجد لديك سكري.**

**- كنت تعانين من الصرع (أنظري فقرة 2.4 «تناول أدوية أخرى»).**

**- كنت تعانين من السل (أنظري فقرة 2.4 «تناول أدوية أخرى»).**

**- وُجد لديك ضغط دم مرتفع.**

**- كنت تعانين أو عانيت في الماضي من الكلف (بعض صباغية ذات لون بني - مائل للأصفر على الجلد، خاصة في الوجه): في هذه الحالة، تجنبي التعرض الزائد للشمس أو للأشعة فوق البنفسجية.**

**عندما يتم إستعمال ديارميلا يوجد إحدى تلك الحالات، من الجائز أن تضطري للحضور لمراقبة حثيثة. يمكن لطبيبك أن يشرح لك كيفية التصرف.**

#### **2.2.1 سرطان الثدي**

**\* من المهم فحص ثدييك بشكل دائم وعليك التوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تشعرين بأية كتلة في ثدييك.**

**\* لقد وُجد سرطان الثدي بشيوع أكبر بقليل لدى النساء اللواتي تتناولن أقراص منع الحمل بالمقارنة مع نساء بنفس العمر اللواتي لا تتناولن أقراص منع الحمل. تقل الخطورة عند توقف النساء عن إستعمال قرص منع الحمل، بحيث أنه بعد 10 سنوات من التوقف عن تناول أقراص منع الحمل، تصبح الخطورة مماثلة لتلك الخطورة لدى النساء اللواتي لم تتناولن أبداً أقراص منع الحمل.**

**سرطان الثدي هو نادر الحدوث دون عمر 40 سنة، لكن الخطورة تزداد كلما تقدمت المرأة في السن. لذلك، فإن عدد حالات سرطان الثدي الإضافية المشخصة يكون أكبر إذا واصلت المرأة تناول قرص منع الحمل وهي أكبر سنًا. الفترة الزمنية التي تتناول فيها قرص منع الحمل هي أقل أهمية.**

**\* من بين 10,000 إمرأة اللواتي تتناولن قرص منع الحمل لفترة قدرها حتى 5 سنوات لكنهن تتوقفن عن تناولها حتى عمر 20 سنة، ستكون هناك أقل من حالة إضافية واحدة من سرطان الثدي وُجدت حتى 10 سنوات بعد التوقف، بالإضافة لـ 4 حالات مشخصة عادة في هذه الفئة من العمر.**

**\* من بين 10,000 إمرأة اللواتي تتناولن قرص منع الحمل لفترة قدرها حتى 5 سنوات لكنهن تتوقفن عن تناولها حتى عمر 30 سنة، ستكون هناك 5 حالات إضافية بالإضافة لـ 44 حالة مشخصة عادة.**

**\* من بين 10,000 إمرأة اللواتي تتناولن قرص منع الحمل لفترة قدرها حتى 5 سنوات لكنهن تتوقفن عن تناولها حتى عمر 40 سنة، ستكون هناك 20 حالة إضافية بالإضافة لـ 160 حالة مشخصة عادة.**

**يُفترض بأن خطورة حدوث سرطان الثدي على النساء اللواتي تستعملن أقراص منع الحمل التي تحتوي على بروجستوجين فقط مثل ديارميلا هي مماثلة للخطورة لدى النساء اللواتي تستعملن أقراص منع الحمل المركبة، لكن الإثباتات هي غير قاطعة.**

**من الظاهر أن سرطانات الثدي الموجودة لدى النساء اللواتي تتناولن أقراص منع الحمل، إحتمال إنتشارها هو أقل من سرطانات الثدي الموجودة لدى النساء اللواتي لا تتناولن أقراص منع الحمل.**

**ليس من المؤكد بأن قرص منع الحمل يؤدي إلى زيادة الخطورة للإصابة بسرطان الثدي. من الجائز خضوع النساء لفحوص في أوقات متقاربة أكثر، وبالتالي تم الكشف عن سرطان الثدي بشكل مبكر أكثر.**

#### **2.2.2 الجلطة**

**يجب التوجه إلى الطبيب فوراً، إذا كنت تلاحظين علامات محتملة لحدوث جلطة (أنظر أيضاً «الفحوص الدورية»).**

**الجلطة هي عبارة عن تشكّل خثرة دموية، التي قد تسد وعاء دموي. تتشكل الجلطة أحياناً في الأوردة العميق للرجلين (جلطة الوريد العميق). فإذا انفصلت هذه الخثرة عن الأوردة التي تشكيت فيها، فهي يمكن أن تصعد وتصل إلى الرئتين، وتنسب «إنصمام رئوي». الإنصمام الرئوي يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر، ضيق في النفس، إنهايار حتى الوفاة.**

**\* جلطة الوريد العميق هي عبارة عن ظاهرة نادرة. ويمكن أن تتطور فيما إذا كنت تتناولين قرص منع الحمل أو لا. وهي قد تحدث أيضاً في حال أصبحت حاملاً.**

**تكون الخطورة أكبر لدى اللواتي تتناولن قرص منع الحمل مما هو عليه لدى اللواتي لا تستعملن القرص. يُفترض بأن الخطورة للجلطة تختلف بناءً على طبيبك لأن طبيبك يصف لك دواء آخر (أو للصيدلي الخاص بك) بأنه تناولين ديارميلا. تناول قرص منع الحمل لا يزيد عن 28 يوماً بعد إيقاف الدواء، يجب إستعمال وسائل منع الحمل العازلة لطيبة كامل نفس الفترة الزمنية.**

**يمكن لطبيبك إبلاغك فيما إذا كنت بحاجة لإتخاذ وسائل حذر إضافية لمنع الحمل، وإذا كان الأمر كذلك، لأي فترة من الزمن.**

**دياميلا قد يعرقل أيضاً من عمل أدوية أخرى، وأن يؤدي إلى زيادة الخطورة للجلطة التي تحتوي على سيكلوسپورين (أو تناولها قبل تناولها حتى سوكاربازيبين، فيلابامات، فيفينوباربیتال).**

**\* ضغط دم مرتفع في الأوعية الدموية للرئتين (بوستنتان).**

**\* حالات نفسية إكتئابية (الدواء النباتي St. John's Wort).**

**\* تلوث إلتهاب الكبد الفيروسي من نوع C (متلاً كلاريتروميسين، إيتراكونازول، فلوكونازول).**

**\* ضغط دم مرتفع (فرط ضغط الدم)، الذبحة الصدرية أو بعض إضطرابات نظم القلب (متلاً ديلتيازيم).**

**إذا كنت تتناولين ديارميلا، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع (متلاً ريفاميبسيين، ريفابوتين).**

**\* تلوثات HIV (متلاً ريتونافير، نافينافير، إيفافيرينز).**

**\* تلوث إلتهاب الكبد الفيروسي من نوع C (متلاً بوساپريثير، تيلابريثير).**

**\* أو أمراض تلوثية أخرى (متلاً چريسيوفولفين).**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع، فيجب إتخاذ إجراءات إضافية لمنع الحمل.**

**إذا كنت تعانين من الصداع**

### 3) كيفية إستعمال ديماميلا؟

يجب دائمًا تناول ديماميلا بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إن كنت غير واثقة بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء. المقدار الدوائي، طريقة وفترة العلاج تحدى من قبل الطبيب فقط. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

#### 3.1 متى وكيفية تناول أقراص منع الحمل؟

- تحتوى كل لوحة من ديماميلا على 28 قرصاً. تكفى لفترة 4 أسابيع.
- يجب تناول قرص منع الحمل كل يوم، بنفس الساعة تقريباً. يجب بلع قرص منع الحمل بأكمله، مع الماء.
- هناك أسهوم مطبوعة على القسم الأمامي من اللوحة، بين الأقراص. أيام الأسبوع مطبوعة على القسم الخلفي من اللوحة. كل يوم مناسب لقرص واحد.
- في كل مرة تبدئ فيها بلوحة جديدة من ديماميلا، تناولي قرص من الصف العلوي. لا تبدئ من أي قرص. مثلاً، إذا بدأت بيوم الأربعاء، فعليك تناول القرص من الصف العلوي الذي مكتوب عليه WEDnesday = Wednesday (Wednesday).
- واصلىي تناول قرص واحد كل يوم حتى فراغ العبوة، دائمًا بالإتجاد المدون بواسطة الأسهوم. بالنظر إلى ظهر العبوة يمكنك بسهولة فحص فيما إذا كنت قد تناولت القرص في يوم محدد.
- من الجائز أن يحدث لك نزف مهبلي خلال فترة إستعمال ديماميلا (أنتظري الفقرة 4 «الأعراض الجانبية»)، لكن عليك مواصلة تناول أقراص منع الحمل كالمعتاد.
- عند فراغ اللوحة، عليك البدء بلوحة جديدة من ديماميلا في اليوم التالي - بدون توقف وبدون إنتظار النزف.
- لا توجد معلومات حول سحق / شطر / مضغ أقراص منع الحمل.

#### 3.2 البدء بالعبوة الأولى من ديماميلا

- إذا كنت لا تستعملين وسيلة هورمونية لمنع الحمل في الوقت الحالي (أو في الشهر الأخير):
  - انتظرى حتى ظهور الطمث. تناولي قرص منع الحمل الأول من ديماميلا في اليوم الأول للطمث. لا يحتاج الأمر لوسائل إضافية لمنع الحمل. في حال تناولك للقرص الأول في اليوم الثاني حتى اليوم الخامس للطمث، فإستعملى وسيلة عازلة لمنع الحمل لفترة الأيام الـ 7 الأولى من تناول الأقراص.
  - عند إنتقالك من قرص مركب لمنع الحمل (COC)، من حلقة مهبلية، أو من لصقة جلدية:
    - إذا لم تكن لديك فترة توقف عن القرص - عن الحلقة - أو عن اللصقة
    - إبدي بتناول ديماميلا في اليوم الذي يلي تناولك للقرص الأخير من عبوة الأقراص الحالية، أو في يوم إزالة الحلقة المهبلية أو اللصقة (أي بدون فاصل بين الأقراص، الحلقة المهبلية أو اللصقة وبين بدء ديماميلا).
    - إذا كانت عبوة الأقراص الحالية الخاصة بك تحتوى أيضاً على أقراص غير فعالة (پلاسيبو)، فيمكنك بدء ديماميلا في اليوم الذي يلي تناول القرص الفعال الأخير (إذا كنت غير واثقة أي قرص هذا، راجعي الطبيب أو الصيدلي).
    - في حال تقييدك بهذه التعليمات فلا حاجة لوسائل حذر إضافية لمنع الحمل.

#### 3.3 إذا نسيت تناول ديماميلا

- إذا كان التأخير أقل من 12 ساعة من العادة:
  - تناولي القرص المنسي حال تذكره وتناولي القرص القادم في الوقت الإعتيادي.
  - لا يزال ديماميلا يحميك من الحمل.
  - إذا كان التأخير أكثر من 12 ساعة:
    - إذا كان التأخير أكثر من 12 ساعة عن العادة، من المفترض أن تتلقى فيه الحقة محبمة تماماً من الحمل. كلما نسيت عدد أكبر من الأقراص المتالية، تزداد خطورة حدوث الحمل لديك.
    - تناولي قرص حال تذكره والقرص التالي في الوقت الإعتيادي. أي، من الجائز أن تتناول قرصين بنفس اليوم. هذا الأمر غير ضار. (إذا كنت قد أقمت علاقات جنسية، فيجب نفي حدوث حمل قبل بدء إستعمال ديماميلا. بالإمكان الحصول على معلومات إضافية بالنسبة للنساء المرضعات في فقرة «الحمل والإرضاع».

#### 3.4 إذا كنت تعانين من إضطرابات في الجهاز الهضمي (مثلاً: تقيؤ، إسهال شديد)

- إذا تقييات خلال 3-4 ساعات بعد تناول قرص ديماميلا أو إذا حصل لديك إسهال شديد، فمن الجائز أن لا تمتلك المادة الفعالة بأكملها. تابعي الإرشادات حول الأقراص المنوية في الفقرة أعلاه.
- عند إنتقالك من حقيقة أو غرسة أو من لولب رحمي (IUS) هورموني:
  - إبدي بتناول ديماميلا في الموعد الذي كان من المفترض أن تتلقى فيه الحقة التالية، أو في اليوم الذي تمت فيه إزالة الغرسة أو اللولب الرحمي لديك. لا حاجة بوسائل حذر إضافية لمنع الحمل.

#### 3.5 إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر (مقدار دوائي مفرط)

- لم تكن هناك تقارير عن حدوث تأثيرات خطيرة ضارة نتيجة تناول أكثر من اللازم من أقراص ديماميلا بنفس الوقت. الأعراض التي قد تظهر للحصول على معلومات إضافية عن «سرطان الثدي» و «الجلطة»، واستشيري طبيبك فوراً إذا دعت الحاجة.
- أنظر أيضاً المرربع الرمادي في الأعلى «يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا».
- عليك التوجه إلى الطبيب فوراً إذا قاسيت من رد فعل تحسسي (فرط حساسية)، بما في ذلك إنفاس في الوجه، الشفتين، اللسان و/or الحنجرة الذي يؤدي إلى صعوبات في التنفس أو البلع (وذمة وعائية و/or تأق).
- يمكن أن يظهر نزف مهبلي غير منظم أثناء إستعمال ديماميلا. من شأن ذلك أن يكون بقع طفيفة فقط، لا تحتاج إلى إستعمال فوطة، أو نزف أشد، الذي يbedo على شكل طمث طفيف. من الجائز أن تناولي الأقراص التي نسيت مسبقاً. واصلي تناول الأقراص كالمعتاد لكنك ملزمة أيضاً بإستعمال وسيلة إضافية لمنع الحمل، مثل الكوندوم، لفترة الأيام الـ 7 القادمة.
- إذا كان التأخير أكثر من 12 ساعة عن العادة، من المفترض أن تتلقى فيه الحقة علاقات جنسية في الأسبوع الذي سبق نسيان الأقراص، فيمكنك أن تصبحي حاملاً.
- إذا نسيت قرص واحد أو أكثر خلال الأسبوع الأول لبدء الأقراص وأقمت علاقات جنسية في نفس اليوم، فيجب حمل للوقت الطارئ يعتبر آمناً، يجب إستشارة الصيدلي أو طبيبك.
- إذا ظهر عرض جنبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة طبيبك.

#### 3.6 ماذا يحتوى ديماميلا؟

- يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:
  - Lactose Monohydrate, Maize Starch, Povidone K-30, Stearic Acid, Silica Colloidal Anhydrous, RRR-Alpha-Tocopherol, Silica Colloidal Hydrated, Hypromellose 2910, Titanium Dioxide, Polyethylene Glycol.
  - يحتوى كل قرص على حوالي 55 مل لكتوز مونوهيدرات.
  - أنظر أيضاً تحت الفقرة 2.8 «معلومات هامة عن بعض مركبات ديماميلا».

#### 3.7 كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

- حجم العبوة:
  - علبة من الكرتون تحوى على لوحة (بليستر) واحدة أو ثلاثة لوحيات. لوحة واحدة من ديماميلا تحتوي على 28 قرصاً ويمكن أن تكون معبأة ضمن حافظة منفردة.
  - من الجائز أن لا تسوق كافة أنواع العبوات بشكل فعلى.
- صاحب الإمتياز وعنوانه:
  - تيقع إسرائيل م.ض.، شارع دفورة هنفيه 124، تل أبيب 6944020.
  - اسم المنتج وعنوانه: Laboratorios Leon Farma SA, Spain, 24008 Navatejera, Leon, Spain.
  - تم إعداد هذه النشرة في كانون الأول 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
  - رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 155.98.34400

#### 3.8 ديماميلا DIAM CTAB PL SH 281221