

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة  
(مستحضرات) - 1986  
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

نيوڤوجين 30 MU محقنة جاهزة للإستعمال  
نيوڤوجين 48 MU محقنة جاهزة للإستعمال  
نيوڤوجين 30 قناني  
للإعطاء داخل الوريد/تحت الجلد

**التركيب:**

كل محقنة من نيوڤوجين 30 MU تحتوي على 30 مليون وحدة (300 ميكروغرام [مكغ]) من Filgrastim فيلچر استيم بـ 0.5 ملل (0.6 ملغ/ملل).  
كل محقنة من نيوڤوجين 48 MU تحتوي على 48 مليون وحدة (480 ميكروغرام [مكغ]) من Filgrastim فيلچر استيم بـ 0.5 ملل (0.96 ملغ/ملل).  
كل قنينة من نيوڤوجين 30 MU تحتوي على 30 مليون وحدة (300 ميكروغرام [مكغ]) من Filgrastim فيلچر استيم بـ 1 ملل (0.3 ملغ/ملل).

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب، الممرضة أو الصيدلي.  
• إحتفظ هذه النشرة. من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.  
• وصف هذا الدواء من أجلك فقط. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.  
• إذا ظهرت لديك أية أعراض جانبية، راجع طبيبك، الصيدلي أو الممرضة. بما في ذلك أية أعراض جانبية محتملة لم تذكر في هذه النشرة. أنظر الفقرة 4.

**معلومات هامة اقرأها بتمعن**

- بالإمكان حقن المستحضرات نيوڤوجين 30 MU محقنة جاهزة للإستعمال، نيوڤوجين 48 MU محقنة جاهزة للإستعمال بشكل ذاتي في بيتك بعد تلقي توجيه من الطاقم الطبي. الرجاء إقرأ بتمعن تعليمات الحقن الذاتي لـ نيوڤوجين محقنة جاهزة للإستعمال المذكورة في نهاية هذه النشرة.
- إن حقن المستحضر نيوڤوجين 30 قناني تتم من قبل شخص من الطاقم الطبي فقط.
- إن التقيد بإرشادات الطبيب (المقدار الدوائي، مواعيد الحقن وفترة العلاج) تزيد من فرص نجاح العلاج. على أية حال، لا يجوز التوقف عن العلاج بدون إستشارة الطبيب المعالج. لمزيد من معلومات الأمان، الرجاء قراءة الفقرات 2 و- 4 بتمعن.
- يجب إجراء فحوص منتظمة للدم خلال فترة العلاج.
- يجب حفظ الدواء نيوڤوجين في البراد (أنظر الفقرة 5).
- الدواء نيوڤوجين مخصص للإستعمال لمرة واحدة!

**1) لأي غرض مخصص الدواء؟**

الدواء نيوڤوجين هو عبارة عن عامل نمو لخلايا الدم البيضاء من نوع المحبيات (G-CSF = granulocyte-colony stimulating factor) وهو ينتمي إلى فصيلة الأدوية المسماة سيتوكينات. عوامل النمو هي عبارة عن بروتينات تنتج بشكل طبيعي في الجسم، لكن يمكن إنتاجها أيضاً بالوسائل التقنية الحيوية للإستعمال الدوائي.

يعمل الدواء نيوڤوجين بواسطة تحريض نخاع العظم على إنتاج خلايا دم بيضاء أكثر. إن إنخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (neutropenia) يمكن أن ينتج من عدة أسباب وهو يقلل من قدرة جسمك على محاربة التلوثات. الدواء نيوڤوجين يحرض نخاع العظم على إنتاج خلايا دم بيضاء جديدة بسرعة.

يمكن أن يستعمل نيوپوجين:

- لزيادة عدد خلايا الدم البيضاء بعد علاج كيماوي، وذلك للمساعدة على منع حدوث تلوثات.
- لزيادة عدد خلايا الدم البيضاء بعد عملية زرع نخاع العظم، وذلك للمساعدة على منع حدوث تلوثات.
- بمقدار دوائي مرتفع قبل العلاج الكيماوي، وذلك لتحريض نخاع العظم على إنتاج خلايا جذعية بشكل أكثر، التي يمكن جمعها وإعادتها إليك بعد العلاج. بالإمكان أخذها منك أو من متبرع. تعاد الخلايا الجذعية بعد ذلك إلى داخل نخاع العظم وتنتج خلايا الدم.
- لزيادة عدد خلايا الدم البيضاء إذا كنت تعاني من نقص الكريات البيضاء المعتدلة المزمن الخطير (SCN = Severe Chronic Neutropenia)، وذلك للمساعدة على منع حدوث تلوثات.

الفصيلة العلاجية: من السيتوكينات.

(2) قبل استعمال الدواء

X لا يجوز استعمال نيوپوجين إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة فيلجراستيم Filgrastim أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفقرة رقم 6 - «معلومات إضافية»).

! تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل استعمال نيوپوجين، تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو الممرضة.  
الرجاء بلغ طبيبك قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني من:

- فقر الدم المنجلي، وذلك لأن نيوپوجين قد يؤدي لحدوث أزمة فقر دم منجلي (sickle cell crisis).
- حساسية للمطاط الطبيعي (لاتكس). إن غطاء الإبرة الموجود على المحقنة قد يكون مصنوع من نوع من المطاط الطبيعي وقد يسبب ردود فعل تحسسية.
- مرض هشاشة العظام (osteoporosis) (مرض عظمي).

الرجاء بلغ طبيبك على الفور خلال فترة العلاج بـ نيوپوجين إذا:

- ظهرت علامات مفاجئة لتحسس، مثل طفح، حكة أو شرى على الجلد، إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو أجزاء أخرى من الجسم، ضيق تنفس، صفير أو صعوبات في التنفس، وذلك لأنها يمكن أن تكون علامات لرد فعل تحسسي شديد (فرط حساسية).
- لاحظت إنتفاخ في الوجه أو في الكاحلين، دم في البول أو بول بلون بني أو إذا كنت تتبول أقل من المعتاد (إلتهاب كبيبات الكلية).
- كنت تعاني من ألم في القسم العلوي الأيسر من البطن، ألم من تحت الجانب الأيسر للقصص الصدري أو في القسم العلوي من الكتف الأيسر (قد تكون هذه أعراض لتضخم الطحال [splenomegaly]، أو إمكانية لتمزق الطحال).
- لاحظت نزف أو كدمة شاذين (قد تكون هذه أعراض لإنخفاض عدد الصفيحات الدموية [thrombocytopenia]، مع تناقص قدرة دمك على التخثر).
- بلغ عن حدوث إلتهاب الأبهري (الوعاء الدموي الكبير الذي ينقل الدم من القلب إلى الجسم) بشكل نادر لدى مرضى السرطان والمتبرعين الأصحاء. الأعراض يمكن أن تشمل سخونة، ألم في البطن، ضعف عام، ألم في الظهر وإرتفاع مؤشرات الإلتهاب. أخبر الطبيب إذا كنت تقاسي من تلك الأعراض.

الأطفال والمراهقون

يستعمل الدواء نيوپوجين لعلاج الأطفال الذين يتلقون علاج كيماوي أو الذين يعانون من تعداد منخفض وخطير لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات). إن المقدار الدوائي لدى الأطفال الذين يتلقون علاج كيماوي مطابق للمقدار الدوائي لدى الكبار.

الفحوص والمتابعة

من الموصى به إجراء فحوص دورية لحالة نخاع العظم خلال فترة العلاج بـ نيوپوجين، وذلك إذا كنت تعاني من نقص كريات الدم البيضاء المعتدلة المزمن الخطير (severe chronic neutropenia).

## إنعدام الإستجابة لـ فيلجراستيم

إذا كنت لا تستجيب بعد أو إذا كنت غير قادر على المحافظة على الإستجابة للعلاج بـ فيلجراستيم، يقوم طبيبك بفحص أسباب ذلك، بما في ذلك إذا تطورت لديك أضداد التي تبطل عمل فيلجراستيم.

من الجائز أن يرغب طبيبك بمتابعة ومراقبة وضعك بشكل حثيث، أنظر الفقرة 4 من نشرة المستهلك.

إذا كنت مريضاً بنقص الكريات الدم البيضاء المعتدلة المزمن الخطير، فأنت قد تكون معرض لخطورة تطوير سرطان الدم (إبيضاض الدم، متلازمة سوء النمو النخاعي [MDS = Myelodysplastic syndrome]). عليك التحدث مع طبيبك حول مخاطر تطوير أنواع من سرطان الدم وأية فحوصات يتوجب إجراؤها. إذا تطور لديك، أو كنت معرض لخطورة تطوير أنواع من سرطان الدم، فلا يجوز استعمال الدواء **نيو بوجين** إلا إذا أوصاك الطبيب بشكل صريح.

إذا كنت متبرع لخلايا جذعية، فعليك أن تكون بين الأعمار 16 حتى 60 سنة.

## يجب إتخاذ الحذر الزائد عند استعمال أدوية أخرى تحرض إنتاج خلايا دم بيضاء

**نيو بوجين** هو دواء واحد من بين مجموعة من الأدوية التي تحرض على إنتاج خلايا دم بيضاء. يتوجب على فرد الطاقم الطبي أن يدون دائماً الدواء الذي تستعمله بالضبط.

## الأدوية الأخرى و نيو بوجين

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً، أو من الجائز أن تتناول أية أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، بلغ طبيبك أو الصيدلي عن ذلك. لا يجوز بدء العلاج بـ **نيو بوجين** قبل 24 ساعة وحتى 24 ساعة بعد تلقي العلاج الكيماوي.

## الحمل و الإرضاع

لم يتم فحص الدواء **نيو بوجين** لدى النساء الحوامل أو المرضعات.

لا يوصى باستعمال **نيو بوجين** خلال فترة الحمل.

إذا كنت في فترة الحمل، الرضاعة، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك قبل استعمال هذا الدواء. إذا أصبحت حامل خلال فترة العلاج بـ **نيو بوجين**، الرجاء بلغي طبيبك.

يتوجب عليك التوقف عن الإرضاع إذا كنت تستعملين **نيو بوجين**، إلا إذا أوصاك الطبيب بشيء مغاير.

## السياقة وإستعمال الماكينات

قد يكون لـ **نيو بوجين** تأثير بسيط على قدرتك على السياقة وعلى استعمال الماكينات. قد يؤدي هذا الدواء لحدوث دوار. يوصى بالإننتظار وروية كيفية شعورك بعد استعمال **نيو بوجين** وقبل أن تقوم بالسياقة أو تشغيل الماكينات.

## معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

### يحتوي نيو بوجين على صوديوم

يحتوي **نيو بوجين** على أقل من 1 ميلليمول (23 ملغ) صوديوم بـ 0.3/0.6/0.96 ملغ/مل، أي أنه خال من الصوديوم.

### يحتوي نيو بوجين على سوربيتول

يحتوي هذا الدواء على 50 ملغ سوربيتول بكل مل.

سوربيتول هو مصدر للفروكتوز. إذا وجد لديك (أو لدى طفلك) عدم تحمل وراثي للفروكتوز

([HFI] hereditary fructose intolerance)، إضطراب وراثي نادر، فممنوع عليك (أو على طفلك) تلقي هذا الدواء.

إن المتعالجين الذين يعانون من عدم تحمل وراثي للفروكتوز غير قادرين على تفكيك الفروكتوز، وقد يؤدي هذا الأمر إلى أعراض جانبية خطيرة.

عليك إبلاغ طبيبك قبل تلقي هذا الدواء إذا وجد لديك (أو لدى طفلك) عدم تحمل وراثي للفروكتوز أو إذا كان طفلك غير قادر على إستهلاك الأغذية أو المشروبات الحلوة لأن ذلك يسبب له الشعور بغثيان، تقيؤ أو أعراض غير مستحبة مثل نفخة، تقلصات في البطن أو إسهال.

### (3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال هذا الدواء دائماً كما أوصاك طبيبك بالضبط. عليك الإستيضاح من طبيبك، الممرضة أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

#### كيف يعطى نيوبوجين وكم يتوجب على استعماله؟

يعطى الدواء نيوبوجين عادة كحقنة يومية لداخل النسيج الموجود من تحت الجلد (تعرف كحقنة تحت الجلد). ويمكن أن يعطى أيضاً بالحقن اليومي بشكل بطيء لداخل الوريد (يعرف بالترسيب الوريدي). المقدار الدوائي الإعتيادي يتغير بحسب مرضك ووزن جسمك.

المتعالجون الذين يجتازون عملية زراعة لنخاع العظم بعد علاج كيماوي:

سنتلقى عادة المقدار الدوائي الأول من نيوبوجين بعد 24 ساعة على الأقل من العلاج الكيماوي وبعد 24 ساعة على الأقل من عملية زرع نخاع العظم.

يمكنك أنت، أو الأشخاص الذين يعالجوك، تعلم كيفية الحقن من تحت الجلد، بحيث يمكنك مواصلة علاجك في البيت. ولكن، لا تحاول فعل ذلك إلا إذا تلقيت مسبقاً توجيهاً مناسباً من قبل فرد من الطاقم الطبي.

**لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به**

#### لأي فترة من الزمن يتوجب على استعمال نيوبوجين؟

أنت ستحتاج إلى استعمال نيوبوجين إلى أن يصبح تعداد خلايا الدم البيضاء لديك سليم. ستجرى لك فحوص دم منتظمة وذلك لمراقبة عدد خلايا الدم البيضاء بجسمك. يخبرك طبيبك لأي فترة من الزمن ستحتاج إلى استعمال نيوبوجين.

#### إذا استعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

لا تقم برفع المقدار الدوائي الذي وصفه لك طبيبك. إذا كنت تعتقد بأنك قمت بحقن أكثر من المطلوب، راجع طبيبك بأسرع ما يمكن. إذا استعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

#### إذا نسيت استعمال نيوبوجين

إذا فرت حقنة واحدة، أو إذا قمت بحقن أقل من اللازم، إتصل بطبيبك بأسرع ما يمكن. لا تستعمل مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن أي مقادير دوائية منسية.

يجب المواظبة في العلاج كما أوصيت به من قبل الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة نتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، اسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

### (4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال نيوبوجين قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

**يجب التوجه إلى الطبيب في الحال إذا كنت تلاحظ إحدى الأعراض التالية:**

- إذا كنت تقاسي من رد فعل تحسسي الذي يشمل: ضعف عام، انخفاض ضغط الدم، صعوبات في التنفس، إنتفاخ الوجه (تأق)، طفح جلدي، طفح حاك (شرى)، إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة (وذمة وعائية) وضيق تنفس (dyspnea).

- إذا كنت تعاني من سعال، سخونة وصعوبات في التنفس (dyspnea)، التي يمكن أن تشكل علامة لمتلازمة من نوع ARDS (متلازمة ضائقة تنفسية حادة - Acute Respiratory Distress Syndrome).
- إذا قاسيت من ضرر في الكلى (التهاب كبيبات الكلية). لوحظ حدوث ضرر في الكلى لدى مرضى تلقوا **نيو بوجين**. إتصل بطبيبك حالاً إذا لاحظت إنتفاخ في الوجه أو في الكاحلين، دم في البول أو بول بلون بني أو إذا كنت تتبول أقل من المعتاد.
- إذا وجدت لديك إحدى الأعراض الجانبية التالية أو مزيج لعدد منها:
  - إنتفاخ أو إمتلاء التي قد تكون ذات صلة بمرور الماء بوتيرة أقل، صعوبات في التنفس، إنتفاخ البطن والشعور بامتلاء، والشعور بإرهاق عام. هذه الأعراض تتطور عادة بشكل سريع.
  - يمكن أن تكون هذه أعراض لحالة تسمى "Capillary Leak Syndrome"، والتي تؤدي لتسرب الدم من الأوعية الدموية الصغيرة إلى داخل جسمك وتحتاج إلى علاج طبي طارئ.
- إذا وجد لديك مزيج لإحدى الأعراض التالية:
  - سخونة، أو رجفان، أو إذا كنت تشعر ببرد شديد، نظم قلب سريع، إرتباك أو توهان، ضيق في التنفس، ألم حاد أو إنزعاج وجلد رطب ودبق أو تعرق.
- قد تكون تلك أعراض لحالة تسمى "إنتان" (Sepsis - يسمى أيضاً "إنتان الدم")، تلوث خطير يترافق برد فعل إلتهابي لكافة الجسم الذي قد يشكل خطراً على الحياة ويتطلب علاجاً طبياً طارئاً.
- إذا كنت تعاني من آلام في القسم الأيسر العلوي من البطن، آلام من تحت القسم الأيسر للقفص الصدري، أو ألم في القسم العلوي من الكتف لأنه قد تكون لديك مشكلة في الطحال (تضخم الطحال [splenomegaly] أو تمزق الطحال).
- إذا كنت تتعالج من نقص الكريات البيضاء المعتدلة المزمن الخطير ولديك دم في البول (hematuria). فمن الجائز أن يقوم طبيبك بإجراء فحوص منتظمة للبول في حال معاناتك من هذا العرض الجانبي أو إذا وجد لديك بروتين في البول (proteinuria).

عرض جانبي شائع جداً عند إستعمال **نيو بوجين** هو ألم في العضلات أو في العظام (آلام في الجهاز العضلي - الهيكلي)، الذي يمكن التخفيف منه بواسطة تناول مسكنات آلام إعتيادية.

لدى المتعالجين الذين يجتازون عملية زرع للخلايا الجذعية أو عملية زرع نخاع العظم، قد يظهر مرض المسمى GvHD (Graft versus host disease) - في الواقع هذا رد فعل لخلايا المتبرع ضد المتعالج الذي يتلقى النسيج المزروع. العلامات والأعراض تشمل طفح على راحتي اليدين أو على راحتي القدمين وتقرح وجروح في الفم، في الأمعاء، في الكبد، في الجلد لديك أو في العينين، في الرئتين، في المهبل وفي المفاصل لديك.

قد يلاحظ لدى المتبرعين الأصحاء للخلايا الجذعية زيادة في خلايا الدم البيضاء (leukocytosis) وتناقص الصفيحات الدموية، يقلل ذلك من قدرة الدم لديك على التخثر (thrombocytopenia)، يقوم طبيبك بمراقبة ومتابعة هذه الأعراض.

#### أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 متعالجين):

- إنخفاض الصفيحات الدموية الذي يقلل من قدرة الدم على التخثر (thrombocytopenia)
- إنخفاض عدد كريات الدم الحمراء (فقر الدم)
- صداع
- إسهال
- تقبؤات
- غثيان
- تساقط غير عادي للشعر أو خفة الشعر (صلع)
- إرهاق (إنهاك)
- ألم وإنتفاخ في الطرق الهضمية الممتدة من الفم وحتى فتحة الشرج (التهاب الأغشية المخاطية)
- سخونة

### أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى 1 - 10 متعالجين من بين 100):

- التهاب الرئتين (bronchitis)
- تلوثات في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي
- تلوثات في المسالك البولية
- تناقص الشهية للطعام
- مشاكل في النوم (أرق)
- دوار
- إنخفاض حس الشعور، خاصة في الجلد (hypoesthesia)
- وخز أو تتمل (خدر) في راحتي اليدين أو القدمين (paresthesia)
- ضغط دم منخفض
- ضغط دم مرتفع
- سعال
- سعال دموي (hemoptysis)
- ألم في الفم والحنجرة (ألم فموي بلعومي)
- نزف من الأنف (epistaxis)
- إمساك
- ألم في الفم
- تضخم الكبد (hepatomegaly)
- طفح
- إحمرار الجلد
- تشنجات عضلية
- ألم عند التبول (dysuria)
- ألم في الصدر
- ألم
- ضعف عام (asthenia)
- شعور عام غير جيد (إنزعاج)
- إنتفاخ في اليدين وفي راحتي القدمين (وذمة محيطية)
- ارتفاع إنزيمات معينة في الدم
- تغيرات في كيمياء الدم
- رد فعل للتسريب

### أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى 1 - 10 متعالجين من بين 1000):

- ارتفاع في عدد خلايا الدم البيضاء (Leukocytosis)
- رد فعل تحسسي (فرط حساسية)
- رفض نخاع العظم المزروع (مرض GvHD = Graft versus host disease)
- ارتفاع نسب حمض البول في الدم، الذي قد يسبب مرض النقرس (gout) = hyperuricemia = ارتفاع حمض البول في الدم
- ضرر في الكبد ناتج عن إنسداد الأوردة الصغيرة داخل الكبد (Veno-occlusive disease)
- الرئتين لا تعملان كما هو مفترض، الأمر الذي يؤدي لحدوث ضيق تنفس (فشل تنفسي)
- إنتفاخ و/أو سوائل في الرئتين (وذمة في الرئتين)
- التهاب الرئتين (مرض رئوي خلالي)
- تصوير رنتجن غير سليم للرئتين (إرتشاح غير سليم إلى الرئتين)
- نزف من الرئتين (نزف رئوي)
- نقص إمتصاص الأكسجين في الرئتين (قلة الأكسجين)
- طفح يبدو مثل البقع وتدرن في الجلد (maculo-papular rash)

- مرض يؤدي إلى تناقص كثافة العظام، حيث تصبح أكثر ضعفاً، أكثر هشاشة وذات ميل للكسر (هشاشة العظام)
- رد فعل في منطقة الحقن

#### أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى 1-10 متعالجين من بين 10000):

- ألم شديد في العظام، في الصدر، في الأمعاء أو المفاصل (أزمة فقر دم منجلي)
- رد فعل تحسسي مفاجئ يشكل خطراً على الحياة (رد فعل تأقي)
- ألم وإنتفاخ في المفاصل، بما يشبه داء النقرس (Pseudogout)
- تغيير بطريقة تنظيم السوائل داخل جسمك الذي قد يؤدي لحدوث إنتفاخ (مشاكل في حجم السوائل)
- إلتهاب الأوعية الدموية في الجلد (vasculitis في الجلد)
- آفات مؤلمة وبارزة ذات لون مائل للبنفسجي على الأطراف وأحياناً على الوجه والعنق أيضاً، تترافق بسخونة (Sweet's syndrome)
- تفاقم إلتهاب المفاصل الروماتيزمي
- تغيير شاذ في البول
- إنخفاض كثافة العظم
- إلتهاب الأبهر (الوعاء الدموي الكبير الذي ينقل الدم من القلب إلى الجسم). أنظر الفقرة 2.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

#### التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### (5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يجب التخزين في البراد (بدرجة حرارة 2 - 8 درجة مئوية). لا يجوز التجميد.
- يجب حفظ الوعاء في العلبة الخارجية لحمايته من الضوء.
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على المحقنة أو القنينة وعلى علبة الكرتون. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لايجوز إستعمال هذا الدواء إذا كنت تلاحظ أي تغيير في لونه، عكر أو يحوي جزيئات. من المفترض أن يكون السائل رائق و عديم اللون.
- الدواء نيوپوجين - مخصص للإستعمال لمرة واحدة! إذا وصف لك مقدار دوائي أقل من الموجود في المحقنة أو في القنينة، يجب إتلاف ما تبقى بعد الحقن!
- لا يجوز رمي أية أدوية إلى المجاري أو القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال بعد. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

#### (6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Sorbitol, Glacial acetic acid, Polysorbate 80, Sodium hydroxide 1N ad pH 4, water for injection.

يحتوي الدواء على أقل من 1 ميلليمول (23 ملغ) صوديوم بـ 0.3/0.6/0.96 ملغ/ملل محلول.

يحتوي الدواء نحو 50 ملغ سوربيتول بـ 1 ملل محلول.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

الدواء **نيو بوجين** هو عبارة عن محلول رائق وعديم اللون مخصص للحقن تحت الجلد أو بالتسريب الوريدي. **نيو بوجين** متوفر ضمن قناني أو ضمن محقنة جاهزة للإستعمال مع إبرة منفردة. **نيو بوجين** 30 MU قناني - 30 MU/1 ml مسوق ضمن علبة تحتوي على خمسة قناني. **نيو بوجين** 30 MU محقنة جاهزة للإستعمال - 30 MU/0.5 ml مسوق ضمن علبة تحتوي على 1 أو 5 محاقن\* **نيو بوجين** 48 MU محقنة جاهزة للإستعمال - 48 MU/0.5 ml مسوق ضمن علبة تحتوي على 1 أو 5 محاقن\* \* من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

**المنتج:** أمجين يوروب بي. في.، بريداء، هولندا

**صاحب الإمتياز:** أمجين يوروب بي. في.، ص.ب.53313، تل أبيب.

**رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

**نيو بوجين** 30 MU محقنة جاهزة للإستعمال: 117 22 29875

**نيو بوجين** 48 MU محقنة جاهزة للإستعمال: 117 21 29876

**نيو بوجين** 30 MU قناني: 058 31 27318

تم إعدادها في آذار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

**تعليمات الحقن الذاتي للحقن من تحت الجلد لـ نيو بوجين محقنة جاهزة للإستعمال:**

**تعليمات الحقن:**

**نيو بوجين** 30 MU محقنة جاهزة للإستعمال

**نيو بوجين** 48 MU محقنة جاهزة للإستعمال

يحتوي هذا القسم على معلومات حول طريقة حقن **نيو بوجين** من محقنة جاهزة للإستعمال. **هام:** لا تحاول الحقن الذاتي إلا إذا تلقيت توجيهاً من طبيبك أو من الممرضة. إن حقن المستحضر من داخل قنينة **نيو بوجين** يتم من قبل فرد من الطاقم الطبي فقط. يتم حقن **نيو بوجين** لداخل النسيج الموجود من تحت الجلد. يعرف هذا الأمر بالحقن تحت الجلد.

**الأدوات التي ستحتاجها:**

الحقن الذاتي تحت الجلد، ستحتاج لـ:


- محقنة جديدة جاهزة للإستعمال من **نيو بوجين**،
- مناديل كحولية وما شابه.

**ماذا يتوجب علي فعله قبل أن أحقن لنفسي حقنة تحت الجلد من نيو بوجين؟**

- (1) أخرج من البراد لويحة واحدة تحتوي على محقنة ودعها بدرجة حرارة الغرفة حوالي 30 دقيقة أو إمسكها بيدك بلطف لمدة عدة دقائق. بذلك تسمح لعملية حقن مريحة أكثر. لا يجوز تسخين **نيو بوجين** بأية طريقة أخرى (مثلاً: لا يجوز التسخين بواسطة الميكروويف أو الماء الساخن).
- (2) لا يجوز خض المحقنة الجاهزة للإستعمال.
- (3) إمسك اللويحة بيدك وقشّر الورق عن اللويحة.
- (4) إقلب لويحة المحقنة الجاهزة للإستعمال وذلك لتحرير المحقنة لراحة يدك.
- (5) لا يجوز نزع غطاء الإبرة إلى أن تكون جاهزاً للحقن.
- (6) إفحص تاريخ إنتهاء الصلاحية على ملصقة المحقنة الجاهزة للإستعمال (EXP). لا تستعمل المحقنة إذا تجاوز التاريخ اليوم الأخير من الشهر المذكور.
- (7) إفحص مظهر الـ **نيو بوجين**. يجب أن يكون السائل رائق وعديم اللون. ممنوع إستعماله، إذا تغير لونه، إذا كان عكراً أو فيه جزيئات.



- (8) **إغسل يديك جيداً.**  
 (9) **أوجد لك مسطح مريح، مضاء جيداً ونظيف وضع كافة الأدوات التي ستحتاجها بمتناول اليد.**




### كيف يتوجب علي تحضير حقنة نيوپوجين الخاصة بي؟

قبل أن تحقن نيوپوجين يتوجب عليك تنفيذ العمليات التالية:

- (1) لتجنب ثني الإبرة، أمسك بشكل آمن المحقنة الجاهزة للإستعمال من الماسورة الزجاجية. إسحب بلطف الغطاء عن الإبرة من دون تدويره كما هو موضح في الرسوم 1 و- 2
- (2) لا يجوز ملامسة الإبرة أو دفع المكبس.
- (3) من الجائز أن تلاحظ فقاعة صغيرة من الهواء بالمحقنة الجاهزة للإستعمال. لا حاجة لإخراج فقاعة الهواء قبل الحقن. إن حقن المحلول مع فقاعة الهواء هو أمر غير ضار.
- (4) يمكنك الآن إستعمال المحقنة الجاهزة للإستعمال.

### أين يتوجب علي حقن الحقنة الخاصة بي؟

الأماكن الأفضل للحقن هي القسم العلوي من الفخذين والبطن. إذا تم الحقن لك من قبل شخص آخر، فبالإمكان الحقن أيضاً في القسم الخلفي لذراعك. يمكنك تغيير مكان الحقن إذا كنت تلاحظ إحمرار أو ألم في منطقة الحقن.



### كيف يتوجب علي حقن الحقنة الخاصة بي؟

- (1) قم بتعقيم جلدك بواسطة منديل كحولي وأقرص (من دون ضغط) الجلد بين إبهامك والسبابة.
- (2) أدخل الإبرة بكاملها لداخل الجلد كما أراك الممرضة أو الطبيب.
- (3) إدفع المكبس بضغط بطيء وثابت، حافظ على قرص جلدك طيلة الوقت، حتى فراغ المحقنة.
- (4) أخرج الإبرة ودع الجلد.
- (5) إذا لاحظت بقعة من الدم، يمكنك إزالتها بالربت اللطيف بكرة من القطن أو منديل. لا تفرك مكان الحقن. يمكنك تغطية مكان الحقن بـ بلاستر، إذا دعت الحاجة.
- (6) إستعمل كل محقنة لحقن واحد فقط. لا تستعمل النيوپوجين المتبقي داخل المحقنة.

**تذكر:** إذا واجهتك أية مشاكل، فلا تخشى طلب المساعدة والإستشارة من طبيبك أو من الممرضة.

### رمي المحاقن المستعملة

- لا يجوز إعادة الغطاء إلى الإبر المستعملة، لأنه قد تسبب الوخز الذاتي بالخطأ.
- يجب حفظ المحاقن المستعملة بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال.
- لا يجوز رمي المحاقن إلى القمامة المنزلية. الصيدلي الخاص بك يعرف كيفية التخلص من المحاقن المستعملة أو المحاقن التي لم تعد ضرورية بعد.