

سيروكويول XR™ سيروكويول XR™ 50 ملغ 150 ملغ 200 ملغأقراص ذات تحرير
مطولأقراص ذات تحرير
مطولأقراص ذات تحرير
مطولكل قرص يحتوي على:
كوبتيابين (كفومارات)
200 ملغ
Quetiapine
(as fumarate)
200 mgكل قرص يحتوي على:
كوبتيابين (كفومارات)
150 ملغ
Quetiapine
(as fumarate)
150 mgكل قرص يحتوي على:
كوبتيابين (كفومارات)
50 ملغ
Quetiapine
(as fumarate)
50 mg**سيروكويول XR™ سيروكويول XR™ 300 ملغ 400 ملغ**أقراص ذات تحرير
مطولأقراص ذات تحرير
مطولكل قرص يحتوي على:
كوبتيابين (كفومارات)
400 ملغ
Quetiapine
(as fumarate)
400 mgكل قرص يحتوي على:
كوبتيابين (كفومارات)
300 ملغ
Quetiapine
(as fumarate)
300 mg

لائحة المركبات غير الفعالة والتي تسبب المحساسية، الرجاء، أنظر البند 2 - "معلومات هامة حول بعض مكونات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية حتى نهايتها، قبل أن تستخدم الدواء. تتضمن هذه النشرة معلومات مختصرة عن الدواء. إذا راودتك أسئلة إضافية، فيرجى التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

تم وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه إلى أشخاص آخرين. فقد يضر بهم حتى إذا كنت تعتقد بأن مرضهم شبيه.

الدواء غير مخصص للأطفال ومرأهقين دون الـ 18 من العمر. الدواء ليس مخصصاً لكبار السن الذين يعانون من الفرف.

- تزيد الأدوية المضادة للاكتتاب والقلق من خطر السلوك والأفكار الانتحارية لدى الأطفال، والمرأهقين والبالغين الشباب بعمر يصل إلى 25 عاماً. بمجرد بدء العلاج بالدواء، يجب على المرضى مهما كانت أعمارهم وأقربائهم، متابعة التغيرات السلوكية مثل: تفاقم الاكتتاب، والأفكار الانتحارية، والتصرف العدواني وما شابه ذلك. في حال طرأت مثل هذه التغيرات، يجب التوجه إلى طبيب فوراً.
- المرضى من كبار السن الذين يعانون من ذهان مرتبط بالفرف والمريض الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان هم عرضة لخطر الموت بشكل زائد.

1. لما يخصن هذا الدواء؟

- علاج الفصام.
- لعلاج حالة الهوس المرتبطة بالإضطرابات ثنائية القطب.
- لعلاج الاكتتاب المرتبط بالإضطرابات ثنائية القطب.
- لعلاج الإكتتاب بمشاركة دواء إضافي لعلاج الإكتتاب.

المجموعة العلاجية:

من الأدوية المضادة للذهان.

2. قبل استخدام الدواء**X لا يجوز إستعمال سيروكويول XR إذا:**

- كنت حساساً (أليجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (الرجاء، أنظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- كنت تتناول أحد الأدوية التالية:
 - أدوية لمعالجة متلازمة الفشل المناعي المكتسب (HIV).
 - أدوية من فئة المضادات الفطرية (لعلاج حالات العدوى الفطرية).
 - إريثروميسين أو كلاريثروميسين (لعلاج حالات العدوى).
 - نيفازودون (لعلاج الإكتتاب).

إذا لم تكون متأكداً، فالرجاء التوجه إلى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول سيروكويول XR.

تحذيرات خاصة بشأن استخدام سيروكويول XR**■ قبل العلاج بسيروكويول XR، أخبر الطبيب إذا:**

- كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك يعاني أو عانى في الماضي من مشاكل في القلب، مثل اضطرابات في نظم القلب، ضعف أو إلتهاب عضلة القلب أو إذا كنت تتناول أدوية تؤثر على نظم القلب.

• كان لديك انخفاض ضغط الدم.

• حدثت لديك سكتة، بالأخص إذا كنت مسنّاً.

• كنت تعاني من مشاكل كبدية.

• كنت تعاني من الأختلاجات (الصرع) في أي وقت مضى.

• كنت تعاني من السكري أو كنت تتنمي إلى فئة معرضة لخطر الإصابة بالسكري. في مثل هذه الحالة، قد ينذر الطبيب إلى فحص مستويات السكر في دمك بينما يتم علاجك بسيروكويول XR.

• عانيت في الماضي من تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (الذي يمكن أن يمدد أو لا يحدث نتيجة إستعمال أدوية أخرى).

• لا يجوز تناول سيروكويول XR إذا كنت مسناً يعاني من الخرف (dementia)، نظراً لأن سيروكويول XR قد يزيد من خطورة حدوث سكتة، أو قد يزيد في حالات معينة من خطورة حدوث الوفاة لدى مسنين يعانون من الخرف.

• كنت مسناً مصاب بمرض باركنسون أو الباركنسونية.

• كان لديك أو لأحد أفراد عائلتك سابقة طبية لحدوث خثرات دموية، لأن أدوية من هذا النوع تساهم في تشكيل خثرات دموية.

• وجّد لديك أو كان لديك: حالة لإنقطاع في التنفس لفترة قصيرة أثناء النوم في الليل (يسمي إنقطاع التنفس apnea) وكانت تتناول أدوية التي تبطئ النشاط الإعتيادي للدماغ.

• وجّد لديك أو كان لديك: حالة من عدم القدرة على تفريح المثانة تماماً (إحباط البول)، تضخم غدة البروستات، إنسداد المعي أو إرتفاع في الضغط داخل العين. هذه حالات ناجمة أحياناً عن أدوية (تسمى الأدوية المضادة للفعل الكوليبي) التي تؤثر على الطريقة التي تعمل فيها الخلية العصبية وذلك بفرض معالجة أي حالة طيبة.

• لديك سابقة من الإدمان على الكحول أو الأدوية.

• لديك ضربات قلب سريعة وغير منتظمة حتى عندما تكون مرتاحاً، خفقان قلب، مشاكل في التنفس، ألم في الصدر أو إرهاق غير مبرر. سيمتاج طيبك إلى فحص قلبك، وإذا لزم الأمر، سيميلك إلى طبيب قلب على الفور.

بلغ الطبيب بشكل فوري إذا كنت تشعر بواحد مما يلي بعد تناول سيروكويول XR:

• مزج من سخونة، تصلب عضلي شديد، تعرق أو تدني الوعي (هذه ظاهرة تسمى "neuroleptic malignant syndrome"). من الجائز أن تتطلب علاجاً طبياً طارئاً.

• الحركات الإرادية، لا سيما في الوجه واللسان.

• دوار، شعور شديد بالنعاس، الأمر الذي يمكن أن يزيد من خطورة حدوث سقوط عفوياً لدى الأشخاص المسنين.

• نوبة صرع (اختلالات).

إنتصاب متواصل ومؤلم.

بلغ الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تشعر بواحد مما يلي بعد تناول سيروكويول XR:

• سخونة، علامات إنفلونزا، ألم في المجنحة أو أي إلتهاب آخر، لأن الأمر يمكن أن يكون نتيجة نسبة منخفضة جداً في تعداد كريات الدم البيضاء، الأمر الذي من الجائز أن يتطلب التوقف عن العلاج بسيروكويول XR و/أو إعطاء العلاج.

• إمساك مع ألم متواصل في البطن، أو إمساك الذي لم يستجيب لعلاج دوائي، الأمر يمكن أن يؤدي إلى حالة أخطر لإنسداد الأمعاء.

أفكار انتحارية وتفاقم الإكتتاب

إذا كنت تعاني من الإكتتاب، فقد تخطر ببالك أحياناً الأفكار الانتحارية. إزدياد في الأفكار الإنتحارية يمكن أن يحدث في بداية العلاج بسيروكويول XR، لأنه يستغرق وقتاً حتى يبدأ الدواء بالتأثير، ما يقارب الأسابيع وأحياناً أكثر من ذلك. وقد تزداد هذه الأفكار كذلك إذا توقفت عن تناول العلاج بشكل مفاجئ.

هذه الأفكار شائعة أكثر لدى البالغين الشasan. لقد أظهرت معلومات من أبحاث سريرية زيادة في الخطورة لحدوث أفكار إنتحارية و/أو سلوك إنتحاري لدى البالغين

الشasan دون عمر 25 سنة الذين يعانون من الإكتتاب.

