

## ساندوستاتين 0.05 ملغم/مل، محلول للحقن/لتسريب

المادة الفعالة وكميتها:  
تحتوي كل أمولية ذات 1 مل على 0.05 ملغم أوكتريوتيد (octreotide 0.05 mg)

## ساندوستاتين 0.1 ملغم/مل، محلول للحقن/لتسريب

المادة الفعالة وكميتها:  
تحتوي كل أمولية ذات 1 مل على 0.1 ملغم أوكتريوتيد (octreotide 0.1 mg)

## ساندوستاتين 0.5 ملغم/مل، محلول للحقن/لتسريب

المادة الفعالة وكميتها:  
تحتوي كل أمولية ذات 1 مل على 0.5 ملغم أوكتريوتيد (octreotide 0.5 mg)

المواد غير الفعالة ومسبيات الحساسية: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية". انظر أيضاً البند "معلومات مهمة عن قسم من مركيّات الدواء".

اقرأ النشرة بامتعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ذلك، تم الإبلاغ عن بعض الأدوية مثل سيميتدين (cimetidine)، سيكلاسيبرين (cycloropine)، بروموكريپتين (bromocriptine)، كيندين (quinidine) ونيفانيدين (terfenadine) أنها تأثير بساندوستاتين.

إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخراً أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخرب الطبيب أو الصيدلي بذلك.

تشكل عام، يمكن أن تواصل تناول أدوية أخرى أثناء علاج بساندوستاتين. مع ذلك، تم الإبلاغ عن بعض الأدوية مثل سيميتدين (cimetidine)، سيكلاسيبرين (cycloropine)، بروموكريپتين (bromocriptine)، كيندين (quinidine) ونيفانيدين (terfenadine) أنها تأثير بساندوستاتين.

إذا كنت تتناول دواء لضبط ضغط دمك (مثل: حاصرات بيتا أو حاصرات قنوات الكالسيوم) أو إذا كنت تتناول مسحaura لضبط توازن السائل والكهارل، فقد يحتاج طببك إلى ملامعة الجرعة.

إذا كنت تناول دواء بساندوستاتين، فقد يضرط طببك إلى ملامعة جرعة الإنسان التي تتناولها.

إذا كنت على شوك تأثير لوتشيوم (<sup>177</sup>Lu) أوكسودريوتيد (<sup>177</sup>Lu oxodotriotide) ملامعة العلاج بساندوستاتين.

يمكن السيطرة على مرضهم إلى حد كافٍ على ملامعة جرعة أو علاج إشعاعي. العلاج بساندوستاتين معد أيضاً للمرضى الذين لديهم تضخم الأطراف غير الملامين أو غير المستعدين لاستئصال عملية جراحية، أو أنهem يمررون بفترة مرحلية حتى يصبح العلاج الإشعاعي ناجحاً بشكل كامل.

تخفيض دose الأعراض المرتبطة بأورام وظيفية متعلقة بالغدد الصماء في المعدة، الأمعاء والبنكرياس (GEP):

- أورام سرطانية ذات خصائص متلازمة سرطانية (VIPomas)
- أورام فيبوما (VIPomas)
- أورام غلووكاغونية (Glucagonomas)

متلازمة زولينجير إيليسون (Zollinger-Ellison syndrome) بالدمج غالباً مع علاج بمثبطات مضخة البروتون أو مهانهضات H<sub>2</sub> أو رام انسولينية، لمراقبة اخفاض مستوى السكر في الدم قبل عملية جراحية ولعلاج الصيادة (GRFomas).

ليس علاجاً ماضداً للسرطان ولا يعالج هؤلاء المرضى.

إدارة حالة الطوارئ بسبب انتفاف من دوالي في المعدة أو المريء الثانوية لتأثیر الكبد بالدمج مع علاج مهدد مثل المعالجة بالتصليب (sclerotherapy) عبر المناظر.

## المجموعة العلاجية:

نظائر السوماتوستاتين

ساندوستاتين هو مرکب اصطناعي مشتق من سوماتوستاتين. سوماتوستاتين موجود غالباً في جسم الإنسان، وهو يثبط تأثير هرمونات معينة مثل هرمون النمو. يعتمد ساندوستاتين بجزءاً أكبر من سوماتوستاتين، إذ إنه أقل فعالية وفترة تأثيره أقصر.

تضخم الأطراف هو حالة تُنتج فيها الجسم فائضاً من هرمون النمو. يضغط هرمون النمو عادة نحو الأنسجة، الأعضاء، والعظام. يؤدي فرط هرمون النمو إلى زيادة حجم العظام والأنسجة، لا سيما في كتفي اليدين والقدمين. يُقلل ساندوستاتين بشكل كبير أعراض تضخم الأطراف، التي تشمل على صداع، تعرق مفتوح، نقص الشعور في كتفي اليدين والقدمين، تعب، وألم في المفاصل.

تخفيض الأعراض المرتبطة ببعض الأورام في الجهاز الهضمي: في هذه الحالات، تزداد رغبة في اتّاج هرمونات معينة ومواد أخرى في المعدة، الأمعاء أو البنكرياس.

تؤدي هذه الحالة إلى احتلال التوازن الهرموني الطبيعي في الجسم، وإلى حدوث عدد من الأعراض مثل: أحمرار الوجه، إسهال، ضغط دم منخفض، تعرق، وانخفاض الوزن. يساعد العلاج بساندوستاتين في السيطرة على هذه الأعراض.

من حدوث مضاعفات يسبب عملية جراحية في البنكرياس: يساعد العلاج بساندوستاتين على خفض خطر التعرض للمضاعفات (متلا: دمل في البطن، التهاب البنكرياس) بعد عملية جراحية.

إدارة حالة طارئة بسبب انتفاف من دوالي في المعدة أو المريء: يساعد العلاج بساندوستاتين في السيطرة على الأنزفه، ويقلل الحاجة إلى تسريب دم بسبب دوالي في المعدة أو المريء لدى مرضى يعانون من تأثیر الكبد (مرض مزم من في الكبد).

## 2. قيل استعمال الدواء إذا:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت حساساً (لديك حساسية) لأوكتريوتيد أو لكل واحد من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

قبل بدء العلاج بساندوستاتين أغير الطبيب إذا:

- كنت تعرف أن لديك حالياً حسبي في المراة، أو إذا كانت لديك سابقاً أو إذا كنت

قلبية، انخفاض تزويد الأكسجين إلى الدماغ، ألم خطير في الجزء العلوي من البطن، دوالي، حكة في الجلد؛

- ضيق في التنفس؛

- ضعف.

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

هذا الشخص يعانون من آلام في منطقة الحقن تحت الجلد. يستمر هذا الألم غالباً وقتاً قصيراً فقط. إذا اخبرت هذه الحالة، يمكنك تخفيف الألم عبر فرك منطقة الحقن برفق لبعض ثوان بعد الحقن.

إذا كنت تتناول بساندوستاتين بالحقن تحت الجلد، قد يساعد تجنب تناول الوجبات في وقت قريب من موعد الحقن على تقليل خطر حدوث أعراض جانبية في جهاز المضم. لهذا يوصي بحقن ساندوستاتين بين الوجبات أو عندما تأخذ اللوم.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة il (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمار على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيف يُخَرِّن الدواء؟

تحبب التسمم! يجب فقط هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي وعمران رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التسمم دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يمثل استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) (الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

**شروط التخزين:**  
يجب التخزين في الثلاجة (2-8°C).  
يُمنع التجميد.

يجب حمايته من الضوء.  
لا تستعمل اليومي يمكن تخزين المستحضر حتى أسبوعين بدرجة حرارة لا تتعدي 30°C ومحفظته من الضوء.  
يجب استعمال الأمولية بعد فتحها فوراً.  
يجب استعمال المحلول الذي تم حفظه بعد تحضيره فوراً (غير ترتيب وردي).  
لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا لاحظت أنه يتضمن جزيئات أو إذا طرأ تغيير على لونه.  
لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في الفيارات المنزلية. يجب استشارة الصيدلي لمعرفة أين يمكنك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه التدابير في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:  
Mannitol, lactic acid, sodium hydrogen carbonate, water for injections

**كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:**  
أمولية ذات 1 مل، زجاجية، عديمة اللون مع حلقات ملوتين تحتوي على محلول شفاف وعديم اللون:

ساندوستاتين 0.05 ملغم/مل: حلقة واحدة لونها أزرق وحلقة لونها أصفر  
ساندوستاتين 0.1 ملغم/مل: حلقة واحدة لونها أزرق وحلقة لونها أخضر  
ساندوستاتين 0.5 ملغم/مل: حلقة واحدة لونها أزرق وحلقة لونها ذهبي  
تحتوي كل عبوة على 5 أمولات.

**صاحب التسجيل والمصنور:**  
نوفارتيتس إسرائيل، مرض، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم تحريرها في كانون الأول 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:  
ساندوستاتين 0.05 ملغم/مل: 047 03 25697  
ساندوستاتين 0.1 ملغم/مل: 047 01 25698  
ساندوستاتين 0.5 ملغم/مل: 107 13 27200  
تنبيه قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكرة. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.

قلبية، انخفاض تزويد الأكسجين إلى الدماغ، ألم خطير في الجزء العلوي من البطن، دوالي، حكة في الجلد، فقدان الشهية، إسهال، ضعف، تعب، نقص الطاقة، انخفاض الوزن، تورم البطن، ازدحام، مستويات مرتفعة من حمض اللاكتيك في الدم وزيادة نظم قلب غير سليمة.

إذا كنت تعتقد أنك حصلت على جرعة مفرطة، وإذا شعرت بأعراض كهذه، أخبر طببك حالاً.

إذا حقن الدواء لطفل عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء احقن جرعة واحدة فور تذكرك، ثم تابع كالمعتاد.

إن يحدث أي ضرر إنما تعود إلى برنامجك العلاجي الأعادي.

لا يجوز حقن جرعة مفرطة من ساندوستاتين تعويضاً عن الجرعات الفردية المناسبة.

يجب المداومة على العلاج وفقاً لوصيحة الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إذا توقفت عن علاجك بساندوستاتين، فقد تظهر الأعراض لديك مجدداً. لهذا، لا يجوز لك التوقف عن العلاج بساندوستاتين إلا إذا أوصى لك طببك بذلك.

يمتعن تناول الدواء في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواع، وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلنة أخرى بالنسبة إلى استعمال الدواء، استشير الطبيب، الصيدلي أو المرضي الخاص بك.

### 4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال ساندوستاتين أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين.

لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتل إلا تعاني من أي منها.

قد يكون بعض الأعراض الجانبية خطيرة. أخبر طببك فوراً إذا تعرضت لأحد الأعراض التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة)  
- ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-15% من مستعملين من بين 100)  
- قصور عمل الغدة الدرقية (hypothyroidism) يؤدي إلى تغييرات في وقيرة نظم القلب، في الشهية أو الوزن، تعب، شعور بالبرد أو تورم الجزء الأمامي من العنق؛

- تغيرات في حوصلات الأداء (cholecystitis): قد تشتمل الأعراض على ألم في البطن في الجهة اليمنى العلية، حمى، غثيان، اصغرار الجلد والعيين (بركان)؛

ـ طرأ انخفاض كبير على مستوى السكر في الدم؛  
- خلل في تحمل الجلوكوز؛

- وتيرة نظم قلب سريعة.

أعراض جانبية خطيرة أخرى  
- ردود فعل فرط التحسس (ارجية) تشتغل على طفح جلدي؛

- نوع من رد الفعل التحسسي (anaphylaxis) الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو الابتلاع أو التنفس، تورم واسع، قد يطرأ انخفاض على ضغط الدم مع دوخة أو فقدان الوعي؛

- التهاب الكبد (hepatitis) (pancreatitis): قد تتضمن الأعراض ألمًا فجائيًا في البطن العلوي، غثيان، تقيؤ، فقدان الشهية، شعور عام سيء، حكة، بول لونه فاتح؛

- وتيرة نظم قلب غير منتظمة؛  
- انخفاض تعداد الصفائح الدموية: قد يؤدي إلى نزيف شديد أو إلى كدمات؛

- تورم وبروز مناطق على سطح الجلد تسبب حكة بدرجة كبيرة (شرى).

آخر طببك فوراً إذا لاحظت أحد الأعراض المذكورة أعلاه.

أعراض جانبية إضافية:  
آخر الطبيب، الصيدلي أو المرضي الخاص بك إذا إذا اخترت أحد الأعراض الجانبية المضمنة أدناه، تكون هذه الأعراض معتدلة غالباً وتختفي مع تقديم العلاج.

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة)  
- اسهال؛  
- ألم في البطن؛

- غثيان؛  
- إمساك؛  
- تكثس غازات في الجهاز الهضمي؛

- صداع؛  
- ألم موضعي في منطقة الحقن.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-15% من مستعملين من بين 100)  
- ازدحام في البطن بعد تناول الطعام (dyspepsia)؛

- تقيؤ؛  
- شعور بامتلاء البطن؛  
- براز دهني؛  
- براز مائي؛  
- تغيرات في لون البراز؛

- دوخة؛  
- فقدان الشهية؛  
- تغيرات في فحوصات أداء الكبد؛

تعاني من مضاعفات مثل حمى، قشعريرة، ألم في البطن أو اصفرار الجلد أو العينين، لأن استعمال ساندوستاتين يشكل متواصل قد يؤدي إلى تكون حسبي في المراة. قد يرغم طببك في فحص كيس المراة لديك بشكل دوري.

كانت تعرف أنك تعاني من مشكل في مستويات السكر في الدم، مستويات مرتفعة (hypoglycemia) أو منخفضة جداً (B12)، عند استعمال ساندوستاتين لعلاج ازفافه.

أثرت ازفافه على المعدة أو المريء، يجب متابعة مستويات السكر في الدم.

كان لديك تاريخ من نقص فيتامين B12، قد يرغم طببك في فحص مستوى دلك.

قد يسبب أوكتريوتيد انخفاض وقيرة نظم قلب غير سليم. قد يجرؤ طببك متابعة لوقيرة نظم قلبك خلال العلاج.

الاطفال والمرأهون

هناك تجربة قليلة حول استعمال ساندوستاتين لدى الأطفال.

الحفوصات والمتابعة

إذا كنت تناول علاجاً بساندوستاتين لفترة طويلة، فقد يرغم طببك في فحص أداء الغدة الدرقية لديك بشكل دوري.

سيفحص طببك أداء إنزيمات البنكرياس لديك.

قد يرغم طببك بان يفحص أداء إنزيمات البنكرياس لديك.

التفاعلات/اردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تناول أو تتناول، أو أخذت ملخصاً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية.

ويمكن أن تواصل تناول أدوية أخرى أثناء علاج بساندوستاتين.

إذا كنت تناول دواء لضبط ضغط دمك (مثل: حاصرات بيتا أو حاصرات قنوات الكالسيوم) أو إذا كنت تتناول مسحaura لضبط توازن السائل والكهارل، فقد يحتاج طببك إلى ملامعة الجرعة.

إذا كنت تناول ساندوستاتين أثناء الحمل فقط إذا كانت هناك حاجة مبررة لذلك.

على النساء في سن الإخصاب أن يستعملن وسيلة منع حمل ناجحة أثناء العلاج.

لا تجوز الرضاعة أثناء العلاج بساندوستاتين. ليس معروفاً فيما إذا كان ساندوستاتين يمر عبر حليب الأم.

السيف وساندوستاتين أثناء الحمل فقط إذا كانت هناك حاجة مبررة لذلك.

يجب استعمال المركبات (مرض كبد مزمن) فقد يضرط طببك إلى ملامعة جرعة الصيادة الخاصة بك.

عليك أن تفحص الطبيب أو المرضي إذا إذا م تكون متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريق العلاج بالمستحضر.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

وتقى الحالة التي تعي علاجها، يعطي هرمون النمو إلى زيادة حجم العظام والأنسجة، لا سيما في كتفي اليدين والقدمين. يُقلل ساندوستاتين بشكل كبير أعراض تضخم الأطراف، التي تشمل على صداع، تعرق مفتوح، نقص الشعور في كتفي اليدين والقدمين، تعب، وألم في المفاصل.

تخفيض الأعراض المرتبطة ببعض الأورام في الجهاز الهضمي: في هذه الحالات، تزداد رغبة في اتّاج هرمونات معينة ومواد أخرى في المعدة، الأمعاء أو البنكرياس.

تؤدي هذه الحالة إلى احتلال التوازن الهرموني الطبيعي في الجسم، وإلى حدوث عدد من الأعراض مثل: أحمرار الوجه، إسهال، ضغط دم منخفض، تعرق، وانخفاض الوزن.

يساعد العلاج بساندوستاتين في السيطرة على هذه الأعراض.

من حدوث مضاعفات يسبب عملية جراحية في البنكرياس: يساعد العلاج بساندوستاتين على خفض خطر التعرض للمضاعفات (متلا: دمل في البطن، التهاب البنكرياس) بعد عملية جراحية.

إدارة حالة طارئة بسبب انتفاف من دوالي في المعدة أو المريء: يساعد العلاج بساندوستاتين في السيطرة على الأنزفه، ويقلل الحاجة إلى تسريب دم بسبب دوالي في المعدة أو المريء لدى مرضى يعانون من تأثیر الكبد (مرض مزم من في الكبد).

## 2. قيل استعمال الدواء إذا:

لا يجوز استعمال الدواء إذا: