

טאד 100 תרסיס

החומר הפעיל: Lidocaine 9.6%

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר: ראה פרק 6 "מידע נוסף"

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתכשיר

שמור על עלון זה יתכן ותצטרך לקרוא בו שוב.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
אם תופעת הלוואי שהופיעה כתוצאה מהטיפול מחמירה, או הופיעו תופעות לוואי שאינן מוזכרות בעלון זה (ראה סעיף 4)
עליך לפנות לרופא או לרוקח.

עליך להשתמש תמיד בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף

1. למה מיועדת התרופה?

החומר הפעיל לידוקאין, הוא מאלחש מקומי המשמש להורדת דרגת הרגישות של איבר המין הגברי לפני קיום יחסי מין.
הירידה ברגישות עוזרת להשהיית השפיכה במקרים של שפיכה מאוד מהירה, או במקרים של שפיכה מוקדמת.

קבוצה תרפויטית: מאלחש מקומי

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה או בת/בן זוגך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל לידוקאין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף") אתה או בת/בן זוגך רגיש (אלרגי) למאלחשים מקומיים אחרים
--

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הנך סובל, או סבלת מבעיות כבד או כליות יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה.

אינטראקציות /תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח

רמות גבוהות של לידוקאין בדם, יכולים להגיב עם תרופות אחרות, למרות שהסבירות לכך נמוכה, בשל הספיגה הנמוכה לדם. יש להתייעץ עם הרופא במידה והנך נוטל תרופות אחרות, או השתמשת לאחרונה בתרופות אחרות.

דווחו תגובות בין תרופתיות עם תרופות אנטי-אריטמיות, תרופות לטיפול באפילפסיה (כפיון), תרופות אנטי-כולינרגיות, תרופות ליתר לחץ דם, ברביטוראטים, בטא בלוקרים, מרפי שרירים, ותרופות סימפטומימטיות.

בנוסף, דווחה השפעה על טסטים אבחנותיים לאנזימים בסרום.

הריון והנקה

למרות השימוש בתרופה הוא על איבר המין הגברי, אין להשתמש בתרופה, אם בת זוגך בהריון.

נהיגה ושימוש במכוונות

התרופה איננה משפיעה על יכולתך לנהוג או להפעיל מכוונות

3. כיצד תשתמש בתכשיר?

מס' ההתזות וזמן השימוש משתנים והם אינדיבידואליים לכל משתמש המינון המקובל הוא 3 עד 8 התזות לאורך, ובראש איבר המין הגברי, 5 עד 15 דקות לפני קיום יחסי מין. מס' ההתזות ופרק הזמן שיש להתיז את התרסיס לפני קיום יחסי המין יקבע באופן אינדיבידואלי על יד המשתמש. יש להשתמש במינון האפקטיבי הנמוך ביותר.

- אין להשתמש על עור סדוק או מודלק
- תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד, אין להתיז ליד העיניים והנחיריים.
- שטוף את שאריות הספריי לאחר קיום יחסי המין
- אין להשתמש בתרופה מעל לשלושה חדשים ללא התייעצות עם הרופא
- אין לעבור על 24 התזות ליממה (24 שעות).

קשישים

התרופה לא מומלצת לאנשים קשישים

אם הנך משתמש יותר מידי בתרופה

שימוש במינונים גבוהים לא מומלץ, עלול לגרום לגירוי או דיכוי מערכת העצבים המרכזית ולתופעות כמו עצבנות סחרחורת וכו' וכן תופעות של דיכוי המערכת הקרדיאלית. במקרה של חשד למינון יתר, פנה מיד לרופא

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא לסבול מאף אחת מהן.

אם התפתח אצלך או אצל בן/בת זוגך גירוי או פריחה, הפסק את השימוש בתרופה.

לא דווחו תופעות לוואי נוספות בתרופה, שכן כמויות קטנות ביותר של לידוקאין, החומר הפעיל, נספגות. אולם, רמות גבוהות של לידוקאין (פי 25 מהמינון היומי המומלץ) בדם, יכולות לגרום לתופעות לוואי כגון עצבנות, סחרחורת, עוויתות, איבוד הכרה, וכן השפעות על הלב והריאות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (il.gov.health) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25 °C אין לזרוק תכשירים לשירותים ולפח הזבל. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתכשיר שאין בו צורך יותר, ובכך תעזור לשמירת הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Isopropyl Myristate-diethylene glycol Monoethylether, Stearic Acid, Perfume 120

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
מיכל אלומיניום עם משאבה המשחררת מנה מדודה בכל התזה, ומכסה אלומיניום.

בעל הרישום וכתובתו: תרופארם שיווק 1985 בע"מ, ת"ד 8105, נתניה

שם היצרן וכתובתו: Pound International Ltd., Castle Keep, High Street, Deddington, Oxfordshire, OX15
0SJ, UK

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות: 133-05-24173-00

נערך באפריל 2022 בהתאם להנחיות משה"ב