

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טריטייס קומפ 2.5 מ"ג / 12.5 מ"ג טבליות
טריטייס קומפ 5 מ"ג / 25 מ"ג טבליות

חומרים פעילים:

כל טבליה של **טריטייס קומפ 2.5 מ"ג / 12.5 מ"ג** מכילה: רמיפריל 2.5 מ"ג + הידרוכלורוטיאזיד 12.5 מ"ג
Ramipril 2.5mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg

כל טבליה של **טריטייס קומפ 5 מ"ג / 25 מ"ג** מכילה: רמיפריל 5 מ"ג + הידרוכלורוטיאזיד 25 מ"ג
Ramipril 5mg + Hydrochlorothiazide 25mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 2 ("מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה") וסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת לטיפול ביתר לחץ דם במטופלים אשר לחץ הדם שלהם אינו ניתן לאיזון על ידי רמיפריל לבדו או הידרוכלורוטיאזיד לבדו.

קבוצה תרפויטית: מוריד לחץ דם, מקבוצת: מעכבי ACE + משתן תיאזידי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש לרמיפריל, או לתכשיר אחר מקבוצת מעכבי ACE, או להידרוכלורוטיאזיד, או למשתנים תיאזידיים אחרים, או לסולפונאמידים, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). סימנים לתגובה אלרגית יכולים לכלול: פריחה, קשוי בליעה או נשימה, נפיחות בשפתיים, בפנים, בגרון או בלשון.
- אם סבלת בעבר מתגובה אלרגית חמורה הנקראת אנגיואדמה. סימניה כוללים: עקצוץ, סרפדת (urticaria), כתמים אדומים על הידיים, הרגליים והצוואר, נפיחות בגרון ובלשון, נפיחות מסביב לעיניים ולשפתיים, קשוי נשימה ובליעה.
- אם נטלת בעבר או הנך נוטל סקוביטריל/וולסרטן, תרופה המשמשת לטיפול בסוג של אי-ספיקת לב כרונית במבוגרים.
- אם הנך עובר דיאליזה או כל סוג אחר של סינון דם. כתלות בסוג המכונה שבשימוש, ייתכן וטריטייס קומפ אינו מתאים לך.
- אם הנך סובל מבעיות כבד חמורות.
- אם הנך סובל מרמות לא תקינות של מלחים (סידן, אשלגן, נתרן) בדמך.
- אם הנך סובל מבעית כליה בה יש אספקת דם מופחתת לכליה שלך (היצרות בעורק הכליה) במהלך **ששת חודשי היריון האחרונים** (ראי סעיף "היריון, הנקה ופוריות" מטה).
- אם הנך מניקה (ראי סעיף "היריון, הנקה ופוריות" מטה).
- אם הנך סובל מסוכרת או מליקוי בתפקוד הכליות ומטופל בתרופה להורדת לחץ דם המכילה אליסקירן.

אל תיקח טריטייס קומפ אם הנזכר לעיל נוגע לך. אם אינך בטוח, התייעץ עם הרופא שלך לפני נטילת טריטייס קומפ.

לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- הנך סובל מבעיות בלב, בכבד או בכליה
- איבדת כמות רבה של מלחים או נוזלים (בעקבות הקאה, שלשול, הזעה מוגברת, דיאטה דלת מלחים, נטילת תרופות משתנות לתקופה ממושכת או אם עברת דיאליזה).
- הנך עומד לעבור טיפול להפחתת האלרגיה לעקיצות דבורים או צרעות (דסנסיטיזציה).
- הנך עומד לקבל חומר הרדמה במהלך ניתוח או טיפול שיניים. ייתכן ותצטרך להפסיק את הטיפול בטריטיס קומפ יום אחד מראש; התייעץ עם הרופא שלך.
- רמת האשלגן בדמך גבוהה (לפי תוצאות של בדיקת דם).
- הנך נוטל תרופות שעלולות להוריד את רמת הנתרן בדמך או סובל ממצב רפואי שעלול להוריד את רמת הנתרן בדמך. הרופא שלך עשוי להפנות אותך לבדיקות דם תקופתיות, בפרט לשם בדיקת רמות הנתרן בדמך, במיוחד אם הנך קשיש.
- הנך נוטל תרופות העלולות להגדיל את הסיכון לתגובה אלרגית חמורה הנקראת אנגיואדמה, כגון מעכבי mTOR (לדוגמה: טמסירולימוס, אוורולימוס, סירולימוס), וילדגליפטין, מעכבי נפרייליזין (NEP inhibitors, לדוגמה: רסקדוטריל) או סקוביטריל/וולסרטן. עבור סקוביטריל/וולסרטן ראה גם מידע בסעיף "אין להשתמש בתרופה".
- חווית בעיות בנשימה או בריאות (כולל דלקת או נוזל בריאות) לאחר נטילת הידרוכלורתיאזיד בעבר. אם אתה מפתח קוצר נשימה חמור או קושי לנשום לאחר נטילת טריטיס קומפ, פנה מייד לקבלת עזרה רפואית.
- הנך סובל ממחלות רקמת החיבור כגון סקלרודרמה או זאבת (systemic lupus erythematosus).
- עליך לספר לרופא שלך אם את חושבת שאת בהיריון (או עשויה להרות). טריטיס קומפ אינו מומלץ ב-3 חודשי ההיריון הראשונים ועלול לגרום נזק רציני לתינוקך לאחר החודש השלישי להיריון (ראי סעיף "היריון, הנקה ופוריות" מטה).
- יש לך ירידה בראייה או שיש לך כאבי עיניים. אלה יכולים להיות תסמינים של הצטברות נוזלים בשכבת כלי הדם של העין (choroidal effusion) או עלייה בלחץ בעין (גלאוקומה) ויכולים לקרות תוך שעות עד שבועות לאחר נטילת טריטיס קומפ. הדבר יכול להוביל לאובדן ראייה קבוע, אם לא מטפלים בזה. אם היתה לך בעבר אלרגיה לפניצילין או לסולפונאמיד, אתה עלול להיות בסיכון גבוה יותר לפתח זאת. עליך להפסיק את הטיפול בטריטיס קומפ ולפנות לטיפול רפואי מייד.
- הנך נוטל אחת מהתרופות הבאות המשמשות לטיפול ביתר לחץ דם:
 - חסמי הרצפטור לאנגיוטנסין II (Angiotensin-II receptor blockers), הידועות גם כ-sartans. לדוגמה: וולסרטן, טלמיסרטן, אירבסרטן), במיוחד אם אתה סובל מבעיות בכליות הקשורות לסוכרת.
 - אליסקירן.
- הרופא שלך עשוי לבצע בדיקות תקופתיות של תפקוד כלייתי, לחץ דם וכמות האלקטרוליטים בדמך (למשל אשלגן). ראה מידע גם תחת פרק "אין להשתמש בתרופה".
- חלית בעבר בסרטן העור, או אם הנך מפתח נגע בלתי צפוי בעור במהלך השימוש בתרופה. שימוש בהידרוכלורתיאזיד עלול להעלות את הסיכון לפתח סרטן בעור ובשפתיים (סרטן עור מסוג שאינו מלאנומה), בפרט בשימוש ארוך טווח במינונים גבוהים. יש להגן על העור מחשיפה לשמש ולקרירה אולטרה סגולה (UV) במהלך השימוש בטריטיס קומפ.

ילדים ומתבגרים

טריטיס קומפ אינו מומלץ לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים, כיוון שהיעילות והבטיחות של טריטיס קומפ בקבוצות גיל אלה עדיין לא נקבעו.

אם משהו מהנזכר לעיל נוגע לך (או אם אינך בטוח), התייעץ עם הרופא שלך לפני נטילת טריטיס קומפ.

בדיקות ומעקב

בדוק עם הרופא או הרוקח שלך לפני השימוש בתרופה אם:

- הנך עומד לעבור בדיקה לתפקוד יותרת בלוטת התריס (פאראתירואיד). טריטיס קומפ עשוי להשפיע על תוצאות הבדיקה.
- הנך ספורטאי העומד לעבור בדיקת anti-doping. טריטיס קומפ עשוי לגרום לתוצאה חיובית של הבדיקה.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

זאת מפני שטריטיס קומפ עלול להשפיע על פעילות של תרופות אחרות. כמו כן, תרופות אחרות עלולות להשפיע על פעילותו של טריטיס קומפ.

ספר לרופא שלך אם הנך נוטל תרופה כלשהי מהתרופות הבאות. הן עלולות לגרום להפחתת היעילות של טריטייס קומפ:

- תרופות המשמשות להקלה בכאב ובדלקת (לדוגמה NSAIDs כמו איבופרופן או אינדומטצין ואספירין)
- תרופות לטיפול בלחץ דם נמוך, שוק, אי-ספיקת לב, אסתמה או אלרגיות כמו אפדרין, נוראדרנלין או אדרנלין. על הרופא לעקוב אחר לחץ הדם שלך.

ספר לרופא שלך אם הנך נוטל תרופה כלשהי מהתרופות הבאות. שילוב עם התרופות הבאות עלול לגרום להגברת הסיכוי לתופעות לוואי:

- סקוביטריל/וולטרטן – משמשות לטיפול בסוג של אי-ספיקת לב כרונית במבוגרים (ראה מידע גם בסעיף "אין להשתמש בתרופה")
- תרופות המשמשות להקלה בכאב ובדלקת (לדוגמה NSAIDs כמו איבופרופן או אינדומטצין ואספירין)
- תרופות העלולות להפחית את רמת האשלגן בדמך כמו תרופות לעצירות, תרופות משתנות, אמפותריצין B (משמש לזיהומים פטרייתיים) ו- ACTH (משמש לבדיקת תפקוד יותרת הכליה [בלוטות האדרנל])
- תרופות לטיפול בסרטן (כימוטרפיה)
- תרופות לבעיות בלב, כולל בעיות בקצב הלב שלך
- תרופות למניעת דחיית שתל כגון ציקלוספורין
- תרופות משתנות כגון פרוסומיד
- תרופות העלולות להעלות את רמת האשלגן בדמך כגון ספירונולקטון, טריאמטרן, אמילוריד, מלחי אשלגן, טרימטופרים לבד או בשילוב עם סולפאמתוקסזול (לזיהומים) והפרין (לדילול הדם)
- סטרואידים לטיפול בדלקת כגון פרדניסולון
- תוספי סידן
- אלופורינול (משמש להפחתת רמת החומצה האורית בדמך)
- פרוקאינאמיד (לטיפול בבעיות בקצב הלב)
- כולסטיראמין (להורדת כמות השומנים בדמך)
- קרבמזפין (לאפילפסיה)
- הפרין (לדילול הדם)
- טמסירולימוס (לסרטן)
- סירולימוס, אוורולימוס (למניעת דחיית שתל)
- וילדגליפטין (משמש לטיפול בסוכרת סוג 2)
- רסקודטריל (משמש נגד שלשול)
- ייתכן והרופא שלך יצטרך לשנות את המינון ו/או לנקוט באמצעי זהירות אחרים: אם הנך נוטל תרופה מקבוצת חסמי רצפטור לאנגיוטנסין II (ARB) או אליסקירן (ראה מידע נוסף בסעיפים "אין לקחת את התרופה" ו-"אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה")

ספר לרופא שלך אם הנך נוטל תרופה כלשהי מהתרופות הבאות. טריטייס קומפ עלול להשפיע על פעילותן:

- תרופות לסוכרת כגון תרופות פומיות להורדת גלוקוז ואינסולין. טריטייס קומפ עלול להפחית את רמת הסוכר בדמך. עקוב בקפדנות אחר רמות הסוכר בדמך בזמן נטילת טריטייס קומפ
- ליתיום (לבעיות נפשיות). טריטייס קומפ עלול לגרום לעלייה ברמת הליתיום בדמך. על הרופא שלך לעקוב בקפדנות אחר רמת הליתיום שלך
- תרופות להרפיית השרירים
- כינין (למלריה)
- תרופות המכילות יוד, אלו יכולות להיות בשימוש בבית חולים במהלך סריקה או צילום רנטגן
- פניצילין (לזיהומים)
- תרופות לדילול הדם הניתנות דרך הפה כגון ווארפארין

אם משהו מהנזכר לעיל נוגע לך (או אם אינך בטוח), התייעץ עם הרופא שלך לפני נטילת טריטייס קומפ.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן לקחת את התרופה עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

שתיית אלכוהול בזמן הטיפול בטריטייס קומפ עלולה לגרום לסחרחורת. התייעץ עם הרופא שלך על האפשרות לשתות אלכוהול בזמן הטיפול בטריטייס קומפ, כיוון שלא-אלכוהול יכולה להיות השפעה נוספת על הורדת לחץ דם.

עלייך לספר לרופא שלך אם את חושבת שאת בהיריון או עשויה להרות. טריטייס קומפ אינו מומלץ ב- 12 שבועות ההיריון הראשונים ואסור כלל לשימוש החל מהשבוע ה- 13, כיוון שהוא עלול לגרום לנזק לתינוק. אם נכנסת להיריון בזמן שהשתמשת בטריטייס קומפ, ספרי מייד לרופא שלך. יש לעבור מראש לטיפול חלופי מתאים לקראת היריון מתוכנן.

אין לקחת טריטייס קומפ בהנקה.

התייעצי עם הרופא שלך או עם רוקח לפני לקיחת כל תרופה.

נהיגה ושימוש במכונות

אתה עלול להרגיש מסוחרר בזמן לקיחת טריטייס קומפ. סביר יותר שזה יקרה בתחילת הטיפול או בהעלאת המינון. אם הדבר קורה, אין לנהוג או להשתמש בכלי עבודה או מכונות כלשהן.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טריטייס קומפ מכיל נתרן. תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול (23 מ"ג) נתרן לטבליה, כלומר היא נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

טיפול ביתר לחץ דם

הרופא שלך יתאים את המינון עד להשגת שליטה על לחץ הדם שלך.

קשישים

הרופא שלך עשוי להוריד את המינון ההתחלתי ולהעלותו באיטיות במהלך הטיפול.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

- יש ליטול את הטבליה דרך הפה בשעה קבועה כל יום, בדרך כלל בבוקר.
- יש לבלוע את התרופה עם נזל.
- אין ללעוס או לרסק את הטבליות.
- ניתן לחצות את הטבליה של טריטייס קומפ 2.5 מ"ג / 12.5 מ"ג ושל טריטייס קומפ 5 מ"ג / 25 מ"ג לפי פס החציה לחצאים שווים ולקחת חצי מנה בעת הצורך.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה:

פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך, על מנת שהרופא ידע מה לקחת. אל תנהג בעצמך, בקש ממישהו אחר להסיע אותך או הזמן אמבולנס.

אם שכחת ליטול את התרופה:

- אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
- אין ליטול מנה כפולה כפיצוי על המנה שנשכחה!

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטריטייס קומפ עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק את הטיפול בטריטייס קומפ ופנה מיד לרופא אם הנך חש באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות – ייתכן ותזדקק לטיפול רפואי דחוף:

- נפיחות בפנים, בשפתיים או בגרון הגורמת לקשיי בליעה או נשימה, כמו גם עקצוץ ופריחה. אלו יכולים להיות סימנים לתגובה אלרגית חריפה לטריטייס קומפ
- תגובה עורית חריפה הכוללת פריחה, כיבים בפה, החמרה של מחלה עורית קיימת, אדמומיות, שלפוחיות או התנתקות של העור (כגון תסמונת Stevens-Johnson , toxic epidermal necrolysis , או erythema multiforme).

דווח לרופא מיד אם הנך חש באחת מתופעות הלוואי הבאות:

- קצב הלב מוגבר, פעימות לב חזקות או לא אחידות (palpitations), כאב בחזה, לחץ בחזה או בעיות חמורות יותר כולל התקף לב או שבץ
- קוצר נשימה, שיעול או חום הנמשכים 2-3 ימים והפחתה בתיאבון. אלו יכולים להיות סימנים לבעיה בריאות, כולל דלקת ריאות
- הופעת סימני חבלה ביתר קלות, דימום למשך זמן ארוך מהרגיל, סימן כלשהו לדימום (לדוגמה דימום מהחניכיים), נקודות סגולות, כתמים על העור או הופעת זיהומים בקלות לעומת המצב הרגיל, כאב בגרון וחום, הרגשת עייפות, התעלפות, סחרחורת או צבע עור חיוור. אלו יכולים להיות סימנים לבעיות בדם או במח העצם
- כאב בטן חמור שיכול להקרין לגב. זה יכול להיות סימן לדלקת בבלב
- חום, צמרמורות, עייפות, איבוד תיאבון, כאב בטן, בחילה, הצהבת העור או העיניים (צהבת). אלו יכולים להיות סימנים לבעיות בכבד כגון הפטיטיס (דלקת כבד) או פגיעה בכבד
- ירידה בראייה או כאב בעיניים בגלל לחץ גבוה (סימנים אפשריים להצטברות נוזלים בשכבת כלי הדם של העין (choroidal effusion) או גלאוקומה חריפה צרת זווית).

תופעות לוואי נוספות כוללות:

ספר לרופא שלך אם אחת מהתופעות הבאות מחמירה או נמשכת יותר ממספר ימים.

תופעות שכיחות (מופיעות בעד 1 מתוך 10 משתמשים)

- כאב ראש, הרגשת חולשה או עייפות
- תחושת סחרחורת- סביר שתופיע עם תחילת הטיפול בטריטייס קומפ או בהעלאת המינון של הטריטייס קומפ
- שיעול יבש מדגדג או ברונכיטיס
- בדיקת דם המראה רמה גבוהה מהרגיל של סוכר בדמך. אם הנך סובל מסוכרת, מצב זה יכול להחמיר את מחלתך
- בדיקת דם המראה רמה גבוהה מהרגיל של חומצה אורית או שומנים בדמך
- כאב, אדמומיות ונפיחות של המפרקים.

תופעות לא שכיחות (מופיעות בעד 1 מתוך 100 משתמשים)

- פריחה בעור עם או בלי אזורים מוגבהים
- האדמה, התעלפות, לחץ דם נמוך מהרגיל בייחוד כשנעמדים או מתיישבים במהירות
- בעיות בשיווי משקל (ורטיגו)
- גירוד ותחושה עורית לא רגילה כגון הרדמות, עקצוץ, דקירה, צריבה או תחושת נימול
- איבוד או שינוי בחוש הטעם
- בעיות שינה
- הרגשת דיכאון, חרדה, הרגשת עצבנות או חוסר מנוחה גבוהים מהרגיל
- אף סתום, דלקת של הסינוסים (סינוסיטיס), קוצר נשימה
- דלקת בחניכיים, נפיחות בפה
- בעיניים- אדמומיות, עקצוץ, נפיחות או דמעת
- צלצולים באוזניים
- טשטוש ראייה
- נשירת שיער
- כאבים בחזה
- כאבי שרירים
- עצירות, כאבי בטן
- קשיי עיכול או בחילה
- השתנה מוגברת מהרגיל במהלך היום
- הזעה מוגברת מהרגיל או הרגשת צמא
- ירידה או איבוד תיאבון
- דופק מוגבר או לא סדיר

- נפיחות בזרועות וברגליים – יכולה להיות סימן לאצירת נוזלים בגוף יותר מהרגיל
- חום
- אין אונות בגברים
- תוצאות בדיקת דם המראות ירידה במספר תאי הדם האדומים, תאי הדם הלבנים או טסיות הדם או בכמות ההמוגלובין
- תוצאות בדיקות דם המעידות על שינוי בתפקוד הכבד, הלב לב או הכליות
- תוצאות בדיקת דם המראות רמת אשלגן נמוכה מהרגיל בדמך.

תופעות נדירות ביותר (מופיעות בעד 1 מתוך 10,000 משתמשים)

- הקאות, שלשול או צרבת
- לשון נפוחה ואדומה או יובש בפה
- תוצאות בדיקת דם המראות רמת אשלגן גבוהה מהרגיל בדמך.
- מצוקה נשימתית חריפה (הסימנים כוללים קוצר נשימה חמור, חום, חולשה ובלבול).

תופעות לוואי נוספות שדווחו:

- הודע לרופא שלך אם אחת מהתופעות המפורטות מטה נעשית חמורה או נמשכת יותר ממספר ימים.
- קשיי ריכוז, הרגשת חוסר מנוחה או בלבול
- שינוי בצבע של אצבעות הידיים והרגליים כאשר קר לך ולאחר מכן הרגשת עקצוץ או כאב כשאתה מתחמם.
- ייתכן וזו תופעה הנקראת Raynaud's phenomenon
- הגדלת החזה בגברים
- קרישי דם
- הפרעות בשמיעה
- הפרשה קטנה מהרגיל של דמעות בעיניים
- עצמים הנראים צהובים
- התייבשות
- נפיחות, כאב ואדמומיות בלחיים (דלקת של בלוטת הרוק)
- נפיחות במעייים (intestinal angioedema) המתבטאת בתסמינים כגון כאב בטן, הקאה או שלשול
- רגישות גבוהה מהרגיל לאור השמש
- קילוף חמור של העור, עקצוץ, פריחה בצורת גושים או תגובות עוריות אחרות כמו פריחה אדמומית בפנים או במצח
- תפרחת או חבלות בעור
- כתמים בעור והרגשת קור בגפיים
- בעיות בציפורניים (לדוגמה שחרור או הפרדה של הציפורן מבסיסה)
- קישיון שרירי-גרמי או אי-יכולת להזיז את הלסת שלך
- חולשה או התכווצות השרירים
- ירידה בתשוקה המינית בגברים או בנשים
- הופעת דם בשתן – יכול להיות סימן לבעיה בכליות
- רמת סוכר בשתן גבוהה מהרגיל
- עלייה בתאי דם לבנים מסוימים (eosinophilia), הנצפית בבדיקות דם
- תוצאות בדיקות דם המראות על מיעוט תאי הדם בדמך (pancytopenia)
- תוצאות בדיקות דם המראות על שינוי ברמות מלחים כגון: נתרן, סידן, מגנזיום וכלוריד בדמך
- שתן מרוכז (בעל צבע כהה), בחילה או הקאות, התכווצויות שרירים, בלבול ופרכוסים, שיכולים להיות תוצאה של הפרעה בהפרשת הורמון המפקח על הפרשת השתן (ADH). אם יש לך תסמינים אלו, פנה לרופא בהקדם האפשרי
- תגובות איטיות או לקויות
- שינוי בריחות של דברים
- קשיי נשימה או החמרה של אסתמה
- סרטן העור והשפתיים (סרטן עור מסוג שאינו מלאנומה).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/המגשית (בליסטר).
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי איחסון:

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25°C .

אל תשליך תרופות למערכת הניקוז או האשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות שאינך משתמש בהן. אמצעים אלו יסייעו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, טריטייס קומפ 2.5/ 12.5 מ"ג וטריטייס קומפ 5 / 25 מ"ג מכילים גם:
Pregelatinized starch, microcrystalline cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, sodium stearyl fumarate.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

הטבליות ארוזות באריזת מגשית (בליסטר).

הטבליות של **טריטייס קומפ 2.5 מ"ג / 12.5 מ"ג** הן מוארכות, לבנות או כמעט לבנות עם פס-חציה. על כל צד מוטבע **HNW** ולוגו.

הטבליות של **טריטייס קומפ 5 מ"ג / 25 מ"ג** הן מוארכות, לבנות או כמעט לבנות עם פס-חציה. על כל צד מוטבע **HNW** ולוגו.

כל החוזקים ארוזים במגשיות (בליסטרים) מ- PVC/Aluminum של 14 או 28 טבליות.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשירים. אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ, רחוב בני גאון 10, ת.ד. 8090, נתניה 4250499.

נערך בפברואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

טריטייס קומפ 2.5 מ"ג / 12.5 מ"ג 122 27 30187

טריטייס קומפ 5 מ"ג / 25 מ"ג 122 28 30188

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.