

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

**דפירוקס<sup>TM</sup> 125, 250, 500 מ"ג**

**טבליות מסיסות**

כל טבלייה מסיסה מכילה דפראסירוקס (Deferasirox) במינון 125, 250 או 500 מ"ג בהתאמה. חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך או לטיפול במחלה של הילד/ה שלך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

- לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל (iron overload) הנגרם מעירווי דם, במבוגרים ובילדים (מגיל שנתיים ומעלה).
- לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל שאינו תלוי בעירווי דם בחולי תלסמיה מגיל 10 ומעלה.

**קבוצה תרפויטית:** קושרי ברזל (iron chelating agent).

עירווי דם חוזרים נדרשים לעיתים בחולים הסובלים מסוגים מסוימים של אנמיה כגון תלסמיה, אנמיה חרמשית ותסמונת מיאלודיספלסטיות (Myelodysplastic Syndrome [MDS]). אולם, עירווי דם חוזרים עלולים לגרום להצטברות של עודף ברזל. זאת מאחר שדם מכיל ברזל ולגוף אין דרך טבעית לסלק את עודף הברזל המתקבל עם עירווי הדם. בחולי תלסמיה שאינם תלויים בעירווי דם, עומס ברזל עלול להתפתח במשך הזמן בעיקר עקב ספיגה מוגברת של ברזל ממזון כתגובה לספירות נמוכות של תאי דם. במשך הזמן, הברזל העודף יכול לגרום נזק לאיברים חיוניים כגון הכבד והלב. תרופות מסוג iron chelators (קושרי ברזל) משמשות לסילוק הברזל העודף ומפחיתות את הסיכון לגרימת נזק לאיברי הגוף. **דפירוקס** לוכדת ומסלקת עודף ברזל אשר לאחר מכן מופרש בעיקר בצואה.

### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (דפראסירוקס) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6). אם הדבר רלוונטי לגביך, **ספר לרופא לפני נטילת דפירוקס**. אם אתה חושב שאתה אלרגי, התייעץ עם הרופא.
- יש לך מחלת כליות בינונית או חמורה.
- אתה נוטל כעת תרופה אחרת מסוג iron chelator (קושרי ברזל).

**דפירוקס אינה מומלצת אם:**

- יש לך תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS); ירידה בייצור תאי הדם על ידי מח העצם) בשלב מתקדם או סרטן מתקדם.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

**לפני הטיפול בדפירוקס, ספר לרופא אם:**

- יש לך בעיה בכבד או בכליות.

- אתה סובל מבעיה בלב שנגרמה מעומס ברזל.
- אתה מבחין בירידה משמעותית במתן שתן (סימן לבעיה בכליות).
- יש לך פריחה חמורה או קשיי נשימה וסחרחורת או נפיחות בעיקר של הפנים והגרונ (סימנים של תגובה אלרגית חמורה, ראה גם סעיף 4 "תופעות לוואי").
- יש לך שילוב של כל אחד מהתסמינים הבאים: פריחה, עור אדום, שלפוחיות על השפתיים, העיניים או הפה, קילוף של העור, חום גבוה, תסמינים דמויי שפעת, קשרי לימפה מוגדלים (סימנים של תגובת עור חמורה, ראה גם סעיף 4 "תופעות לוואי").
- אתה חש שילוב של נמנום, כאב בצד העליון הימני של הבטן, הצהבה או עלייה בהצהבת העור או העיניים ושתן כהה (סימנים של בעיות בכבד).
- אתה חווה קשיים בחשיבה, בזיכרון של מידע או בפתרון בעיות, מרגיש פחות ערני או מודע לסביבה או מרגיש ישנוני מאוד עם אנרגיות ירודות (סימנים של רמה גבוהה של אמוניה בדם, אשר עשויה להיות קשורה לבעיות בכבד או בכליות, ראה גם סעיף 4 "תופעות לוואי").
- אתה מקיא דם ו/או יש לך צואה שחורה.
- יש לך כאב בטן תדיר, בייחוד לאחר אכילה או נטילת **דפירוקס**.
- יש לך צרבות תדירות.
- יש לך ספירת טסיות או תאי דם לבנים נמוכה בבדיקות דם.
- יש לך טשטוש ראייה.
- יש לך שלשול או הקאות.
- אם אחד מהמצבים האלה רלוונטי לגביך, ספר לרופא מייד.

### ילדים ומתבגרים

ניתן להשתמש ב**דפירוקס** בילדים ובמתבגרים מגיל שנתיים ומעלה לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל (iron overload) הנגרם מעירויי דם ומגיל 10 ומעלה לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל שאינו תלוי בעירויי דם בחולי תלסמיה. הרופא יתאים את המינון בהתאם לגדילת הילד. **דפירוקס** אינה מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל שנתיים.

### בדיקות ומעקב

במהלך הטיפול עליך לעבור בדיקות דם ושתן באופן סדיר. בדיקות אלו ינטרו את כמות הברזל בגופך (רמות פריטין בדם) כדי לבחון האם **דפירוקס** משפיעה כנדרש. הבדיקות גם יעקבו אחר תפקודי הכליות (רמות קריאטינין בדם, נוכחות חלבון בשתן) ותפקודי הכבד (רמות טרנסאמינאזות בדם, בילירובין ואלקליין פוספטאז). הרופא עשוי לבקש ממך לבצע ביופסיה של הכליה, במקרה בו הוא חושד בפגיעה כלייתית משמעותית. ייתכן שתעבור גם בדיקות MRI (הדמיה בתהודה מגנטית) על מנת לקבוע את כמות הברזל בכבד שלך. הרופא יתחשב בבדיקות אלו כאשר יחליט איזה מינון של **דפירוקס** מתאים ביותר עבורך וכן ישתמש בבדיקות אלו כדי להחליט מתי עליך להפסיק ליטול **דפירוקס**.

עליך לעבור בדיקות שמיעה וראייה לפני תחילת הטיפול ופעם בשנה במהלך הטיפול כאמצעי זהירות.

### תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

- אין לשלב לקיחת **דפירוקס** עם תכשירים קושרי ברזל נוספים.
- אין ליטול תרופות נוגדות חומצה (תרופות המשמשות לטיפול בצרבת) המכילות אלומיניום באותו הזמן ביום עם **דפירוקס**.

במיוחד ספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקח:

- ציקלוספורין (משמש למניעת דחיית איבר מושגל או במצבים אחרים, לדוגמה דלקת מפרקים שגרונית או אסתמה של העור)
  - סימבסטטין (משמש להורדת כולסטרול)
  - משככי כאבים מסוימים או תרופות נוגדות דלקת (לדוגמה אספירין, איבופרופן, קורטיקוסטרואידים)
  - ביספוספונטים במתן דרך הפה (משמשים לטיפול באוסטאופורוזיס)
  - תרופות נוגדות קרישה (משמשות למניעה או לטיפול בהיווצרות קרישי דם)
  - אמצעי מניעה הורמונליים (תכשירים למניעת היריון)
  - בפרידיל, ארגוטאמין (משמשות לטיפול בבעיות בלב ומיגרנות)
  - רפאגליניד (משמש לטיפול בסוכרת)
  - ריפאמפיצין (משמש לטיפול בשחפת)
  - פניטואין, פנוברביטל, קרבמזפין (משמשים לטיפול באפילפסיה)
  - ריטונאביר (משמש לטיפול בזיהום HIV)
  - פאקליטקסל (משמש לטיפול בסרטן)
  - תיאופילין (משמש לטיפול במחלות נשימה כגון אסתמה)
  - קלזופין (משמש לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות כגון סכיזופרניה)
  - טיזנידין (משמש כמרפה שרירים)
  - כולסטיראמין (משמש להורדת רמות כולסטרול בדם)
  - בוסולפן (משמש כטיפול לפני ההשתלה על מנת להרוס את מח העצם המקורי לפני ההשתלה)
  - מידאזולאם (משמש להקל על חרדה ו/או קושי לישון)
- ייתכן שיידרשו בדיקות נוספות על מנת לנטר את רמתן של חלק מהתרופות בדמך.

### שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול **דפירוקס** על קיבה ריקה ולחכות לפחות 30 דקות לפני אכילת מזון כלשהו, עדיף בזמן קבוע בכל יום.

יש להמיס את הטבליות בכוס מים, מיץ תפוחים או מיץ תפוזים. אין להמיס את הטבליות במשקאות תוססים או בחלב (ראה גם בסעיף 3 "כיצד ליטול דפירוקס").

### שימוש בקשישים (מבוגרים בגיל 65 ומעלה)

אנשים מבוגרים בגיל 65 ומעלה יכולים להשתמש באותה מנת **דפירוקס** כמו שאר המבוגרים. מטופלים קשישים עלולים לחוות יותר תופעות לוואי (בעיקר שלשול) ממטופלים צעירים יותר. הם צריכים להיות במעקב צמוד על ידי הרופא לאיתור של תופעות לוואי אשר עשויות לדרוש התאמת מינון.

### היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שיתכן שאת בהיריון או מתכננת להרות יש להייעוץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

**דפירוקס** אינה מומלצת בזמן היריון אלא אם יש צורך ודאי. אם את משתמשת באמצעי הורמונלי למניעת היריון, עלייך להשתמש באמצעי מניעה נוסף או אחר (כגון קונדום), כיוון ש**דפירוקס** עלולה לפגום ביעילות של אמצעי מניעה הורמונליים. הנקה אינה מומלצת במהלך הטיפול ב**דפירוקס**.

### נהיגה ושימוש במכוונות

אם אתה מרגיש סחרחורת לאחר נטילת **דפירוקס**, אין לנהוג ברכב או להפעיל כלים או מכוונות עד שהרגשתך תהיה שוב תקינה. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

**דפירוקס** מכילה לקטוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.  
כל טבלייה מסיסה של **דפירוקס 125 מ"ג** מכילה כ-104 מ"ג לקטוז.  
כל טבלייה מסיסה של **דפירוקס 250 מ"ג** מכילה כ-209 מ"ג לקטוז.  
כל טבלייה מסיסה של **דפירוקס 500 מ"ג** מכילה כ-417 מ"ג לקטוז.  
יש לקחת זאת בחשבון במטופלים עם סוכרת.  
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבלייה מסיסה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.  
הטיפול ב**דפירוקס** יבוצע תחת פיקוח של רופא המנוסה בטיפול בעודף ברזל.  
המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון של **דפירוקס** קשור למשקל הגוף בכל המטופלים. הרופא יחשב את המינון שאתה צריך ויאמר לך כמה טבליות ליטול בכל יום.  
המינון היומי המקובל בדרך כלל בתחילת הטיפול הוא:

- למטופלים המקבלים עירויי דם באופן סדיר - 20 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף. ייתכן שהרופא ימליץ על מינון התחלתי גבוה יותר או נמוך יותר בהתבסס על צרכי הטיפול האישיים שלך.
- למטופלים שאינם מקבלים עירויי דם באופן סדיר - 10 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף.
- בהתאם לתגובתך לטיפול, הרופא יכול מאוחר יותר להתאים לך את הטיפול עם מנה גבוהה או נמוכה יותר.

המינון היומי המרבי הוא:

- 40 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף למטופלים המקבלים עירויי דם באופן סדיר.
- 20 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף למטופלים מבוגרים שאינם מקבלים עירויי דם באופן סדיר.
- 10 מ"ג לכל ק"ג ממשקל הגוף לילדים עד גיל 18 שאינם מקבלים עירויי דם באופן סדיר.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

#### **משך הטיפול:**

**יש להמשיך ליטול דפירוקס כל יום, כל זמן שהרופא מורה לך לעשות זאת.** טיפול זה הוא טיפול ממושך, וייתכן כי יימשך חודשים או שנים. הרופא יעקוב אחר מצבך באופן קבוע כדי לוודא שהטיפול משפיע עליך באופן הרצוי (ראה גם בסעיף 2 "בדיקות ומעקב").  
אם יש לך שאלות לגבי משך הטיפול, פנה לרופא.

#### **צורת הנטילה:**

##### **מתי ליטול דפירוקס?**

- יש ליטול **דפירוקס** פעם ביום, כל יום, בערך באותו הזמן.
  - יש ליטול את הטבליות על קיבה ריקה.
  - ואז להמתין לפחות 30 דקות לפני אכילת מזון כלשהו.
- נטילת **דפירוקס** באותו זמן בכל יום תעזור לך לזכור מתי ליטול את הטבליות.

##### **כיצד ליטול דפירוקס?**

**יש להכניס** את הטבליות/ות לתוך כוס מים, מיץ תפוחים או מיץ תפוזים (100-200 מ"ל).



**יש לערבב** עד שהטבליות/ות מתמוססות/ות לחלוטין. הנוזל בכוס ייראה עכור.



**יש לשתות** את כל תוכן הכוס, ואז להוסיף מעט מים או מיץ למה שנותר בכוס, לערבב ולשתות גם את זה.



אין להמיס את הטבליות במשקאות תוססים או בחלב. אין ללעוס, לשבור או לכתוש את הטבליות. אין לבלוע את הטבליות בשלמותן.

בכל שאלה לגבי כיצד **דפירוקס** פועלת או מדוע נרשמה עבורך, יש לפנות לרופא או לרוקח.

#### **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד או אדם אחר מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. ייתכן כי יהיה צורך בטיפול רפואי דחוף. אתה עלול לחוות תופעות כגון כאב בטן, שלשול, בחילה והקאה ובעיות בכליות או בכבד היכולות להיות רציניות.

#### **אם שכחת ליטול את התרופה**

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, קח את המנה ברגע שנזכרת באותו היום. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה ביום הבא על מנת לפצות על הטבליות/ות שנשכחה/ו.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

#### **אם אתה מפסיק את נטילת התרופה**

אין להפסיק את הטיפול ב**דפירוקס** ללא הוראה מפורשת מהרופא. אם תפסיק לקחת **דפירוקס**, הברזל העודף לא יסולק עוד מגופך (ראה גם לעיל "משך הטיפול").

אין ליטול תרופות בחושך! **בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה.** הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

כמו בכל תרופה, השימוש ב**דפירוקס** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. רוב תופעות הלוואי הן קלות עד מתונות ובדרך כלל יחלפו לאחר מספר ימים עד מספר שבועות של טיפול.

**תופעות לוואי מסוימות עשויות להיות חמורות ודורשות טיפול רפואי מיידי.**  
תופעות לוואי אלה הן תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000) או תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 10,000).

**יש להפסיק ליטול את התרופה ולפנות לרופא מיידי אם אחד המקרים הבאים חל עליך או על ילדך:**

- פריחה חמורה או קשוי נשימה וסחרחורת או נפיחות בעיקר של הפנים והגרון (סימנים של תגובה אלרגית חמורה)
- שילוב של כל אחד מהתסמינים הבאים: פריחה, עור אדום, שלפוחיות בשפתיים, בעיניים או הפה, קילוף של העור, חום גבוה, תסמינים דמויי שפעת, קשרי לימפה מוגדלים (סימנים של תגובה עורית חמורה)
- ירידה משמעותית במתן שתן (סימן לבעיה בכליות)
- שילוב של נמנום, כאב בצד העליון הימני של הבטן, הצהבה או עלייה בהצהבת העור או העיניים ושתן כהה (סימנים של בעיות בכבד)
- קושי לחשוב, לזכור מידע או לפתור בעיות, ערנות או מודעות מופחתת או ישנוניות עם אנרגיות ירודות (סימנים של רמה גבוהה של אמוניה בדם, אשר עשויה להיות קשורה לבעיות בכבד או בכליות ולהביא לשינוי בתפקוד המוח).
- הקאה דמית ו/או צואה שחורה
- כאבי בטן תדירים, בייחוד לאחר אכילה או נטילה של **דפירוקס**
- צרבות תדירות
- אובדן ראייה חלקי
- כאב חמור בבטן עליונה (דלקת לבלב)

**תופעות לוואי מסוימות עשויות להפוך לרציניות.**  
תופעות לוואי אלה אינן שכיחות.

**יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:**

- אתה סובל מראייה מטושטשת או מעורפלת
- אתה סובל מירידה בשמיעה

**תופעות לוואי נוספות:**

**תופעות לוואי שכיחות מאוד** (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):

- בדיקות הקשורות לתפקוד הכליה שאינן תקינות

**תופעות לוואי שכיחות** (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100):

- הפרעות במערכת העיכול כגון בחילה, הקאה, שלשול, כאב בטן, נפיחות, עצירות, קשוי עיכול
  - פריחה
  - כאב ראש
  - בדיקות הקשורות לתפקוד הכבד שאינן תקינות
  - גרד
  - בדיקות שתן שאינן תקינות (חלבון בשתן)
- אם אחת מהתופעות לעיל משפיעה עליך באופן חמור פנה לרופא.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות** (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- סחרחורת
  - חום
  - כאב בגרון
  - נפיחות בזרועות או ברגליים
  - שינוי בצבע של העור
  - חרדה
  - הפרעות בשינה
  - עייפות
- אם אחת מהתופעות לעיל משפיעה עליך באופן חמור פנה לרופא.

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה** (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- ירידה במספר תאי הדם המעורבים בקרישת דם (תרומבוציטופניה), במספר תאי הדם האדומים (אנמיה חמורה), במספר תאי הדם הלבנים (נויטרופניה) או במספר כל סוגי תאי הדם (פאנציטופניה)
- נשירת שיער
- אבנים בכליות
- תפוקת שתן נמוכה
- קרע בקיבה או בדופן המעי העלולים לגרום לכאב ולבחילה
- כאב חמור בבטן עליונה (דלקת לבלב)
- רמה חריגה של חומצה בדם

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אחסן מתחת ל-25°C. יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מלחות.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

## **6. מידע נוסף**

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

Lactose monohydrate, crospovidone, microcrystalline cellulose, povidone, magnesium stearate, sodium laurilsulfate, silica colloidal anhydrous, purified water

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

**דפירוקס 125 מ"ג:** טבליות בצבע קרם, עגולות ושטוחות עם קצוות משופעים עם הטבעה של "D" למעלה ו-"125" למטה בצד אחד וללא הטבעה בצד השני.

**דפירוקס 250 מ"ג:** טבליות בצבע קרם, עגולות ושטוחות עם קצוות משופעים עם הטבעה של "D" למעלה ו-"250" למטה בצד אחד וללא הטבעה בצד השני.

**דפירוקס 500 מ"ג:** טבליות בצבע קרם, עגולות ושטוחות עם קצוות משופעים עם הטבעה של "D" למעלה ו-"500" למטה בצד אחד וללא הטבעה בצד השני.  
כל אריזה מכילה 28 טבליות מסיסות.

**שם היצרן וכתובתו:** פארמהסינס אינק., מונטריאול, קנדה

נערך באפריל 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

**דפירוקס 125 מ"ג:** 167-88-35880-00

**דפירוקס 250 מ"ג:** 167-89-35881-00

**דפירוקס 500 מ"ג:** 167-90-35882-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**בעל רישום:** דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל