

**כרטיסים מידע
בטיחותי למטופל**

**רמסימה
120
מ"ג/מ"ל
תת-עוררי
אינפליקסימאב
(Infliximab)**

רכטיס המידע הבטיחותי
למטופל מכל מידע
בטיחותי חשוב שאתה
צריך לידעת לפני תחילת
הטיפול ברומסימה
120 מ"ג/מ"ל תת-עוררי,
ובמהלך.

חשיבות שאתה והרופא שלך
תרשימו את השם המ��חרי של
התרופת שאתה מקבל ואת
מספר האצווה של המנה.
שם התכšíיר:

מספר אצווה:

תאריך תחילת הטיפול
ברמסימה 120 מ"ג/מ"ל
תת-עוררי:

מטופל: _____

רופא: _____

מספר טלפון: _____

תאריכי קבלת התרופת
במחזור הנוכחי:

כאשר אתה מתחילה כרטיסים
חדש, בבקשה שמור את
הכרטיס זהה למשך ארבעה
חודשים נוספים, לפחות במקורה
הចורף.

קרא בעיון את 'העלון לצרכני'
של רמסימה 120 מ"ג/מ"ל
תת-עוררי לפני שאתה מתחילה
להשתמש בתרופת ה затא.



**הציג את הכרטיס הזה
לכל רופא שמעורב
בטיפול בגין.**

זהומים |

פני השימוש ברמסימה

- ספר לרופא שלך אם אתה סובל מזיהום כלשהו.
- חשוב מאוד שתספר לרופא שלך אם אי פעם חלית בשחפת, או אם הייתה תחושת קרוב עם מישחו שחולה בשחפת בעבר. הרופא יבודק אותך כדי לראות אם יש לך שחפת.
- בקש מהרופא שלך שיתעד על התרופות שלך, וכך תיראה לך בבדיקה (ות) האחרונה(ות) לגילוי שחפת שבועעה/ו לך.
- ספר לרופא שלך אם סובל מעבויות לב כלשהן, כגון אי ספיקת לב.

בעיות לב |

פני השימוש ברמסימה

- ספר לרופא אם אתה סובל מעבויות לב כלשהן, כגון אי ספיקת לב.

במהלך הטיפול עם רמסימה

- דוח מיד לרופא שלך אם אתה מב奸 בתסמים של בעיה לב. התסמים האלה כוללים קוצר נשימה, התנפחות של הרגליים או שינויים בקצב הלב.

הריון וחיסונים |

- ב במידה שנטلت את התרופה במהלך ההריון, חשוב לידע את הצד ההפוך עליך לפני שהטיפול מתקבל חיסון כלשהו.
- לתינוק אסור לקבל "חיסון חי" כגון BCG (הנוגע לשנת החודשים הראשוניים לאחר הלידה). בבקשתה הקפד להביא רשיינה של כל התרופות הנוספות שהרין נוטל לכל ביקור אצל איש מקצוע בתחום הרפואה. שומר את התרופות זהה אליו במשך ארבעה חודשים לאחר שקיבלת את המנה האחרונה של רמסימה.

ב במידה שנטلت את התרופה במהלך ההריון, חשוב לידע את הצד ההפוך עליך לפני שהטיפול מתקבל חיסון כלשהו.

בבקשה הקפד להביא רשיינה של כל התרופות הנוספות שהרין נוטל לכל ביקור אצל איש מקצוע בתחום הרפואה. שומר את התרופות זהה אליו במשך ארבעה חודשים לאחר שקיבלת את המנה האחרונה של רמסימה.

במקרה של הריון, שמרי את התרופות למשך שישה חודשים לפחות לאחר הלידה.

זמן רב לאחר שקיבלת את המנה האחרונה.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למטופות במהלך הביריאות באמצעות תרופתי" שנמצא בדף הבית של אטר משרד הבריאות (אנו www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה:

<https://sideeffects.health.gov.il>.

בנוסף, ניתן לדוח לחברת פאדגיס באמצעות הכתובת הבאה:

Padagis.co.il

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה כרטיס זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מייעדת לשני המינים.

אושר ע"י משה"ב
במרץ 2022