

עלון לזרען לפי תכנית הרוקמים (**תכשירי לם התשתי** 1986 התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

שם התרופה צורתה ו‏וחזקה:

ספורנוקס™ תמיסה לשתייה, 10 מ"ג/מ"ל

חומר פעיל וריכוזו:

כל מ"ל מכיל 10 מ"ג איטרקונזול

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וכן סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקם.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ספורנוקס תמיסה לשתייה נמנית עם קבוצת תרופות הנקראת אנטו-פטרייטיים. תרופות אלו משמשות לטיפול ומניעת זיהום בפטרייה ובכלל זה שכימה.
התרופה משמשת לטיפול בזיהומים פטרייטיים של הלוע התחתון והושט ומניעת זיהומים פטרייטיים בזמן נויטרופניה בחולים הסובלים מפגיעה בתפקוד מערכת החיסון.

קבוצה תרופית: אנטו-פטרייטיים ממשפחת הטריאזולים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה הפפורטים בסעיף 6 ("מידע נוסף").

- הינך בהריון, ונשבת שאת עלולה להיות בהריון או יכולה להיכנס להריון (ראי פסקת הריון).

לפני השימוש בספורנוקס תמיסה לשתייה, ספר לרופאך אם הינך נוטל תרופות כלשהן.

אין להשתמש בספורנוקס תמיסה לשתייה אם הינך נוטל אחת מהתרופות הבאות. אם הינך משתמש בתכשיר ספורנוקס תמיסה לשתייה, והאתה נדרש להתחיל טיטול באחת התרופות מטה, יש להתחיל טיטול זה שבועיים לאחר הפסקת השימוש בספורנוקס תמיסה לשתייה.

תרופות לטיפול בבעיות בלב, בדם או במחזור הדם

- אליסקירן, אפלרנון, לוקאנדיפיץ או ניוולדיפיץ (ללחץ דם גבוה)
- בפרידיל, איבאברדין או רנולאזין (לאנגינה)
- דיגאסטאן או טיקאגולור (לקרשי דם)
- דיסופימיד, דופטיליד, דרונדארון או קינדיין (לקצב לב לא רגיל)

- לומיטאפיד, לובאסטטין או סימבאסטטין (להורדת כולסטרול)
- סילדנאפיל (ליתר לחץ דם ריאתי)

תרופות לטיפול בבעיות בטןן או בעצירות

- זימאפריד (לכאבי בטן)
- סומפרידון (לבעיה או הקאות)
- נאלוקסגול (לעצירות הנגרמת מנטילת משככי כאבים אופיואידים)

תרופות לטיפול בכאבי ראש, בבעיות שינה או בבעיות נפשיות

דיהידרוארגומיין או ארגוטמין (ארגוט אלקלואידים המשמשים לטיפול בכאבי ראש מיגרנותיים)

מידאזולם (בבליעה) או טריאזולם (לשינה או להשריית שינה)

- לוראזידון, פימוזיד, קואטיאפיין או סרטינדול (לשכיזופניה, הפרעה בי-פולרית או לבעיות נפשיות אחרות)

תרופות לטיפול בבעיות במתן שתן

- דאריפנאסיל (לדליפת שתן)
- פוסטרודין או סולופנאסין (לשלפוחית שתן רגיזה), כאשר משמשת בחולים עם בעיות מסוימות בכליה או כבד

תרופות לטיפול באלרגיות

- אסטמיול, מיוולסטין או טרפנאדין (לאלרגיות)

תרופות לטיפול בבעיות זקפה ושפיכה

- אבאנאפיל (לבעיות זקפה)
- דאפוסקטין (לשפיכה מוקדמת)
- וארדנאפיל (לבעיות זקפה) כאשר משמשת בגברים מבוגרים מעל גיל 75

תרופות אחרות המכילות:

- כולכיצין (לשיגדון) כאשר משמשת בחולים עם בעיות בכליה או כבד

- ארגומטרין (ארגונובין) או מתילארגומטרין (מתילארגונובין) – ארגוט אלקלואידים המשמשים לאחר לידה

- אילגולוסטאט (למחלת גושה) המשמשת בחולים שגופם אינו יכול לפקח תרופות מסוימות
- האלופנטרין (למלריה)
- איבוקונאקן (לסרטן)

- איסבוקונאזול (לזיהומים פטרייטיים)
- אומביטאסוז, ריטונאביר, ריטונאביר עם או ללא דאטאבוויר (לטיפול בהפטיטיס C)

זכור – אין לקחת את התרופות הרשומות מעלה במשך שבועיים לאחר הטיפול האחרון בספורנוקס תמיסה לשתייה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בספורנוקס תמיסה לשתייה ופנה לרופא אם: הפסק לטיפול בספורנוקס תמיסה לשתייה ופנה לרופאך מיידית, אם אתה חש באחד מהתסמינים הבאים של בעיות כבד חריפות במהלך הטיפול:

חוסר יציבות חמור, בחילות, הקאות, עייפות חריגה, כאב בטן, שתן כהה באופן חריג או צואה בהירה.

ספר מייד לרופאך:

- אם הינך מפתח תחושת עקצוץ חריגה, ירידה בתחושתיות או חולשה בידיים או ברגליים, בזמן נטילת ספורנוקס תמיסה לשתייה.

- אם חווית תסמיני אובדן שמיעה. במקרים נדירים מאוד, מטופלים הנטלים ספורנוקס תמיסה לשתייה, דיווחו על אובדן שמיעה זמני או קבוע.

ספר לרופאך אם הינך סובל:

- סבלת בעבר מתגובה אלרגית לתרופות אנטו-פטרייטיות אחרות.

- מבעיה בלב כולל אי ספיקת לב. ספורנוקס תמיסה לשתייה עלולה להממיר את מצבך. אם רופאך מחליט לתת לך את ספורנוקס תמיסה לשתייה, עליך לדעת ולהיזהר מהתסמינים הבאים. אם הבחנת באחד מהם, הפסק לטיפול ספורנוקס תמיסה לשתייה ודווח לרופא מיידית. אלו עלולים להיות תסמינים לאי ספיקת לב:

- קוצר נשימה
- עלייה בלתי צפויה במשקל
- נפיחות ברגליים או בטן
- עייפות חריגה

- אם אתה מתעורר בלילות עם קוצר נשימה

- מבעיות כבד, כגון צהבת (הצהבה של העור), ייתכן שהייה צורך לשנות את מנת ספורנוקס תמיסה לשתייה. על הרופא להנחות אותך לגבי תסמינים שעליך להיזהר מהם.

אם עליך להשתמש בספורנוקס תמיסה לשתייה במשך זמן ממושך למשך יותר מחודש ימים, ייתכן והרופא ירצה לבדוק את כבד באמצעות ביצוע בדיקות דם. בנוסף ייתכן ויהיה תרופות מסוימות שלא תוכל לטול.

מסיטיקה פיברוזיס (מחלה תורשתית המשפיעה על הריאות, הלבלב, הכבד, הכליות והמעיים).

מבעיות בכליות, כיוון שיתכן ויהיה צורך לשנות את מינון ספורנוקס תמיסה לשתייה. בנוסף, ייתכן ויהיו תרופות מסוימות שלא תוכל לטול.

ילדים

ספורנוקס תמיסה לשתייה אינה מיועדת בדרך כלל לילדים. ייתכן והרופא ירשום אותה במקרים מיוחדים.

ספורנוקס תמיסה לשתייה מכילה ציקלודקסטרין, פרופילן גליקול ואלכוהול (אתנול). אין להשתמש בילדים מתחת לגיל שנתיים, אלא אם הרופא המליץ על השימוש. אם ילדך מתחת לגיל 5 שנים, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני מתן התרופה, במיוחד אם הילד מקבל תרופות אחרות המכילות ציקלודקסטרין, פרופילן גליקול או אלכוהול.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, עלול לקחת או לא לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל טיטול ללא מרשם ותוספת חזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

יש תרופות מסוימות אותן אין ליטול במקביל לנטילת ספורנוקס תמיסה לשתייה. תרופות אלה רשומות תחת **"אין להשתמש בתרופה אם"**.

תרופות מסוימות אינן מומלצות לשימוש יחד עם ספורנוקס תמיסה לשתייה.

ייתכן והרופא יחליט כי לא תוכל לקחת חלק מהתרופות **יחד או בטווח של שבועיים מהפסקת הטיפול בספורנוקס תמיסה לשתייה.**

דוגמאות לתרופות אלו הן:

תרופות לטיפול בבעיות בלב, בדם או במחזור הדם

- אפיקסאבאן, ריבארוקסאבאן או ווראפאקסאר (לקרשי דם)
- טורבסטאטין (להורדת רמת הכולסטרול)
- פלדיפיץ (ללחץ דם גבוה)
- ריוסגוגאט או טאדאלאפיל (ליתר לחץ דם ריאתי)

תרופות לטיפול באפילפסיה, כאבי ראש, או בעיות נפשיות

- פניטואין, קרבמזפיץ או פנוברביטל (אנטו-אפילפטיות)
- אלטרפטאין (לכאבי ראש מיגרנותיים)
- St. John's wort: היפריקום פרפוראטום) (תרופה צמחית לטיפול בבעיות נפשיות)

תרופות לטיפול בבעיות במתן שתן

- טוטלוסדין (לשלפוחית שתן בגברים)
- טוטלוסדין (לדליפת שתן רגיזה)

תרופות לטיפול בסרטן

- אקסטיניב, בוסטיניב, קבאזוטאקסיל, קבראנטיניב, סרטיניב, קובימסטיל, קיזיוטיניב, דבראפניב, דזאטיניב, דוסטקל, איברוטיניב, פלאטיניב, נילוטניב, אולפאריב, פופאניב, גרואפניב, סוניטיניב, טרבקטדין, טראסטוזומאם אמטאסין או ניקה אלקלואידים (כמו וינורלביץ או וינורלביץ)

תרופות לטיפול בשחפת

- בשאקיילין, איזוניאזיד, ריפאבוטין או ריפאמפיצין (לשחפת)

תרופות לטיפול בנגיף ה-HIV או בהפטיטיס

- אפאבירנא או נביראפיץ (תרופות לטיפול בנגיף ה-HIV/אייס)
- אליאסביר/גראזופריב, סימפריב, טנופוביר אלפאנמיד פומאראט (TAF), טנופוביר דיספורוקסיל פומאראט (TDF) לטיפול בנגיף ה-HIV או הפטיטיס)

תרופות לניתוח לאחר תרופות

- אברולימוס, ראפאמיצין (ידועה גם כסירולימוס) או תמסירוליומוס

תרופות לטיפול בהגדלה שפירה של הערמונית

אלפוזוצין, סילדנאפיל

תרופות לטיפול בבעיות בריאות או באלרגיות

- סיקלסוניד (לדלקת, אסתמה ואלרגיות)
- אלאסטיין (לאלרגיות)

- סאלמטרול (לאסתמה ומחלת ריאות חסימתית כרונית – COPD)

תרופות לטיפול אבעיות זקפה ושפיכה

- טאדאלאפיל או סילדנאפיל (בשימוש בגברים בני 75 ומטה) (לבעיות זקפה)

תרופות אחרות

- כולכיצין (לשיגדון)
- נוטקאטיל (לכאב)
- לומאקאט/איבקפטור (לסיסטיק פיברוזיס)

זכור – אין ליטול אף אחת מהתרופות מעלה במשך שבועיים מהטיפול האחרון בספורנוקס תמיסה לשתייה.

זו אינה הרשימה המלאה, על כן ספר לרופא אם הינך נוטל או מתכוון לטול אחת מתרופות אלו או לכל תרופה אחרת.

יש לשים לב אם הינך משתמש בספורנוקס תמיסה לשתייה יחד עם תרופות מסוימות אחרות.

הסבירות לתופעה לואי עלולה לעלות, או שהייה צורך לשנות את המינון של ספורנוקס תמיסה לשתייה או של התרופה האחרת. דוגמאות לתרופות כאלו:

תרופות לטיפול בבעיות בלב, בדם או במחזור הדם

- בוטופאן (ליתר לחץ דם ריאתי)
- חוסמי תעלות סידן כמו דיהידרופירידינים כמו אמלודיפיץ, איסרדיפיץ, ניפדיפיץ, ינימדופין או דילתיאזם (ליתר לחץ דם)
- או וראפאמיל (ללחץ דם גבוה)

- צילוסטאזול (לבעיות במחזור הדם)
- 'קומארינים' כמו וארפיץ (לקרשי דם)
- דיגוקסין (לרפפור פרודוריים)
- נאדולול (ליתר לחץ דם ריאתי או אנגינה)

תרופות לטיפול בבעיות בטןן או בשלשול

- ארפטיטאזול או טנופיטאנט (לשחילה והקאות במהלך טיפול בסרטן)
- לופרמיד (לטיפול בשלשול)

סותרי חומצה כמו אצטונייז, סידן, מגנזיום, סודיום ביקרבונט, חוסמי רפוטור H2 כמו סימטידין, רבטידון ומעכבי משאבת מימן כמו לאנופראזול, אומפראזול, ראפפראזול (לטיפול בבעיות חומציות בקיבה)

תרופות לטיפול בבעיות בריאות

- אלפרולואיס, בוטעיותאם, בוספירין או מדיאזלום (בהורקה לווריד) (לחצה או להשריית שינה)
- זופיקסון (להשריית שינה)
- דובוסטין או וולנאטיין (לדיכאון וחרדה)
- אריפפראזול, קריפראזין, הלופרידול או ריספרידון (לשכיזופניה, הפרעה בי-פולרית או בעיות נפשיות אחרות)

- גאלאנטמין (למחלת אלצהיימר)
- גואנפאסין (להפרעות קשב והיפראקטיביות)

תרופות לטיפול בבעיות במתן שתן

- אימדיפאסין, פסטרודין, אוקסיבוטינין, סוליפנאסין (לשלפוחית שתן רגיזה)

תרופות לטיפול בסרטן

- גפיוזומיב, בירטוסקימאם דוטין ביסולפאן, ארלוטיניב, גפיטיניב, אידלואטיסיב, אימטיניב, ניטדאניב, פאנובוניוסטאט, פונאטיניב, רוקסולטיניב או סונידגיב

תרופות לטיפול בזיהומים

- היפרופלוקסין, גזיאומיצין או אריתרומיצין (לזיהומים בקטריאליים)

- ארטמאניד (לשחפת)
- ארטמטר-לומפאנטרין (לטיפול במלריה)
- פראמיטאנט (לתלעי קרס וניתול (סרט)

תרופות לטיפול בנגיף ה-HIV או בהפטיטיס

- קוואסיטאט, אלביטגראביר מוגבר (boosted), ביקרבונט, חוסמי רפוטור H2 כמו סימטידין, רבטידון ומעכבי משאבת מימן כמו לאנופראזול, אומפראזול, ראפפראזול (לטיפול בבעיות חומציות בקיבה)

תרופות לטיפול לאחר תרופות

- אלפרולואיס, בוטעיותאם, בוספירין או מדיאזלום (בהורקה לווריד) (לחצה או להשריית שינה)
- זופיקסון (להשריית שינה)
- דובוסטין או וולנאטיין (לדיכאון וחרדה)
- אריפפראזול, קריפראזין, הלופרידול או ריספרידון (לשכיזופניה, הפרעה בי-פולרית או בעיות נפשיות אחרות)

- גאלאנטמין (למחלת אלצהיימר)
- גואנפאסין (להפרעות קשב והיפראקטיביות)

תרופות לטיפול בבעיות במתן שתן

- אימדיפאסין, פסטרודין, אוקסיבוטינין, סוליפנאסין (לשלפוחית שתן רגיזה)

תרופות לטיפול בסרטן

- גפיוזומיב, בירטוסקימאם דוטין ביסולפאן, ארלוטיניב, גפיטיניב, אידלואטיסיב, אימטיניב, ניטדאניב, פאנובוניוסטאט, פונאטיניב, רוקסולטיניב או סונידגיב

תרופות לטיפול בזיהומים

- היפרופלוקסין, גזיאומיצין או אריתרומיצין (לזיהומים בקטריאליים)

- ארטמאניד (לשחפת)
- ארטמטר-לומפאנטרין (לטיפול במלריה)
- פראמיטאנט (לתלעי קרס וניתול (סרט)

תרופות לטיפול בנגיף ה-HIV או בהפטיטיס

- קוואסיטאט, אלביטגראביר מוגבר (boosted), ביקרבונט, חוסמי רפוטור H2 כמו סימטידין, רבטידון ומעכבי משאבת מימן כמו לאנופראזול, אומפראזול, ראפפראזול (לטיפול בבעיות חומציות בקיבה)

תרופות לטיפול לאחר תרופות

- אלפרולואיס, בוטעיותאם, בוספירין או מדיאזלום (בהורקה לווריד) (לחצה או להשריית שינה)
- זופיקסון (להשריית שינה)
- דובוסטין או וולנאטיין (לדיכאון וחרדה)
- אריפפראזול, קריפראזין, הלופרידול או ריספרידון (לשכיזופניה, הפרעה בי-פולרית או בעיות נפשיות אחרות)

- גאלאנטמין (למחלת אלצהיימר)
- גואנפאסין (להפרעות קשב והיפראקטיביות)

תרופות לטיפול בבעיות במתן שתן

- אימדיפאסין, פסטרודין, אוקסיבוטינין, סוליפנאסין (לשלפוחית שתן רגיזה)

תרופות לטיפול בסרטן

- גפיוזומיב, בירטוסקימאם דוטין ביסולפאן, ארלוטיניב, גפיטיניב, אידלואטיסיב, אימטיניב, ניטדאניב, פאנובוניוסטאט, פונאטיניב, רוקסולטיניב או סונידגיב

תרופות לטיפול בזיהומים

- היפרופלוקסין, גזיאומיצין או אריתרומיצין (לזיהומים בקטריאליים)

- ארטמאניד (לשחפת)
- ארטמטר-לומפאנטרין (לטיפול במלריה)
- פראמיטאנט (לתלעי קרס וניתול (סרט)

תרופות לטיפול בנגיף ה-HIV או בהפטיטיס

- קוואסיטאט, אלביטגראביר מוגבר (boosted), ביקרבונט, חוסמי רפוטור H2 כמו סימטידין, רבטידון ומעכבי משאבת מימן כמו לאנופראזול, אומפראזול, ראפפראזול (לטיפול בבעיות חומציות בקיבה)

תרופות לטיפול לאחר תרופות

- אלפרולואיס, בוטעיותאם, בוספירין או מדיאזלום (בהורקה לווריד) (לחצה או להשריית שינה)
- זופיקסון (להשריית שינה)
- דובוסטין או וולנאטיין (לדיכאון וחרדה)
- אריפפראזול, קריפראזין, הלופרידול או ריספרידון (לשכיזופניה, הפרעה בי-פולרית או בעיות נפשיות אחרות)

- גאלאנטמין (למחלת אלצהיימר)
- גואנפאסין (להפרעות קשב והיפראקטיביות)

תרופות לטיפול בבעיות במתן שתן

- אימדיפאסין, פסטרודין, אוקסיבוטינין, סוליפנאסין (לשלפוחית שתן רגיזה)

תרופות לטיפול בסרטן

- גפיוזומיב, בירטוסקימאם דוטין ביסולפאן, ארלוטיניב, גפיטיניב, אידלואטיסיב, אימטיניב, ניטדאניב, פאנובוניוסטאט, פונאטיניב, רוקסולטיניב או סונידגיב

תרופות לטיפול בזיהומים

- היפרופלוקסין, גזיאומיצין או אריתרומיצין (לזיהומים בקטריאליים)

- ארטמאניד (לשחפת)
- ארטמטר-לומפאנטרין (לטיפול במלריה)
- פראמיטאנט (לתלעי קרס וניתול (סרט)

תרופות לטיפול בנגיף ה-HIV או בהפטיטיס

- קוואסיטאט, אלביטגראביר מוגבר (boosted), ביקרבונט, חוסמי רפוטור H2 כמו סימטידין, רבטידון ומעכבי משאבת מימן כמו לאנופראזול, אומפראזול, ראפפראזול (לטיפול בבעיות חומציות בקיבה)

תרופות לטיפול לאחר תרופות