

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - 1986**

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

اسم الدواء شكله وعياره:

سيبورانوكس™ محلول للشرب،

10 ملغم/مل

المادة الفعالة وتركيزها:

يحتوي كل مل على 10 ملجم إيتراكونازول

Each ml contains 10 mg itraconazole

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" وكذلك الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتعمق حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأى غرض مخصص الدواء؟

ينتمي سبورانوكس محلول للشرب لمجموعة الأدوية المُسمّاة مضادات الفطريات. تستعمل هذه الأدوية لعلاج ولمنع التلوث بالفطريات بما في ذلك الخمائر.

يُستعمل الدواء لعلاج التلوثات الفطرية في البلعوم السفلي والمريء ولمنع التلوثات الفطرية أثناء قلة العدلات لدى المرضى الذين يعانون من خلل في الأداء الوظيفي لجهاز المناعة.

الفصيلة العلاجية: مضاد للفطريات من فصيلة التريازول.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الأرجي) للمادة الفعالة أو لك واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء المفصلة في الفقرة 6 ("معلومات إضافية").

• كنت في فترة الحمل، تعتدين بأنك قد تكونين حاملاً أو يمكنك أن تصبحي حاملاً (أنظر فقرة الحمل).

قبل إستعمال سبورانوكس محلول للشرب، إحكِ لطبيبك إذا كنت تتناول أيّة أدوية.

• لا يجوز إستعمال سبورانوكس محلول للشرب إذا كنت تتناول إحدى الأدوية التالية. إذا كنت تستعمل المستحضر سبورانوكس محلول للشرب، وتحلّب منه العلاج بإحدى الأدوية أدناه، يجب بدء هذا العلاج بعد أسبوعين من التوقف عن إستعمال سبورانوكس محلول للشرب.

○ أدوية لعلاج مشاكل في القلب، في الدم أو في الدورة الدموية

• أليسكيرين، إپيليرينون، ليركانديبين أو نيزولديبين (اضغط الدم المرتفع)

• بيبيريديل، إيقابراديin أو رانولازين (الذبحة)

• دابيچاتان أو تيكاجريلور (اللختارات الدموية)

• ديسوپراميد، دوفيتيليد، درونيدارون أو كينيدين (عدم سلامه نظم القلب)

• لوميتاپيد، لوڤاستاتين أو سيمفاستاتين (الخفض الكوليسترول)

• سيلدينافيل (لفرط ضغط الدم الرئوي)

○ أدوية لعلاج مشاكل البطن أو الإمساك

• سيزاپرید (ألم البطن)

• دومپيريدون (الغثيان أو النقيّوات)

• نالوكسيچول (لإمساك الناجم عن تناول مسكنات الآلام ذات المفعول الأنفيوني)

○ أدوية لعلاج الصداع، مشاكل النوم أو المشاكل النفسية

• ديهيدروإيرچوتامين أو إيرچوتامين (قلويات الإرچوت المستعملة لعلاج صداع الشقيقة)

• ميدازولام (البلع) أو تريازولام (النوم أو للحث على النوم)

• لورازيدون، پيموزيد، كوبتيپان أو سيرتنيدول (إنفصام الشخصية، إضطراب ثانٍي القطب أو لمشاكل نفسية أخرى)

○ أدوية لعلاج مشاكل التبول

• دارفيناسين (التسرّب البول)

• فيسوتيبردين أو سوليفيناسين (للحساسية)

○ أدوية لعلاج مشاكل الإنتصاب والقذف

• أفادينافيل (المشاكل إنتصاب العضو الذكري)

• داپوكسيتين (القذف المبكر)

• قاردینافيل (لمشاكل إنتصاب العضو الذكري) عندما يستعمل لدى الرجال الكبار فوق عمر 75 سنة

○ أدوية أخرى التي تحتوي على:

• كولشيسين (النقرس) عندما يستعمل لدى مرضى لديهم مشاكل في الكبد

• إرچومترین (إرچونوفين) أو ميثيل إرچومترین (ميثيل إرچونوفين)

- قلويات الإرغوت التي تستعمل بعد الولادة

• إيليكچولستات (داء غوشيه) المستعمل لدى مرضى لا يفك جسمهم أدوية معينة

• هالوفانترين (الملاريا)

• إرينيوتican (لسرطان)

• إيساقوکونازول (لتلوثات الفطريات)

• أو ميبيتاسفير، پاريتاپريثير، ريتونافير مع أو بدون داسابوغير (العلاج إلتهاب الكبد C)

تذكر - لا يجوز تناول الأدوية المسجلة أعلاه خلال أسبوعين بعد العلاج الأخير بـ سبورانوكس محلول للشرب.

تحذيرات خاصة تتعلق بـ إستعمال الدواء

قبل العلاج بـ سبورانوكس محلول للشرب إحكِ للطبيب إذا:

توقف عن تناول سبورانوكس محلول للشرب وتوجه لطبيبك فوراً، إذا شعرت بإحدى الأعراض التالية لمشاكل حادة في الكبد خلال العلاج:

● قلة شهية شديدة للطعام، غثيان، تققيّات، إرهاق شاذ، ألم في البطن، بول داكن بشكل شاذ أو براز فاتح اللون.

إحكِ لطبيبك إذا كنت تعاني:

● عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي لأدوية أخرى مضادة للفطريات.

● من مشكلة في القلب بما في ذلك قصور القلب. قد يفاقم سبورانوكس محلول للشرب حالتك. إذا قرر طبيبك إعطاءك سبورانوكس محلول للشرب، فعليك أن تكون على دراية والحذر من الأعراض التالية. إذا لاحظت إحداها، فتوقف عن تناول سبورانوكس محلول للشرب وبلغ الطبيب فوراً. هذه قد تكون علامات لقصور القلب:

• ضيق في التنفس

• ارتفاع غير متوقع في الوزن

• إنفاس في الرجلين أو في البطن

• إرهاق شاذ

● إذا كنت تستيقظ في الليل مع ضيق في التنفس

● من مشاكل في الكبد، مثل يرقان (اصفرار الجلد)، من الجائز أن يحتاج الأمر إلى تغيير المقدار الدوائية من سبورانوكس محلول للشرب.

● تستخدم لدى مرضى لديهم مشاكل معينة في الكبد أو الكبد

○ أدوية لعلاج الحساسية

• أستيميزول، ميزولاستين أو تيرفينادين (للحساسية)

○ أدوية لعلاج مشاكل الإنتصاب والقذف

• أفادينافيل (المشاكل إنتصاب العضو الذكري)

• داپوكسيتين (القذف المبكر)

• قاردینافيل (لمشاكل إنتصاب العضو الذكري) عندما يستعمل لدى الرجال الكبار فوق عمر 75 سنة

○ أدوية أخرى التي تحتوي على:

• كولشيسين (النقرس) عندما يستعمل لدى مرضى لديهم مشاكل في الكبد

• إرچومترین (إرچونوفين) أو ميثيل إرچومترین (ميثيل إرچونوفين)

- قلويات الإرغوت التي تستعمل بعد الولادة

• إيليكچولستات (داء غوشيه) المستعمل لدى مرضى لا يفك جسمهم أدوية معينة

• هالوفانترين (الملاريا)

• إرينيوتican (لسرطان)

• إيساقوکونازول (لتلوثات الفطريات)

• أو ميبيتاسفير، پاريتاپريثير، ريتونافير مع أو بدون داسابوغير (العلاج إلتهاب الكبد C)

تذكر - لا يجوز تناول أي دواء من الأدوية المسجلة تحت "لا يجوز إستعمال الدواء إذا"

لا يوصى بـ سبورانوكس محلول للشرب مع سبورانوكس محلول للشرب.

من الجائز أن يقرر الطبيب أن يقتصر العلاج بإحدى الأدوية المسجلة أو في الحالات التي لا ينفع فيها العلاج بـ سبورانوكس محلول للشرب.

أمثلة لهذه الأدوية:

● من مرض التليف الكيسي (مرض وراثي الذي يؤثر على الرئتين، البنكرياس، الكبد، الكلى والأمعاء).

● من مشاكل في الكلى، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى تغيير المقدار الدوائية من سبورانوكس محلول للشرب. بالإضافة لذلك، من الجائز أن تكون هناك أدوية لا يمكن تناولها.

○ أدوية لعلاج الحساسية

• أستيميزول، ميزولاستين أو تيرفينادين (للحساسية)

○ أدوية لعلاج مشاكل الإنتصاب والقذف

• أفادينافيل (المشاكل إنتصاب العضو الذكري)

• داپوكسيتين (القذف المبكر)

• قاردینافيل (لمشاكل إنتصاب العضو الذكري) عندما يستعمل لدى الرجال الكبار فوق عمر 75 سنة

○ أدوية أخرى

• كولشيسين (النقرس) عندما يستعمل لدى مرضى لديهم مشاكل في الكبد

• إرچومترین (إرچونوفين) أو ميثيل إرچومترین (ميثيل إرچونوفين)

- قلويات الإرغوت التي تستعمل بعد الولادة

• إيليكچولستات (داء غوشيه) المستعمل لدى مرضى لا يفك جسمهم أدوية معينة

• هالوفانترين (الملاريا)

• إرينيوتican (لسرطان)

• إيساقوکونازول (لتلوثات الفطريات)

• أو ميبيتاسفير، پاريتاپريثير، ريتونافير مع أو بدون داسابوغير (العلاج إلتهاب الكبد C)

تذكر - لا يجوز تناول تناول سبورانوكس محلول للشرب.

تحذيرات خاصة تتعلق بـ إستعمال الدواء

قبل العلاج بـ سبورانوكس محلول للشرب إحكِ للطبيب إذا:

توقف عن تناول سبورانوكس محلول للشرب وتوجه لطبيبك فوراً، إذا شعرت بإحدى الأعراض التالية لمشاكل حادة في الكبد خلال العلاج:

● قلة شهية شديدة للطعام، غثيان، تققيّات، إرهاق شاذ، ألم في البطن، بول داكن بشكل شاذ أو براز فاتح اللون.

إحكِ لطبيبك إذا كنت تعاني:

● إذا تطور لديك شعور بوخر شاذ، قلة الحس أو ضعف في اليدين أو في الرجلين، خلال تناول سبورانوكس محلول للشرب.

● إذا قايسست من أعراض فقدان السمع. في حالات نادرة جداً، بلغ المتعالجون الذين يتناولون سبورانوكس محلول للشرب عن فقدان مؤقت أو دائم للسمع.

● نالوكسيچول (لإمساك الناجم عن تناول مسكنات الآلام ذات المفعول الأنفيوني)

○ أدوية لعلاج الصداع، المشاكل في النوم أو المشاكل النفسية

• ديهيدروإيرچوتامين أو إيرچوتامين (قلويات الإرچوت المستعملة لعلاج صداع الشقيقة)

• ميدازولام (البلع) أو تريازولام (النوم أو للحث على النوم)

• لورازيدون، پيموزيد، كوبتيپان أو سيرتنيدول (إنفصام الشخصية، إضطراب ثانٍي القطب أو لمشاكل نفسية أخرى)

○ أدوية لعلاج مشاكل التبول

• تامسولوسين (التسرّب البول لدى الكبار)

• تولتيرودين (المثانة البولية العصبية)

○ أدوية لعلاج مشاكل البطن أو الإمساك

• سيزاپرید (ألم البطن)

• دومپيريدون (الغثيان أو النقيّوات)

• نالوكسيچول (لإمساك العضو الذكري)

○ أدوية لعلاج مشاكل الأمعاء

• سيزاپرید (ألم الأمعاء)

● يذكر - لا يجوز تناول أي دواء من الأدوية المسجلة تحت "لا يجوز إستعمال الدواء إذا"

لا يوصى بـ سبورانوكس محلول للشرب مع سبورانوكس محلول للشرب.

من الجائز أن يقرر الطبيب أن يقتصر العلاج بإحدى الأدوية المسجلة أو في الحالات التي لا ينفع فيها العلاج بـ سبورانوكس محلول للشرب.

أمثلة لهذه الأدوية:

● من مرض التليف الكيسي (مرض وراثي الذي يؤثر على الرئتين، البنكرياس، الكبد، الكلى والأمعاء).

● من مشاكل في الكلى، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى تغيير المقدار الدوائية من سبورانوكس محلول للشرب.

أدوية لعلاج الألم

- أفيينتانيل، بويرينورفين، أوكيسيكودون أو سوفينتانيل (للألم)
- ميلوكسيكام (لإلتهاب المفاصل والآلام)
- **أدوية أخرى**
 - ألتريتيينوين (عبر الفم) (للاكتزيم)
 - كابيرجولين (لمرض الباركيتسون)
 - منتجات أساسها القنب بما في ذلك أدوية (الغثيان والتقيؤات أو إنقباض العضلات لدى مرضى يعانون من التصلب المتعدد)
 - سيناكلسيت (لفرط نشاط الغدة الدرقية)
 - ديبينوجيست أو أولبيريستال (لمتن الحمل)
 - إيليجلوستات (المرض غوشيه) الذي يستعمل لدى مرضى ليس بإمكان جسمهم تفكك أدوية معينة
 - إيفاكافتور (التليف الكيسى)
 - ميثادون (العلاج الإدمان على الأدوية)
 - ربپاچلپینيد أو ساکساچلپین (للسكري)

هذه ليست القائمة الكاملة، لذا إحكام للطبيب إذا كنت تتناول أو تبني تناول إحدى هذه الأدوية أو أي دواء آخر.

إستعمال الدواء والطعام

لا يجوز تناول سپورانوكس محلول للشرب سوية مع طعام أو شراب، لأن هذا الأمر يقلل من قدرة الجسم على إمتصاص الدواء. يجب دائمًا تناول سپورانوكس محلول للشرب ساعة واحدة قبل الطعام أو الشراب لمساعدة الجسم على إمتصاص الدواء.

المسنون سپورانوكس محلول للشرب غير مخصص عادة للمسنين. من الجائز أن يصفه الطبيب في حالات خاصة.

لا يجوز إستعمال سپورانوكس محلول للشرب إذا كنت في فترة الحمل، إلا بتعليمات من الطبيب.

إذا كنت في سن الخصوبة ومن شأنك أن تصبحي حاملًا يجب إستشارة الطبيب. عليك إستعمال وسائل منع حمل ناجعة لضمان عدم حصول حمل لديك خلال فترة تناول هذا الدواء. بما أن سپورانوكس محلول للشرب يبقى في الجسم لفترة زمنية معينة بعد التوقف عن إستعماله، يجب مواصلة إستعمال وسيلة منع حمل من أي نوع كان حتى ظهور الدورة الشهرية التالية بعد التوقف عن تناول الدواء.

إذا اكتشفت بأنك حامل في العلاج بعد بدء العلاج بـ سپورانوكس محلول للشرب، فتوقف عن العلاج وبلغ الطبيب فوراً.

يجب دائمًا إبلاغ الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، تعتدين بأنك قد تكونين في فترة الحمل أو تحاولين الحمل وذلك قبل أن تتناولين أي دواء.

الإرضا إذا كنت مريضة، فلا يجوز تناول سپورانوكس محلول للشرب لأن كميات قليلة من الدواء قد تتوارد في حليب الأم. إذا أوصى الطبيب بتناول سپورانوكس محلول للشرب، فمن الجائز أن يطلب إجراء فحوص إضافية خلال العلاج بالدواء.

السيقة وإستعمال الماكنات من شأن سپورانوكس محلول للشرب أن يؤدي أحياناً إلى دوار، تشوش في الرؤية/إزدواج الرؤية أو فقدان السمع. إذا وجدت لديك هذه الأعراض فلا تقم بالسيقة ولا تشغلي الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي سپورانوكس محلول للشرب على سوربيتول يحتوي الدواء على 7,920 ملغ سوربيتول بمقدار دوائي ذي 40 مل، الذي يعادل 198 ملغ في كل مل.

إذا قال لك طبيبك بأنك أنت (أو طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إضطراب وراثي نادر فيه لا يمكن تفكيك الفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء. إن السوربيتول هو مصدر للفروكتوز وقد يؤدي إلى إنتزاع في البطن وإلى تأثير مُسهل معتدل.

يحتوي سپورانوكس محلول للشرب على پروپيلين چليکول يحتوي هذا الدواء على 4.2 غرام پروپيلين چليکول في كل مقدار دوائي ذي 40 مل، الذي يعادل 104 ملغ في كل مل. إذا كنت في فترة الحمل، هذا الكمية في 40 مل دواء تعادل على الأقل 1 مل بيرة أو 1 مل نبيذ.

إن يكون لهذه الكمية القليلة التي في الدواء تأثير ملحوظ.

يحتوي سپورانوكس محلول للشرب على صوديوم يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملغ) في 40 مل، أي أنه فعلياً "خالي من الصوديوم".

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا تناول سپورانوكس محلول للشرب ساعة واحدة قبل الطعام أو الشراب لمساعدة الجسم على إمتصاص الدواء.

يجب غرغرة الدواء في الفم لمدة 20 ثانية تقريباً قبل بلعه. لا يجوز غسل الفم بعد بلع محلول الشرب.

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

تم إرفاق كأس قياس للمحلول مع العلامة 10 مل. تأكد من ملء الكأس حتى العلامة 10 مل. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

تعليمات لفتح القنية: تتوفّر القنية سادة أمان التي تمنع الفتح العرضي من قبل الأطفال.

يجب فتح القنية بالضغط على الغطاء نحو الأسفل (1) بينما تقوم بالتدوير ضد إتجاه عقارب الساعة (2).

تعليمات إستعمال كأس القياس: يستعمل كأس القياس كما تم وضعها على القنية.

انتبه بأن الجانب المعلم بتدريجات (الجانب الأصيق) متوجه نحو الأعلى. يجب ملء هذا الجانب الصحيح متوجه نحو الأعلى.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء، تناول المقدار الدوائي التالي كما هو معتاد وواصل العلاج وفقاً لتعليمات الطبيب. لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً.

يجب الموازنة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سپورانوكس محلول للشرب قد يسبب أعراضًا جانبية لدى مرضى المستعملين. لا تندهى من قائمة الأعراض الجانبية.

من الجائز ألا تعاني أي منها. قد تسبب الأدوية أعراضًا جانبية خطيرة.

توقف عن تناول الدواء وتوجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تشعر بـ:

• صفير مفاجئ، صعوبات في التنفس، إنتفاخ في الوجه، طفح حكة (في كامل الجسم) أو مشكلة جلدية حادة (طفح منتشر مع تقرش في الجلد وحويصلات في الفم، العينين والأعضاء التناسلية أو طفح مع بثر قيحية أو حويصلات).

• قلة شهية شديدة للطعام، غثيان، تقيؤات، إرهاق شاذ، آلام في البطن، بول داكن بشكل شاذ أو براز فاتح اللون. هذه يمكن أن تكون أعراض لمشاكل خطيرة في الكبد.

كما أنه يجب التوجه فوراً للطبيب إذا كنت تعاني من الأعراض الجانبية التالية:

• أعراض مشابهة لقصور القلب، مثل ضيق في التنفس، إرهاق شاذ أو تقيؤ نتيجة تناول سپورانوكس محلول للشرب:

• فائض الشحوم الثلاثية (الدهون) في الدم

• إرتفاع نسبة الكرياتين فوسفوكيناز في الدم

الأعراض الجانبية التالية بُلغ عنها لدى المتعالجين الذين تناولوا تركيبات أخرى من سپورانوكس محلول للشرب:

• تلوث في الطرق التنفسية العلوية

• إلتهاب الأنف

• إرتفاع في نسبة البوتاسيوم في الدم

• إلتهاب المعدة والجهاز الهضمي

• زباد في الأداء الوظيفي للكبد في فحوص معينة (زيادة في إنزيمات الكبد)

• إلتهاب الكبد (hepatitis)

• إصفرار الجلد (يرقان)

• تزايد التعرق

• مشاكل في الكلى

• تزايد إنتاج البول

• مشاكل في إنتصاب العضو الذكري

• إنتفاخ عام

• إرتفاع في نسبة البوتاسيوم في الدم

• إرتفاع في الوجه

• ألم في الصدر

• ألم

• قشعريرة

• إرهاق

• إرتفاع في نسبة اليوريا في الدم

• نتائج غير سليمة في البول

إذا ظهر عرض جانبي، إذا يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة/القنية. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة 25 درجة مئوية وما دون ذلك.

لا يجوز إستعمال محلول الشرب أكثر من شهر بعد فتحه للمرة الأولى.

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجاالت الأطفال دون تناوله.

يجب إستعمال التسمم بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة/القنية. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب إستعمال محلول الشرب على درجة حرارة مرتقبة (pass water) في الليل بشكل

مستعملين من بين 100:1.

يجب إستعمال الماء الذي يعادل بمقدار 7,920 ملغ سوربيتول بمقدار دوائي ذي 40 مل.

إذا قال لك طبيبك بأنك أنت (أو طفلك) تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إضطراب وراثي نادر فيه لا يمكن تفكيك الفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة أو إذا شخصت بأنك تعاني من عدم تحمل وراثي للفروكتوز، إستشر الطبيب قبل إستعمالكما أنت (أو طفلك) الدواء.

</