

پرالوئنت 75 ملغ

محلول للحقن تحت الجلد

پرالوئنت 150 ملغ

محلول للحقن تحت الجلد

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل بدء إستعمال پرالوئنت، تحدث مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة. إذا تطور لديك رد فعل تحسسي خطير، توقف عن تناول پرالوئنت وتوجه في الحال إلى الطبيب. حدث أحياناً ردود فعل تحسسية خطيرة مثل فرط حساسية، بما في ذلك وذمة وعائية (صعوبات في التنفس، أو إنتفاخ الوجه، الشفتين، الحنجرة أو اللسان)، nummular eczema (إكزيما درهمية) (بقع حمراء على الجلد، أحياناً مع حويصلات) والتهاب الأوعية الدموية على خلفية فرط الحساسية (hypersensitivity vasculitis) - شكل خاص لرد فعل تحسسي مفرط مع أعراض مثل إسهال، مع طفح أو نقاط بنفسجية على الجلد.

أنظر الفقرة 4 لمعلومات عن ردود الفعل التحسسية التي قد تحدث أثناء فترة استعمال پرالوئنت.

قبل إستعمال الدواء بلغ طبيبك إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو في الكبد، وذلك لأنك تم فحص پرالوئنت لدى عدد قليل من المعالجين الذين يعانون من مرض كلوي شديد ولم يتم فحصه لدى معالجين يعانون من مرض كبدي شديد.

الأطفال والمراهقون

برالوئنت غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة. لم تثبت السلامة والنجاعة لدى الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة.

إذا كنت تستعمل أو إذا استعملت مؤخرًا دوائية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضا

إذا كنت في فترة الحمل أو مرحلة، تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملاً أو تخطيبي للحمل، إستشيري الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل إستعمال هذا الدواء.

لا يوصى بإستعمال پرالوئنت خلال فترة الحمل أو خلال فترة الرضاعة.

السيادة وإستعمال الماكنت

من غير المتوقع أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على السيادة أو إستعمال الماكنت.

كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا الإستعمال حسب تعليمات الطبيب بالضبط. عليك الإستياضاح من

كم تحقق

يحدد طبيبك المقدار الدوائي الصحيح من أجلك ووتيرة الحقن الصحيحة (75 ملغ أو 150 ملغ كل أسبوعين أو 300 ملغ مرة كل 4 أسابيع).

يقوم الطبيب خلال فترة العلاج بفحص نسب الكوليسترول لديك ومن شأنه أن يقوم بملاءمة المقدار الدوائي وفقاً لذلك (رفع أو خفض المقدار الدوائي).

قبل كل عملية حقن تتحقق من الملصقة، وتأكد من صحة إسم الدواء والعيار الدوائي.

العلاج منفرد (پرالوئنت لوحده) أو بمشاركة أدوية إضافية لخفض نسب الشحوم في الدم لدى متعالجين لا يمكنهم تحمل أدوية من فصيلة الستاتينات أو لا يمكن إستعمالها لديهم.

الفصيلة العلاجية:

اليروكوماب هو ضد بشرى أحادي النسيلة يساعد على خفض نسب الكوليسترول في الدم.

يساعد پرالوئنت على خفض نسب الكوليسترول "السيء" لديك (المسمى أيضاً

PCSK9). PCSK9 هو عبارة عن بروتين يفرز من قبل خلايا الكبد.

* يتم عادة طرح الكوليسترول "السيء" من دمك بواسطة إرتباطه بمستقبلات معينة ("محطات إرساء") في كبدك.

* يقلل من عدد تلك المستقبلات في الكبد - الأمر الذي يجعل الكوليسترول

"السيء" لديك أكثر من المطلوب.

پرالوئنت يحجب PCSK9 وبذلك يزيد من عدد المستقبلات المتوفرة للمساعدة على خفض الكوليسترول "السيء" لديك.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال أكثر من المطلوب من پرالوئنت

إذا قمت بإستعمال أكثر من المطلوب من پرالوئنت، راجع الطبيب، الصيدلي أو

الممرضة.

لا يجوز إستعمال الدواء

إذا كنت حساساً لاليروكوماب أو لأحد المركبات الأخرى لهذا الدواء (أنظر

الفقرة 6).

SANOFI

المادة الفعالة:

پرالوئنت 75 ملغ - كل قلم / محقنة جاهزة للاستعمال يحتوي على 75 ملغ

من أليروكوماب 75 mg alirocumab 75 mg.

پرالوئنت 150 ملغ - كل قلم / محقنة جاهزة للاستعمال يحتوي على 150

ملغ من أليروكوماب 150 mg alirocumab 150 mg.

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 6.

اقرأ التشرعة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

احفظ هذه النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

ووصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بحالك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

پرالوئنت غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والراهقين دون عمر 18

سنة.

أقرأ التشرعة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

احفظ هذه النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

ووصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بحالك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

پرالوئنت غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال والراهقين دون عمر 18

سنة.

أ) لأي غرض مخصص پرالوئنت؟

• لمعالجة البالغين الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم الأولي [العائلي متغير الزيجوت أو غير

العائلي] أو من خلل شحوم الدم المختلط] بمشاركة تغذية تم ملاءمتها.

• لعلاج البالغين الذين يعانون من فرط كوليسترول في الدم ومن مرض

قلبي وعائي وذلك من أجل تخفيف الخطورة على القلب والأوعية الدموية.

يعطي الدواء:

* بمشاركة دواء من فصيلة الستاتينات أو بمشاركة دواء من فصيلة الستاتينات

وأدوية إضافية لخفض نسب الشحوم في الدم، لدى متعالجين لديهم المقدار

الدوائي الأعظمي الذي يمكن تحمله لدواء من فصيلة الستاتينات لا يخفض بشكل

كاف من نسب الكوليسترول في الدم

أو

كعلاج منفرد (پرالوئنت لوحده) أو بمشاركة أدوية إضافية لخفض نسب الشحوم

في الدم لدى متعالجين لا يمكنهم تحمل أدوية من فصيلة الستاتينات أو لا يمكن

استعمالها لديهم.

الفصيلة العلاجية:

اليروكوماب هو ضد بشرى أحادي النسيلة يساعد على خفض نسب الكوليسترول

في الدم.

يساعد پرالوئنت على خفض نسب الكوليسترول "السيء" لديك (المسمى أيضاً

LDL كوليسترول).

PCSK9.

* PCSK9 هو عبارة عن بروتين يفرز من قبل خلايا الكبد.

* يتم عادة طرح الكوليسترول "السيء" من دمك بواسطة إرتباطه بمستقبلات

معينة ("محطات إرساء") في كبدك.

* يقلل من عدد تلك المستقبلات في الكبد - الأمر الذي يجعل الكوليسترول

"السيء" لديك أكثر من المطلوب.

پرالوئنت يحجب PCSK9 وبذلك يزيد من عدد المستقبلات المتوفرة للمساعدة

على خفض الكوليسترول "السيء" لديك.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء

إذا كنت حساساً لاليروكوماب أو لأحد المركبات الأخرى لهذا الدواء (أنظر

الفقرة 6).

إذا نسيت إستعمال پرالوئنت

إذا نسيت المقدار الدوائي من پرالوئنت، قم بحقنه حالاً متى إستطعت. إحقن المقدار الدوائي القادر بحسب جدول المواعيد الإعتيادي. بذلك تعود لجدول

مواعيد الحقن الأساسية. إسترشد الطبيب، الصيدلي أو الممرضة، إذا كنت غير واثق متى يتوجب عليك حقن پرالوئنت.

لا يجوز حقن مقداراً دوائياً مضاعفاً كتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

في حال توقفك عن إستعمال پرالوئنت

لا تتوقف عن إستعمال پرالوئنت بدون إستشارة الطبيب. إن التوقف عن الإستعمال قد يؤدي لإرتفاع نسبة الكوليسترول لديك.

لا يجوز إستعمال الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء إسترشد الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال پرالوئنت قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدنى من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعاني أي منها.

إذا تطور لديك رد فعل تحسسي خطير، توقف عن إستعمال پرالوئنت وتوجه إلى الطبيب في الحال.

في بعض الأحيان تم ملاحظة (الذي حتى متعالج واحد من بين 1000) ردود فعل تحسسية خطيرة تشمل: فرط حساسية (صعوبات في التنفس)، nummular eczema (إكزيما درهمية) - بقع حمراء على الجلد، أحياناً مع حويصلات وإلتهاب الأوعية الدموية على خلفية فرط الحساسية (hypersensitivity vasculitis) - هو شكل خاص من رد فعل لفرط الحساسية مع أعراض مثل إسهال، مع طفح أو نقاط بنفسجية على الجلد.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض من شأنها أن تظهر لديك حتى متعالج 1 من بين 10:

• إحمرار، حكة، إنتفاخ، ألم / حساسية في مكان الحقن (رد فعل موضعي في مكان الحقن).

• أعراض لإلتهاب في الطرق التنفسية العلوية مثل آلام في الحنجرة، رشح، عطاس.

• حكة (pruritus).

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض من شأنها أن تظهر لديك حتى متعالج 1 من بين 1000:

• بروزات حمراء وحادة أو شرى (urticaria)

شيوع غير معروف:

الأعراض الجانبية التالية بلغ عنها منذ تسويق پرالوئنت، لكن شيوعها غير معروف:

• مرض يشبه الإنفلونزا.

• صعوبات في التنفس، أو إنتفاخ الوجه، الشفتين، الحنجرة أو اللسان (وذمة وعائية).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (ا.ا) www.health.gov.il الذي يوجهك للنموذج المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء

تجنب التسمم! يرجح حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/or الرضع، وذلك لتقاضي إصابتهم بالتسمم.


وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك، وهو قد يسبب الضرر لدى مريض آخر. لا تعطي من هذا الدواء لأقربائك، جيرانك أو معارفك.

تعليمات الإستعمال

پرالوئنت 150 ملغم محلول للحقن

بقلم جاهز للإستعمال

أجزاء قلم پرالوئنت موصوفة في هذه الصورة.




1) انظر إلى الملصقة الموجودة على القلم

- * تأكد من أنك تمكِّن المستحضر الصحيح والمقدار الدوائي الصحيح.
- * تأكد من تاريخ إنقاض الصلاحية: إذا إنقضى التاريخ فلا تستعمل المستحضر.



2) إفحص النافذة

- * تأكد من أن السائل رائق، عديم اللون أو بلون أصفر فاتح وخلٍ من الجزيئات.
- إذا لم يكن كذلك، فلا تستعمله (انظر الرسم A).
- * من الجائز أن ترى فقاوة هواء. هذا الأمر سليم.
- * لا تستعمل إذا كان اللون في النافذة هو أصفر شديد (انظر الرسم B).




4) إضغط على الزر الرمادي بواسطة الإبهام وحرر فوراً.

- * ستسمع طقة. عملية الحقن خاصتك بدأت الآن.
- * سوف يبدأ لون النافذة بالتغيير إلى اللون الأصفر.



5) واصل مسك القلم بشكل قائم لجلدك بعد تحريك الزر


عملية الحقن من شأنها أن تستمر حتى 20 ثانية.




- 6) قبل تحريك القلم، تأكد من تغيير لون النافذة إلى الأصفر.
- * لا تحرك القلم قبل تحول كامل النافذة إلى الأصفر.
- * عند تحول كامل النافذة إلى اللون الأصفر، فإن عملية الحقن قد تمت ومن شأنك أن تسمع طقة ثانية.



- 7) قم بابعاد القلم عن جلدك.
- * لا تترك جلدك بعد الحقن.
- * إذا لاحظت وجود دم، قم بإلصاق كرمة من القطن أو الشاش لمكان الحقن إلى أن يتوقف النزف.



- 8) إرم القلم والسدادة.
- * لا تعيي السدادة الزرقاء إلى مكانها.
- * إرم القلم والسدادة الزرقاء إلى وعاء تجميع الإبر والأقلام المستعملة (مقابر للوخز) حالاً بعد الحقن.
- * إسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة حول كيفية التخلص من الوعاء.
- * دائمًا إحفظ الوعاء بعيداً عن متناول أيدي ومجاالت روئية الأطفال.




- 2) أمسك قلم پرالوئنت بهذه الطريقة.

- * لا تلمس غطاء الأمان الأصفر.
- * تأكَّد من أنك تستطيع رؤية النافذة.




3) ألصق غطاء الأمان الأصفر إلى جلدك بزاوية قدرها 90 درجة تقريباً.

- * إضغط وأبق القلم ملائماً لجسمك إلى حين عدم رؤيتك بعد لغطاء الأمان الأصفر. لن يعمل القلم إذا لم يتم ضغط غطاء الأمان الأصفر حتى النهاية.
- * إذا دعت الحاجة، قم بقرص الجلد للتأكد من أن مكان الحقن مستقر.



2) إفحص النافذة

- * تأكَّد من أن السائل رائق، عديم اللون أو بلون أصفر فاتح وخلٍ من الجزيئات.
- إذا لم يكن كذلك، فلا تستعمله (انظر الرسم A).
- * من الجائز أن ترى فقاوة هواء. هذا الأمر سليم.
- * لا تستعمل إذا كان اللون في النافذة هو أصفر شديد (انظر الرسم B).



3) دع القلم ليسخن بدرجة حرارة الغرفة لمدة 30 حتى 40 دقيقة.

- * لا تسخن القلم، دعه ليسخن من تلقاء نفسه.
- * لا تعيد القلم إلى البراد.

4) حضر مكان الحقن

- * إغسل يديك بالماء والصابون وجففهما بواسطة منشفة.
- * يمكن الحقن في:

- الفخذ
- البطن (عدا المنطقة 5 سم من حول السرة)
- الجزء الخارجي من أعلى الذراع (أنظر الصورة).

- * يمكن الحقن لنفسك بينما تكون جالساً أو واقفاً.

- * نظف الجلد في منطقة الحقن بواسطة ضماد كحولي.


- * لا تحقن في جلد حساس، صلب، أحمر أو ساخن.
- * لا تحقن في منطقة يدو فيها وريد ظاهر للعين.

- * إحقن كل مرة في نقطة مختلفة.
- * لا تحقن پرالوئنت في نفس النقطة مع أدوية أخرى تعطى بالحقن.

المرحلة ب: كيفية الحقن

1) بعد إتمام كل المراحل الخاصة بـ «مرحلة أ: تحضير للحقن»، قم بتنزع السدادة الزرقاء

- * لا تنزع السدادة الزرقاء قبل أن تكون مستعداً للحقن.
- * لا تعيد السدادة الزرقاء إلى مكانها.



المراحل: تحضير للحقن

قبل أن تبدأ جهز لنفسك:

- * قلم پرالوئنت

- * ضمادات كحولية

- * كرمه من القطن أو شاش

- * وعاء مقاوم للوخز (انظر المرحلة بـ 8).

إحفظ هذه التعليمات. إذا توفر لديك أي سؤال راجع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

قبل أن تبدأ جهز لنفسك:

- * قلم پرالوئنت

- * ضمادات كحولية

- * كرمه من القطن أو شاش

- * وعاء مقاوم للوخز (انظر المرحلة بـ 8).