

فيروكوفو 2.5 ملغ أقراص مطالية فيروكوفو 5 ملغ أقراص مطالية فيروكوفو 10 ملغ أقراص مطالية

المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على:

فريسيجوات 2.5mg (vericiguat 2.5mg)

فريسيجوات 5 ملغ (vericiguat 5mg)

فريسيجوات 10mg (vericiguat 10mg)

المادة الفعالة والمُسَبِّبات الحساسية: انظر البند 2 تحت عنوان "معلومات مهمة عن قسم من مركيات الدواء"، والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصيف هذا الدواء لعلاج مضرك. لا تعطه للآخرين؛ لأنّه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الصحية وحالتهم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الابتدائية الموصى بها هي قرص واحد مقداره 2.5 ملغ مرة في اليوم. سيلانم الطبيب الجرعة وفق قدرتك على تحمل العلاج. وسيزيد الطبيب الجرعة غالباً بعد نحو أسبوعين لتصل إلى قرص واحد مقداره 5 ملغ، مرة في اليوم، وبعد أسبوعين إضافيين إلى جرعة هدف قصوى ذات قرص واحد مقداره 10 ملغ، مرة في اليوم.

إذا كان ضغط دمك منخفضاً أثناء تناول فيروكوفو فقد يسبب لديك دواراً وشعوراً بالإغماء، وقد يقلل الطبيب بشكل مؤقت جرعة فيروكوفو أو يوقف مؤقتاً العلاج بفيروكوفو.

تناول قرصاً واحداً في ذات الساعة كل يوم مع الطعام. إذا لم تكن قادراً على ابتلاع القرص، فيمكنك سحق فيروكوفو وخلطه مع الماء. اشرب الخليط بعد تضليله فوراً. يمنع شطر القرص.

يجب المداومة على العلاج وفقاً لتوصية الطبيب.

إذا تناولت جرعة أعلى من فيروكوفو

توجه إلى الطبيب فوراً إذا تناولت جرعة أعلى من فيروكوفو وعانت من أحد الأعراض الجانبية الظاهرة في البند 4، العارض الأكثر احتمالاً هو انخفاض ضغط الدم، الذي قد يسبب لك دواراً وشعوراً بالإغماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا معك عينة الدواء.

إذا نسيت تناول فيروكوفو تناول القرص المنسي فور تذكرك، في ذات اليوم الذي نسيت فيه تناول الجرعة. يمنع تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن القرص المنسي.

إذا توقفت عن تناول فيروكوفو

لا يجوز لك التوقف عن تناول هذا الدواء دون التحدث مع الطبيب أولاً. إذا توقفت عن تناول فيروكوفو، فقد تتفاقم حالتك.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجمع الأدوية، قد يسبب استعمال فيروكوفو أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تزداد قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل أن تتعانى من أي منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر في أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة)

- ضغط دم منخفض

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر في لغاية مستعمل واحد من بين عشرة)

- انخفاض عدد كريات الدم الحمراء (فقر الدم)، الذي قد يسبب شحوب الجلد، ضعفاً أو ضيقاً في التنفس.

- دوخة

- صداع

- غثيان وقيءات

- عسر الهضم (dyspepsia)

- حرقة (مرض ارتجاع معدوي مريئي)

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

- كانت لديك حساسية (ارجحية) للمادة الفعالة فريسيجوات أو لأيٍ من المركيبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- كنت تتناول أدوية أياً كانت تحتوي على مفعول آخر من چوانيلات سيكلايز القابل للذوبان، مثل ريوسيجوات الشستعمل لعلاج فرط ضغط الدم الرئوي.

إذا كان أحد ما جاء أعلاه ينطبق عليك، تحدث مع الطبيب أولاً ولا تتناول هذا الدواء.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل استعمال الدواء أخبر الطبيب إذا كان لديك:

- ضغط دم منخفض مع أمراض مثل دوخة أو شعور بالإغماء،
- مشاكل حادة في الكلى أو إذا كنت تتلقى علاجاً بغسيل الكلى،
- مشاكل حادة في الكبد.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء ليس معداً للأطفال والمراهقين دون سن 18 عاماً. لا تتوفر معلومات حول أمان ونجاعة استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين دون سن 18 عاماً.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طيبة ومكمّلات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول أدوية:

- تنتهي إلى مجموعة محفزات چوانيلات سيكلايز القابلة للذوبان (مثل ريوسيجوات). لا يجوز تناول فيروكوفو أثناء تناول هذه الأدوية. انظر البند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا":

- معدنة لعلاج فرط ضغط الدم الرئوي أو أدوية للانقسام أو الحفاظ عليه، تدعى مثبطات PDE5 (مثل سيلدينافيل، تادالافيل، وقاردينافيل). لا يوصى باستعمال هذه الأدوية أثناء تناول فيروكوفو.

- معدنة لعلاج أمراض القلب، بما في ذلك آلم في الصدر، وتدعى بيتارات (مثل أيزوسوربيد أحادي النترات).

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تظنين أنك حامل، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

لا يجوز استعمال فيروكوفو خلال الحمل لأنّه من غير المعروف فيما

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخزن الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تجنب التسمم. لا ثبّيب التقى دون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

• ليست هناك تعليمات تخزين خاصة بهذا الدواء. يوصى بالتخزين بدرجة حرارة الغرفة.

• يمنع إقاء الدواء في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات المنزلية. اشتهر الصيدلي لمعرفة كيف عليك التخلص من الدواء (الأدوية غير المستعملة). تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

نواف القرص:

lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, croscarmellose sodium, hypromellose 2910, magnesium stearate, sodium laurilsulfate.

طلاء القرص:

hypromellose 2910, titanium dioxide (E 171), talc, ferric oxide red (E 172), ferric oxide yellow (E 172).

كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

فيروكوفو 2.5 ملغ أقراص مطالية (أقراص) هي أقراص مستديدة، محدبة في كلا الجانبين، لونها أبيض، قطرها 7 ملم، وعليها الإشارة "2.5" في جانب واحد و"VC" في الجانب الآخر.

فيروكوفو 5 ملغ أقراص مطالية (أقراص) هي أقراص مستديدة، محدبة في كلا الجانبين، لونهابنيـ أحمرـ قطرها 7 ملم، وعليها الإشارة "5" في جانب واحد و"VC" في الجانب الآخر.

فيروكوفو 10 ملغ أقراص مطالية (أقراص) هي أقراص مستديدة، محدبة في كلا الجانبين، لونها أبيضـ قطرها 9 ملم، وعليها الإشارة "10" في جانب واحد و"VC" في الجانب الآخر.

فيروكوفو متوفّر في:

- لويحات تحتوي على عبوات كرتون فيها 14، 28 أو 98 قرصاً مطليـاـ

- في لويحات متقوية مع وحدات جرعة في عبوات كرتون ذات 1x10 أو 100x1 قرص مطليـاـ

- قناني ذات 100 قرص مطليـاـ

ـ قد لا شرّقـ كافة أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: باير إسرائيل م.ض، شارع هشارون 36، هود هشارون 4527702.

اسم المنتج وعنوانه: Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen, Germany

تمت المصادقة عليها في شباط 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

فيروكوفو 2.5 ملغ: 169-16-36992-99

فيروكوفو 5 ملغ: 169-17-36993-99

فيروكوفو 10 ملغ: 169-18-36994-99

لتيسبيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكور.

على الرغم من ذلك، الدواء معد لأنباء كلا الجنسين.