

וורקובו® 2.5 מ"ג טבליות מצופות וורקובו® 5 מ"ג טבליות מצופות וורקובו® 10 מ"ג טבליות מצופות

חומר פעיל

כל בטליה מכילה:

ויריגואט 2.5mg מ"ג (vericiguat 2.5mg)

(ויריגואט 5 מ"ג (vericiguat 5mg)

(ויריגואט 10mg (vericiguat 10mg))

חוורדים בלתי פעלים ואלרגניים: ראה סעיף 2 תחת "מ"ידן חשוב על חלק מהמרכיבים של התורופה" וסעיף 6 "מ"ידן נוכף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשמש בתורופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התורופה. אם ש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופך או אל הרוקה.

תורופה זו גראשה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התורופה?

וורקובו מיועד להפחית את הסיכון למוגמות קרדיויסකולרי ואשפוז כתואצאה Maiopikit לב (HF) לאחר אשפוז בשילוי לטיפול עם הרופא או הרופא במתן תור ורידי, במוגברים הסובלים Maiopikit לב כוונת הדוחפת הסמיינס ומקטעה פליטה (EF), כמות הדם הנדוחפת החוצה מהלב עם כל פעימת לב (ב) נמוך מ-45%.

קבוצה רפואית: מרחיבי כל דם לטיפול במקרים של מפעול גואנילאט ציקלאז מס' 5, משפט גואנילאט ציקלאז מס' 6 וריצוף לב היא מצב שבו הלב חלש ואינו מסוגל להזרים מספיק דם לאגן. תסמיינס שכיחים של אי-ספקת לב הקוצר נשימה, עייפות או נפיחות הנגרמת מהמצטברות נזולים.

2. לפני השימוש בתורופה אין לשימוש בתורופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל וויריגואט או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התורופה. (ראה סעיף 6 "מ"ידן נוכף").
- אתה נוטל תרופות כלשהן המכילות משפט גואנילאט ציקלאז מס' 5 אחר, כגון ריאסיגואט המשמש לטיפול ביתר לחץ דם ריאטי.

אם אחד מהדברים האמורים לעלונה נכווןجبיך, דבר עמו הרופא תחיליה ואל תיקח תרופה זו.

לפני השימוש הנוגעת לשימוש בתרופה:
- לחץ דם נמוך עם תסמיינס כמו סחרחות או תחושים עילפין,
- בעיות חמורות בכליות או שאთה מטופל בדיאליזה,
- בעיות כבד חמורות.

ילדים ומתבגרים:
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה זאת בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

אינטראקציית/תגובהות בין תרופה:
אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת לאחרונה לפחות 12 שעות, לא תכין טיטול רופא או רופק, יתכן שמדובר במקרה רשות תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל דזוק להם.
אם ש לך שאלות נוספות נוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקה.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוורקובו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות מודד (עשויות להשפיע על יותר מאשר אחד מתוך עשרה)
- לחץ דם נמוך
- המיעדות לטיפול בגין לחץ דם ריאתי או תרופה להשגה או שמירת קפה, הנקראות מעכבי PDE5 (גאנז סילדנאמיל, טלפליט, ודנדנפיל). השימוש בתרופה אלה אינן מומלץ בעת נתילת לב, כולל כאב בחזה, המיעדות לטיפול במקרים (גאנז איזוסורביד מונוניטרטט).

הנקראות ניטרטאים (גאנז איזוסורביד מונוניטרטט).

הירון והנקה
אם את הירון או מיניקה, חושבת שאת הירון או מכתנתה להרотор, עליר להיוועץ ברופא או ברוקח לפני ניתילת תרופה זו.

הירין
אין להשתמש בוורקובו במהלך הירון מפני שלא ידוע אם הוא עלול להזיק לך. אם יש סיכוי כלשהו שתהרי, דברי עם הרופא על שיטות מהימנות למניעת הירון.

הנקה
לא ידוע אם וורקובו עבר בחלב אם ועלול להזיק לתינוק. הרופא יציין יחד איתך אם להפסיק את הנהקה או את הטיפול בוורקובו.

נהיגה ושימוש במכונות
אם אתה מריש שחרורת בעת וניטילת תרופה זו אל תנאג ברכב, אל תרכיב על אופניים ועל תשמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התורופה
תרופה זו מכילה לקלות. אם אמר לך על ידי הרופא כי יש לך איסכירות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני ניטילת תרופה זו.

תרופה זו מכילה חומצה מילימול נתרן (23 מ"ג)
תרופה זו מכילה חומצה מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבליה, כך שלמעשה היא נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשמש בתרופה?

יש לשימוש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בונגעו ל민ון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון יושך או ספיקת לב או צורך במשתנים במשך זמן תור והמיון התחלתי המומלץ הוא בטבליה אחת של 2.5 מ"ג עם יומיים. הרופא יתאים את המינון בהתאם למידת הסובלות שלך לטיפול. בדרך כלל הרופא יגיד את המינון לך לאחר ששבועיים בטבליה אחת של 5 מ"ג. פעום ביום, וכעבור שבועיים נוספים למינון עד מרב של בטבליה אחת של 10 מ"ג פעום ביום.

אם יש לך לחץ דם נמוך בזמן ניטילת וורקובו יתכן כי הוא יגרום לך לשחרורת ולתוחשות עילפון והרופא עשוי להפחית זמינות את המינון של וורקובו או להפסיק לך זמינות את הטיפול בוורקובו.

קח בטבליה אחת באותה שעה כל יום עם מזון. אם אין מסוגל לבלוע את הטבליה, ניתן לכתוש את וורקובו ולחרבב במים.

הכנה. אין לחוש את הטבליה.

אין לעبور על המנה המומלצת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אם נטلت מינון יותר של וורקובו פנה לרופא מיד אם נטلت מינון יותר של וורקובו וסבירת מתחות מתופעות הלואוי המופיעות בסעיף 4.

התוועה הסבירה ביותר היא ירידת לחץ הדם, העוללה לגרום לך לשחרורת ולתוחשות עילפון.

אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעל יlidן מן התורופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התורופה איתך.

אם שכחת ליטול וורקובו
קח את הטבליה שנשכחה מיד כשתזכיר, באותו היום שבו שכחת לחתת את המנה. אין ליטול mana כדי לפצצות על בטבליה שנשכחה.

אם אתה מפסיק ליטול וורקובו
אין להפסיק ליטול תרופה זו ללא שיחה עם הרופא תחיליה. אם תפסיק ליטול וורקובו, יתכן שמאכבר יחמיר.

אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרוכב משקפיים אם אתה ذקוק להם.

אם ש לך שאלות נוספות נוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקה.

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להשפיע על עד משרות אחד מתור עשרה)
- מספר רישום התורופה בפנקס התרופות הממלכתי
במשרד הבריאות:
וירקובו 2.5 מ"ג:
169-16-36992-99-
169-17-36993-99-
169-18-36994-99-
וירקובו 5 מ"ג:
169-16-36992-99-
169-17-36993-99-
169-18-36994-99-
וירקובו 10 מ"ג:
169-16-36992-99-
169-17-36993-99-
169-18-36994-99-
 Lager-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen,
Germany

אשר בפברואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התורופה בפנקס התרופות הממלכתי

במשרד הבריאות:
וירקובו 2.5 מ"ג:
169-16-36992-99-
169-17-36993-99-
169-18-36994-99-

שם היצרן וכותבו: Bayer AG
שם הייצור: Bayer AG
שם הייצור וכותבו: Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen, Germany
אשר בפברואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

שם הפצתו ולחיקת הקראיה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התורופה מיועדת לבני שני המינים.