

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

كود أكامول 15/325

أقراص

التركيب

يحتوي كل قرص على:

باراسيتامول 325 ملغ (Paracetamol 325 mg)

كودئين فوسفات 15 ملغ (Codeine Phosphate 15 mg)

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء للعلاج من أوجك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص لأطفال دون عمر 12 سنة.

● الإستعمال المتواصل قد يسبب التعلق!

● يحتوي هذا الدواء على كودئين الذي له مفعول أفيوني حيث قد يؤدي إلى الإدمان. يمكن أن تتطور لديك أعراض الفطام إذا توقفت عن الإستعمال بشكل مفاجئ. إستشر الطبيب عند الحاجة.

● الأدوية التي تحوي على كودئين تُستعمل فقط لعلاج ألم حاد (حيث يمتد لفترة قصيرة) بشدة متوسطة لدى مراهقين فوق عمر 12 سنة فقط في حال عدم إمكانية علاج الألم بواسطة مسكنات آلام مثل باراسيتامول (paracetamol) أو إيبوبروفين (ibuprofen)، وذلك على ضوء الحقيقة بأن إستعمال كودئين قد يزيد الخطورة لحدوث تثبيط تنفسي.

قد تؤدي الأدوية من فصيلة أفيونيات المفعول إلى الإدمان، خاصة بالإستعمال المطول، وهي ذات احتمال لإساءة إستعمالها ولفرط المقدار الدوائي. إن رد الفعل لفرط المقدار الدوائي يمكن أن يتمثل بتنفس بطيء وحتى لحدوث وفاة.

تأكد من معرفتك لإسم الدواء، المقدار الدوائي الذي تستعمله، وتيرة الإعطاء، مدة العلاج، الأعراض الجانبية والمخاطر الكامنة بها.

معلومات إضافية بخصوص خطر التعلق والإدمان يمكن إيجادها في الرابط:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين آلام ذات شدة متوسطة، لتخفيض السخونة ولتخفيف السعال المرافق لسخونة.

الفصيلة العلاجية:

باراسيتامول: مسكن للآلام وخافض للسخونة.

كودئين فوسفات: مسكن للآلام من فصيلة أفيونيات المفعول.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

● كنت حساساً (ألرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية")

● كنت تعاني من مرض خطير في الكلية أو الكبد

● كنت تعلم بأنك تنتج كمية مورفين ملحوظة من الكودئين (ultra-rapid metabolizers)

● كنت مرضعة

● كنت تعاني من الربو أو من مشاكل أخرى في التنفس، مثلًا التهاب القصبات الهوائية المزمن (chronic bronchitis) أو نفاخ (emphysema)

● حدثت لديك مؤخرًا إصابة في الرأس أو تعاني من تزايد الضغط في الدماغ

● كنت تستهلك كمية كبيرة من الكحول أو تصرفت على هذا النحو في الماضي

● اجتزت مؤخرًا عملية جراحية في كيس المرارة

● وجد لديك إسهال

● كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOI)، أو تناولتها خلال الأسبوعين الأخيرين. مثبطات مونوأمين أوكسيداز مثل فينيلزين، موكلوباميد أو أيزوكاربوكسازيد هي عبارة عن أدوية تستعمل لعلاج الإكتئاب

● كان المتعالج طفلًا ما دون عمر 12 سنة

● كنت مراهقًا دون عمر 18 سنة بعد عملية إستئصال اللوزتين أو الغدانيات جراء متلازمة إنقطاع التنفس الإنسدادي خلال النوم (اضطراب في النوم بسبب إنقطاع التنفس، obstructive sleep apnea syndrome)، لأن هؤلاء المرضى أكثر عرضة من الآخرين للمعاناة من مشاكل في التنفس.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لتناول مستحضرات تحتوي باراسيتامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي باراسيتامول، كي لا تسبب تانية أعراضًا جلدية شديدة.

قد يسبب الباراسيتامول ضررًا للكبد في الحالات التالية: عندما يُعطى بجرعات دوائية أعلى من الموصى بها، عندما يعطى لفترة مطولة، عند إستهلاكك خلال العلاج أو في الماضي مشروبات كحولية بشكل مفرط، وعند تناول أدوية إضافية التي تؤثر على نشاط الكبد.

لا يوصى بالدواء لعلاج السعال والرشح لدى مراهقين بأعمار 12-18 سنة الذين يعانون من مشاكل في التنفس. يجب الإمتناع عن تناول جرعة دوائية عالية من هذا الدواء (حتى إذا كان ذلك ضمن مجال الجرعة الدوائية الموصى بها) أثناء الصوم.

لتجنب فرط الجرعة الدوائية أو التسمم بالباراسيتامول - لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيض السخونة ولتسكين الآلام أو أدوية للرشح التي تحتوي على باراسيتامول بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي. لا يجوز تناول هذا الدواء لفترة زمنية أطول من تلك التي أوصى بها طبيبك.

إن تناول كودئين بشكل دائم لفترة زمنية مطولة قد يؤدي إلى الإدمان، الذي قد يسبب لك الشعور بعدم راحة وعصبية عند التوقف عن تناول الدواء.

إن تناول مسكن للآلام للصداع في أوقات متواترة أكثر مما ينبغي أو لفترة زمنية مطولة أكثر مما ينبغي قد يؤدي إلى تفاقم الصداع.

قبل العلاج - كود أكامول إحك للطبيب إذا:

● كنت مسنًا أو ضعيفًا

● لديك آلام في البطن أو مشاكل مفاجئة أخرى في البطن

● لديك قصور في الغدة الدرقية (thyroid)

● لديك مشاكل في الكبد أو في الكلية، لأنه من الجائز أن يحتاج الأمر إلى خفض الجرعة الدوائية

● لديك ضعف عضلي شديد (الوهن العضلي الوبيل، ضعف عضلي، ضعف في عضلات الوجه بما في ذلك عضلات العين وضعوبة في البلع)

● لديك مرض في الطرق الصفراوية

● لديك مشاكل في الغدتين الكظريتين (مرض أديسون)

● كنت تعاني من تضخم غدة البروستات (لدى الذكور) أو من تضيق الإحليل (الأنبوب الذي يمر عبره البول).

قبل العلاج بهذا الدواء إحك للطبيب الذي وصفه لك إذا كنت:

● مدمنًا أو كنت مدمنًا في الماضي على مستحضرات ذات مفعول أفيوني، على الكحول، على أدوية تصرف بوصفة طبيب، أو على المخدرات غير القانونية

● عانيت في الماضي من أعراض فطام مثل عدم هدوء، قلة راحة، قلق، إرتجاج أو تعرق، وذلك عند توقفك عن إستعمال الكحول أو الأدوية

● تشعر بحاجة لتناول المزيد من أقراص كود أكامول وذلك لتحقيق نفس مستوى التخفيف من الألم، من الجائز أنك تطور تحملًا لتأثيرات الدواء أو تعلق بالدواء. إستشر الطبيب، حيث سيدرس الحاجة لتغيير الجرعة الدوائية أو أن يصف لك مسكنًا بديلًا للآلام.

الإستعمال الدائم، خاصة لفترة زمنية مطولة، من شأنه أن يؤدي إلى الإدمان. يشرح لك الطبيب لأي فترة من الزمن عليك تناول الدواء وعند إمكانية التوقف، كيف تفعل ذلك بأمان.

في أوقات متباعدة، فإن رفع الجرعة الدوائية قد يجعلك أكثر حساسًا للآلام. إذا حدث ذلك، عليك التحدث مع الطبيب بخصوص العلاج الخاص بك.

يمكن أن يؤدي الإدمان إلى أعراض الفطام عندما تتوقف عن تناول الدواء. أعراض الفطام يمكن أن تشمل عدم هدوء، صعوبات في النوم، عصبية، قلة راحة، قلق، الشعور بنبضات القلب لديك (خفقان)، إرتفاع ضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، إسهال، فقدان الشهية للطعام، إرتجاج أو تعرق. يناقش طبيبك حول كيفية خفض الجرعة الدوائية بشكل تدريجي قبل التوقف عن تناول الدواء. من المهم ألا تتوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجئ، لأن ذلك قد يؤدي إلى تزايد احتمال ظهور أعراض الفطام.

إن إستعمال المستحضرات ذات المفعول الأفيوني مخصص فقط للأشخاص الذين وصفت لهم. لا يجوز إعطاء الدواء الخاص بك لشخص آخر.

إن تناول جرعات دوائية أكبر أو تناول بوتيرة أكبر، قد يزيد هذا الأمر من خطورة حدوث إدمان. إن فرط الإستعمال أو إستعمال غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى فرط الجرعة الدوائية و/أو إلى الوفاة.

يتحول الكودئين إلى مورفين في الكبد بواسطة إنزيم. المورفين هي المادة التي تؤدي إلى تخفيف الألم.

يطرأ لدى بعض الأشخاص تغيير في هذا الإنزيم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بطرق مختلفة على نفس الأشخاص. لدى بعض الأشخاص، لا يتم إنتاج المورفين أو أنه يُنتج بكميات قليلة جدًا، حيث لا يتم الحصول على تسكين للآلم بشكل كاف.

هنالك ميل أكبر لدى أشخاص آخرين بأن تتطور لديهم أعراض جانبية خطيرة لأنه تنتج لديهم كمية كبيرة جدًا من المورفين. هذا الميل موجود بشيوع أكبر لدى الفئة السكانية من أصل أفريقي أثيوبي (شيوع قدره 29% لدى هذه الفئة السكانية).

عليك التوقف عن تناول هذا الدواء والتوجه لتلقي علاج طبي حالًا إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية التالية: تنفس بطيء أو سطحي، إرتباك، ميل للنوم، حدقتين صغيرتين، غثيان أو تقيؤ، إمساك، قلة الشهية للطعام.

الإستعمال لدى الأطفال والمراهقين

الدواء غير مخصص للإستعمال لدى أطفال دون عمر 12 سنة.

الإستعمال لدى مراهقين بعد عملية جراحية - لا يجوز إستعمال الكودئين للتخفيف من الألم لدى مراهقين بعد عملية جراحية لإستئصال اللوزتين أو الغدانيات جراء متلازمة إنقطاع التنفس الإنسدادي خلال النوم (اضطراب في النوم بسبب إنقطاع التنفس، obstructive sleep apnea syndrome)، لأنهم قد يكونوا معرضين لخطورة متزايدة لحدوث أعراض جانبية خطيرة في حالة التسمم بالمورفين.

إن الأدوية الحاوية على كودئين تستعمل فقط لعلاج الألم الحاد (الذي يستمر لمدة قصيرة) بشدة متوسطة لدى مراهقين تجاوزوا عمر 12 سنة فقط إذا لم يكن بالإمكان علاج الألم بواسطة مسكنات آلام أخرى مثل باراسيتامول (paracetamol) أو إيبوبروفين (ibuprofen)، وذلك على ضوء الحقيقة بأن إستعمال الكودئين قد يزيد من الخطورة لحدوث تثبيط تنفسي.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا أو قد تستعمل أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

● مثبط مونوأمين أوكسيداز الذي يستعمل لعلاج الإكتئاب (MAOI)، حيث تم تناوله خلال الـ 14 يوما الأخيرة (أنظر الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا")

● أدوية للتهديئة وللنوم مثل تيمازيبام وديازيبام

● فينوثيازينات (أدوية للتهديئة) أو مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة

● أدوية لعلاج إرتفاع ضغط الدم، مدرات بولية

● أدوية لعدم إنتظام ضربات القلب (ميكسليتين، كينين أو كينيدين)

● أدوية تستعمل لتجفيف السوائل في الفم وفي الرئتين التي تعرف كأدوية مضادة للفعل الكولينيني

● أدوية لعلاج الإسهال أو الغثيان (ميتوكلوبراميد، دومبيريدون)

● أدوية تستعمل لعلاج مشاكل في المعدة، كيس المرارة، الحرقان أو الغثيان (مثل: سيميدين، كوليسيرامين)

● صوديوم أوكسبيات يستعمل لعلاج الميل للنوم والفقدان المفاجئ لتوتر العضلات

● مسكنات آلام قوية أخرى تسمى أشباه الأفيونيات

● أدوية تمنع تخثر الدم (مضادات التخثر مثل وارفارين)

● لا يجوز تناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول أو كودئين خلال تناول كود أكامول. بعض الأدوية التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية من شأنها أن تحتوي على باراسيتامول أو كودئين، ولذلك يجب دائما التأكد من المركبات المدونة على ظهر العلبة.

قد يشوش كود أكامول على فحوص مخبرية معينة التي تستعمل لتحديد أمراض معينة.

إن الإستعمال المتزامن لـ كود أكامول وأدوية مهدئة مثل بينزوديازيبينات أو أدوية مشابهة، يزيد من الخطورة لحدوث نعاس، صعوبات في التنفس (تثبيط تنفسي)، سبات وقد يشكل خطرا على الحياة لهذا السبب، فقط عندما لا تكون هنالك خيارات علاج أخرى، بالإمكان دراسة الإستعمال المتزامن لـ كود أكامول وأدوية مهدئة.

بالرغم من ذلك إذا وصف لك الطبيب كود أكامول سوية مع أدوية مهدئة - فإن المقدار الدوائي ومدة العلاج بـ كود أكامول سوية مع أدوية مهدئة، يجب أن يحدد من قبل الطبيب.

إحك لطبيبك عن كافة الأدوية المهدئة التي تتناولها وإتبع بحرص توصياته بخصوص المقدار الدوائي.

يوصى بإبلاغ الأصدقاء وأقرباء العائلة ليكونوا على دراية بالعلامات والأعراض التي ذكرت أعلاه. توجه لطبيبك عندما تقاسي من هذه الأعراض.

إستعمال الدواء والطعام

يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز إستهلاك الكحول خلال فترة العلاج بـ كود أكامول.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل أو الإرضاع، تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملًا أو تخططين للحمل، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بالدواء.

الحمل:

لا يجوز تناول كود أكامول إذا كنت في فترة الحمل أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملًا إلا إذا استشرت الطبيب بخصوص ذلك والفائدة من العلاج من شأنها أن تفوق الضرر المحتمل للرضيع.

يتبع

إذا كنت تستعملين كود أكامل خلال فترة الحمل، فقد يطور لدى رضيعك تعلق، ويقاسي بعد الولادة من أعراض الفطام التي يجب علاجها.

الرضاعة:

لا يجوز تناول كود أكامل خلال فترة الرضاعة لأن الكودئين ينتقل إلى حليب الأم ويؤثر على رضيعك.

السياقة وإستعمال الماكينات

قد يؤدي كود أكامل إلى دوار أو نعاس. لا يجوز السياقة أو تشغيل الماكينات إذا تأثرت على هذا النحو من تناول الدواء. قد يؤدي الكودئين إلى اضطرابات في الرؤية.

قد يؤثر الدواء على قدرتك على السياقة لأنه قد يسبب لك ميلاً للنوم أو الدوار.

لا تقوم بالسياقة خلال فترة تناول الدواء إلى أن تكون على دراية بكيفية تأثيره عليك.

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن تعلم بشكل مؤكد فيما إذا كان من الآمن بالنسبة لك السياقة خلال فترة تناول هذا الدواء.

بالنسبة للمراهقين (فوق عمر 12 سنة)، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من اللعب بالقرب من حركة المرور وما شابه.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على سكر يسمى لكتوز. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه إلى طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في القرص وبالتالي يعتبر خال من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال الدواء حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالدواء.

على الطبيب مناقشتك بخصوص مدة العلاج بالدواء. على الطبيب أن يضع خطة لكيفية التوقف عن العلاج، التي تشمل الشرح حول كيفية خفض المقدار الدوائي بالتدريج، حتى التوقف التام عن تناوله.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الإعتيادية في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

لل كبار والمراهقين فوق عمر 12 سنة:

1-2 أقراص كل 4-6 ساعات حسب اللزوم. لا تتجاوز جرعات دوائية قدرها 8 أقراص خلال 24 ساعة.

الدواء غير مخصص للإستعمال لدى أطفال دون عمر 12 سنة، بسبب الخطورة لحدوث مشاكل خطيرة في التنفس.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

إذا شعرت بأن تأثير كود أكامل أقوى مما ينبغي أو أضعف مما ينبغي أو إستمرت الأعراض، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز تناول هذا الدواء لفترة تزيد عن ثلاثة أيام.

إذا إستمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم يحدث تخفيف للألم خلال 3 أيام فيجب التوقف عن الإستعمال والتوجه للطبيب.

إذا كنت مسناً أو إذا وجدت لديك مشاكل طبية أخرى، فمن الجائز أن تحتاج إلى جرعة دوائية منخفضة أكثر، إستوضح الأمر من الطبيب.

إرشادات الإستعمال

لا يجوز المضغ. لا تتوفر معلومات عن السحق.

بالإمكان شطر الأقراص إلى نصفين في خط الشطر.

يجب بلع الأقراص مع كأس من الماء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من هذا الدواء، عليك التوجه حالاً إلى الطبيب أو لخدمة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

حتى ولو كنت تشعر بشكل جيد، فإن العلاج الفوري هو أمر ضروري، بسبب الخطورة لتطور ضرر شديد في الكبد.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت الإعتيادي.

لا يجوز تناول جرعتين دوائيتين معاً من أجل التعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجئ.

قبل التوقف عن تناول الدواء يجب إستشارة طبيبك أولاً. يشرح الطبيب كيفية فعل ذلك، عادة بواسطة خفض الجرعة الدوائية بالتدريج، وذلك من أجل تقليل أعراض الفطام قدر الإمكان. قد تظهر أعراض الفطام مثل عدم هدوء، صعوبات في النوم، عصبية، قلة راحة، قلق، الشعور بضربات القلب لديك (خفقان)، ارتفاع ضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، إسهال، إرتجاف أو تعرق وذلك إذا توقفت عن تناول الدواء بشكل مفاجئ.

لا تتناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كود أكامل قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية شديدة:

قد تسبب كافة الأدوية ردود فعل تحسسية. بالرغم من أن ردود فعل تحسسية خطيرة هي نادرة جداً.

يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب أو المستشفى حالاً إذا ظهرت الأعراض التالية:

● ردود فعل تحسسية مثل صفير مفاجئ في التنفس، صعوبة في التنفس، إنتفاخ الجفنين، الوجه أو الشفتين، طفح أو حكة (خاصة تلك التي تؤثر على كامل الجسم).

● قد يؤدي پاراسيتامول في حالات نادرة لظهور أمراض جلدية شديدة، تتميز بإحمرار، طفح، حويصلات، إصابة جلدية واسعة.

أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر حتى لو تناولت في الماضي أدوية تحتوي على المركب الفعال پاراسيتامول ولم تعاني من أعراض جانبية.

إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج والتوجه حالاً للطبيب.

● ظهرت علامات لتغيرات في جهاز الدم مثل: أنزفة، كدمات، تطور إلتهابات بسهولة كبيرة.

بلغ عن الأعراض الجانبية التالية لـ كود أكامل بالتواتر التالية:

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين)

● غثيان وتقيؤ، إمساك

● الشعور بأنك توشك على الإغماء، دوار، ميل للنوم

● ضيق في التنفس.

إذا ظهرت هذه الأعراض، فإن الإستلقاء قد يخفف من هذه الأعراض.

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل)

أعراض الفطام:

عندما تتوقف عن تناول كود أكامل، فأنت قد تقاسي من أعراض فطام، التي تشمل: عدم هدوء، صعوبات في النوم، عصبية، قلة راحة، قلق، الشعور بضربات القلب لديك (خفقان)، ارتفاع ضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، إسهال، إرتجاف أو تعرق.

أعراض جانبية شائعة غير معروف (أعراض شيعوها لم يحدد بعد):

● شعور مفرط بمزاج عال، أو إكتئاب

● آلام في البطن، إلتهاب البنكرياس

● حدقتان صغيرتان، مشاكل في الرؤية، صداع

● تباطؤ النبض

● صعوبة التبول

● عدم القدرة على إفراغ المثانة البولية

● تضرر الكبد، خاصة لدى الذين يفرطون في إستهلاك الكحول

● فقدان السمع

● تغيرات في خلايا الدم، مثل إنخفاض عدد الخلايا التي تحارب التلوث وكذلك الخلايا التي تشتبك في تخثر الدم

● التعلق والإدمان (أنظر الفقرة "كيف لي أن أعلم فيما إذا كنت مدمناً على الدواء؟")

كيف لي أن أعلم فيما إذا كنت مدمناً على الدواء؟

إذا لاحظت إحدى العلامات التالية خلال العلاج بـ كود أكامل، فمن الجائز أن هذا مؤشر بأنك أصبحت مدمناً:

● أنت بحاجة لتناول الدواء لفترة زمنية أطول مما أوصاك به الطبيب.

● كنت تشعر بأنك بحاجة لإستعمال جرعة دوائية أكبر من الموصى به

● كنت تستعمل الدواء لأسباب أخرى تختلف عن تلك التي من أجلها وصف لك الدواء

● عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر بسوء، وعندما تعاود إستعماله يتحسن شعورك.

إذا لاحظت إحدى تلك العلامات، فمن المهم جداً أن تخبر طبيبك عن ذلك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (Exp. Date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● يجب تخزين الدواء في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.

● لا يجوز رمي أدوية في المجاري أو في القمامة. إسأل الصيدلي عن كيفية إتلاف أدوية لم تعد تستعمل. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, gelatin, sodium starch glycolate, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, col. FD&C blue No. 1 lake 12%

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص كود أكامل هي أقراص مستديرة ومسطحة ذات أطراف مائلة، بلون أزرق فاتح مع نقط بيضاء. في جانب واحد من القرص يوجد خط للشطر وفي الجانب الآخر طبعت الأحرف: "IKA".

تحتوي العبوة على 10 أقراص ضمن لويحة (بليستر).

إسم صاحب الإمتياز والمنتج وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ض.، شارع دقورا هنثيئة 124، تل أبيب.

تم إعداد النشرة في كانون الثاني 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

040.04.22978

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.