

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986

התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד

קוד אקמול[®] 15/325 טבליות

הרכב

כל טבליה מכילה:

פראצטמול 325 מ"ג (Paracetamol 325 mg) קודאין פוספט 15 מ"ג (Codeine Phosphate 15 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים למדידות ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרופא.

התרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצעב הרפואי דומה.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

שימוש ממושך עלול לגרום לתלות!

תרופה זו מכילה קודאין שהינו אופיאודי היכול לגרום להתמכרות. אתה יכול לפתח תוסמיני גמילה אם אתה מפסיק את השימוש באופן פתאומי. התייעץ עם הרופא במידת הצורך.

תרופות המכילות קודאין ישמשו רק לטיפול בכאב חריף (שמשכו קצר) בעוצמה בינונית בקרב מתבגרים מעל גיל 12 שנים ורק אם לא ניתן לטפל בכאב באמצעות משככי כאבים כגון פראצטמול (paracetamol) או איבופרופן (ibuprofen), וזאת לאור העובדה כי שימוש בקודאין עלול להגביר את הסיכון לדיכוי נשימתי.

תרופות משפחת האופיאודים עלולות לגרום להתמכרות, בעיקר בשימוש ממושך, והיגון בעלות פוטנציאל לשימוש לרעה ולמינון יתר. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לגרום למוות. דא כי היגן מכירה את שם התרופה, המינון שהיגן לוקח, תדירות המתן, משך הטיפול, תופעות הלוואי והסיכונים הפוטנציאליים. מידע נוסף אודות הסיכון לתלות והתמכרות ניתן למצוא בקישור:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכון כאבים בעלי עוצמה בינונית, להורדת חום ולהקלה על שיעול הגלווה לחום.

קבוצה תרופייתית:

פראצטמול: משכך כאבים ומוריד חום. קודאין פוספט: משכך כאבים מקבוצת האופיאודים.

2. לפני השימוש בתרופה

איך להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף")
- אתה סובל ממחלת כליה או כבד חמורה
- אתה יודע שאתה מייצר כמות ניכרת של מורפין מקודאין (ultra-rapid metabolizers)
- את מיניקה
- אתה סובל מאסתמה או מבעיות נשימה אחרות, למשל דלקת סימפונות כרונית (ברונכיטיס כרונית) או נפחת (אמפימה)
- ארעה לך לאחרונה פציעת ראש או שאתה סובל מלחץ כוחי מוגבר
- אתה צורך מרחיב גדולה של אלכוהול או שעשית כך בעבר
- היה לך לאחרונה ניתוח בכיס המרה
- יש לך שלשול
- אתה נוטל תרופות משפחת מעכבי מנוואמינן אוקסידאז (MAOI), או שנטלת אותן במהלך השבועיים האחרונים. מעכבי מנוואמינן אוקסידאז כגון פנליין, מוקלובמיד או איוזקורבוקסאיד הן תרופות המשמשות לטיפול בכיאון

הטיפול היגון ילד מתחת לגיל 12 שנים

- אתה מתבגר מתחת לגיל 18 שנים לאחר ניתוח להסרת שקדים או אדנואידים עקב תסמונת דום נשימה חסימתית בשינה (הפרעה בגלל הפסקות נשימה), אוסטרנה (obstructive sleep apnea), היות וחולים אלו מועדים יותר מאחרים לסבול מבעיות נשימה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אם פיתחת בעבר תופעות לוואי עוריות כתוצאה מגזלת תכשירים המכילים פראצטמול, אין ליטול תכשירים המכילים פראצטמול, כדי שלא יגרמו שוב לתופעות עוריות חמורות.

פראצטמול עלול לגרום לזקק בכבד במקרים יחל: כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ, כאשר נהנה לתופעות ממושכות, כאשר בזמן הטיפול או בעבר צרכת משקאות אלכוהוליים ביתר, וכאשר נוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.

התרופה אינה מומלצת לטיפול בשיעול וצינון במתבגרים בגילאי 12-18 שנים הסובלים מבעיות נשימה.

גם להימנע מלקיחת מינון גבוה של תרופה זו (גם אם בתוך טווח המינון המומלץ) בזמן צום. כדי למנוע מינון יתר או נוספת של פראצטמול – אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ולשיכון כאבים או תרופות להצטננות המכילות פראצטמול ללא התייעצות עם רופא או רוקח. אין ליטול תרופה זו למשך תקופה ארוכה יותר מזו שהורה לך הרופא.

נטילת קודאין באופן קבוע למשך זמן ממושך עלולה לגרום להתמכרות, אשר עלולה לגרום לפסיק את נטילת התרופה.

נטילת משכך כאבים לכאבי ראש לעיתים תכופות מדי או למשך זמן ממושך מדי עלולה לגרום להחמרה בכאבי הראש.

לפני הטיפול בקוד אקמול ספר לרופא אם:

- אתה קשיש או חלש
- יש לך כאבי בטן או בעיות פתאומיות אחרות בבטן
- יש לך תת פעילות של בלוטת התריס (תיוראיד)
- יש לך בעיות בכבד או בכליה, בגלל שיתכן יהיה צורך בהפחתת המינון
- יש לך חולשת שרירים חמורה (מיאסטניה-גרביס, חולשת שרירים, חולשה של שרירי הפנים כולל שרירי העין וקושי בבליעה)
- יש לך מחלה של דרכי המרה
- יש לך בעיות בבלוטות יותרת הכליה (מחלת אדיסון)

אתה סובל מבלוטת ערמונית מוגדלת (בזכרים) או הצרה של השופכה (צינור שדרכו עובר השתן).

לפני הטיפול בתרופה זו ספר לרופא שרשם לך אותה אם אתה:

- מכור או היית מכור בעבר לאופיאודים, לאלכוהול, לתרופות מרשם, או לסמים לא חוקיים
- סבל בעבר מתסמיני גמילה כגון אי-שקט, חוסר מנוחה, חרדה, רעד או הזעה, כאשר הפסקת השימוש באלכוהול או בתרופות מרגיש צורך ליטול יותר טבליות של קוד אקמול בשביל להשיג אותה רמה של הקלה בכאב, ייתכן ואתה מתרופת סבילת הרפעות התרופה, חלחך בחרופה, היעוץ ברפוא, שיבחן את הצורך לשנות את מינון התרופה או לרשום לך משכך כאבים חלופי.

שימוש קבוע, במיוחד למשך זמן ממושך, עשוי לגרום להתמכרות. הרופא יסביר לך למשך כמה זמן עליך ליטול את התרופה וכשניתן להפסיק, כיצד לעשות זאת בבטחה.

לעיתים רחוקות, העלאת המינון של התרופה יכולה לגרום לך להיות רגיש יותר לכאב. אם זה קורה, עליך לדבר עם הרופא לגבי הטיפול שלך. התמכרות יכולה לגרום לתסמיני גמילה כאשר אתה מפסיק את נטילת התרופה. תסמיני גמילה יכולים לכלול אי-שקט, קשיי שינה, עצבנות, חוסר מנוחה, חרדה, רגשות פעימות הלב שלך (פלפיטציות), לחץ דם גבוה, בחילה או הקאה, שלשול, איבוד תיאבון, רעד או הזעה. הרופא ידרוך דיון עמן כיצד להוריד את המינון באופן הדרגתי לפני הפסקת התרופה. חשוב שלא תפסיק את נטילת התרופה באופן פתאומי, מכיוון שזה עלול להגביר את הסיכוי להופעת תסמיני גמילה.

השימוש באופיאודים נועד רק לאנשים עבורם הם נרשמו. אין לתת את התרופה שלך למישהו אחר. נטילת מינונים גבוהים יותר או נטילה בתדירות גבוהה יותר, עלולים להגביר את הסיכון להתמכרות. שימוש יתר או שימוש לא נכון יכול לגרום למינון יתר ו/או למוות.

קודאין הופך למורפין בכבד על-ידי אנזים. מורפין הוא החומר אשר גורם להקלה בכאב. אצל אנשים מסוימים חל שינוי באנזים זה, דבר העשוי להשפיע בדרכים שונות על אנשים. אצל אנשים מסוימים, מורפין אינו מיוצר או שהוא מיוצר בכמויות קטנות מאוד, וכך לא מתקבל שיכון כאב במידה מספקת.

אנשים אחרים נוטים יותר לפתח תופעות לוואי חמורות מכיוון שמיצרות אצלם כמות גבוהה מאוד של מורפין. נטייה זו קיימת בשכיחות יותר גבוהה באוכלוסייה ממוצא אפריקאי אטיף (שכיחות של 29% באוכלוסייה זו). עליך להפסיק ליטול תרופה זו ולפנות לרופא. רפואי מיד אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות: נשימה איטית או שטחית, בלבול, עשונות, אישנות קטנים, בחילה או הקאה, עצבנות, חוסר תיאבון.

שימוש בילדים ובמתבגרים

התרופה לא מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל 12 שנים.

שימוש במתבגרים לאחר ניתוח – אין להשתמש בקודאין להקלת כאב במתבגרים לאחר ניתוח להסרת שקדים או אדנואידים עקב תסמונת דום נשימה חסימתית בשינה (הפרעה obstructive sleep apnea syndrome), מכיוון שהם עלולים להיות בסיכון מוגבר לתופעות לוואי חמורות במקרה של הרעת מורפין.

תרופות המכילות קודאין ישמשו רק לטיפול בכאב חריף (שמשכו קצר) בעוצמה בינונית בקרב מתבגרים מעל גיל 12 שנים ורק אם לא ניתן לטפל בכאב באמצעות משככי כאבים אחרים כגון פראצטמול (paracetamol) או איבופרופן (ibuprofen), וזאת לאור העובדה כי שימוש בקודאין עלול להגביר את הסיכון לדיכוי נשימתי.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, או תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- מעכב מנוואמינן אוקסידאז המשמש לטיפול בכיאון (MAOI), אשר נייטל במהלך ה-14 ימים האחרונים (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם")
- תרופות להרגעה ולשינה כגון טמאזפאם ודיאזפאם
- פנאזינים (תרופות להרגעה) או נוגדי דיכאון טריציקליים
- תרופות לטיפול ביתר לחץ דם, משתנים
- תרופות לפעימות לב לא סדירות (מקסיליין, נינון או כינדין)
- תרופות המשמשות לייבוש נוזלים בפה ובריאות הידועות כתופעות אנט-כולינרגיות
- תרופות לטיפול בשלשולים או בבחילה (מטוקלוראמיד, דומפרידון)
- הקירבה, כיס המרה, צרבת או בחילה (כגון: סימטידין, כולסטיראמין)
- סודיום אוקסיבט המשמש לטיפול בשינוניות ובאובדן פתאומי של טונוס שרירים
- מושככי כאב חזקים אחרים המכונים אופיאודים
- תרופות המונעות קרישת דם (נוגדי קרישה כגון וורפרין)

אין לקחת תרופות אחרות המכילות פראצטמול או קודאין במהלך נטילת קוד אקמול. תרופות מסוימות אשר ניתן לרכוש ללא מרשם עשויות להכיל פראצטמול או קודאין, ולכן יש לבדוק תמיד את המרכיבים המצויינים על גבי האריזה.

קוד אקמול עלול לגיבש לשבש בדיקות מעבדה מסוימות המשמשות לקביעת מחלות מסוימות. שימוש בו זמני בקוד אקמול ובתרופות להרגעה כגון בנודיאזפנים או תרופות דומות, מעלה את הסיכון לנמוגים, לקשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ועלול להזיז את החברים ואת קרובי המשפחה שיהיו מודעים לסימנים ולתסמינים שצינונו לעיל. פנה לרופא שלך כאשר אתה חווה תסמינים אלה.

שימוש בתרופה ומזון

יש לבלוע את הטבליות עם כוס מים.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול אין לצרוך אלכוהול בתקופת הטיפול בקוד אקמול.

היריון, הנקה ופוריות

אם היגן בהיריון או מיניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני התחלת הטיפול בתרופה.

היריון:

אין ליטול קוד אקמול אם היגן בהיריון או חושבת שאת עשויה להיות בהיריון אלא אם התייעצת על כך עם הרופא שלך והתועלת מהטיפול עשויה לעלות על הנוק הפוטנציאלי לנטינוק.

אם את משתמשת בקוד אקמול במהלך ההיריון, תינזוק עלול לפתח תלות, ולחוות לאחר הלידה תסמיני גמילה עשויה צורך לטפל בהם.

הנקה:

אין ליטול קוד אקמול כאשר את מיניקה מכיוון שקודאין עובר לחלב אם וישפיע על תינוקך.

נהיגה ושימוש במכוונת

קוד אקמול עלול לגרום לסחרחורת או לנמוג. אין לנהוג או להפעיל מכוונת אם אתה מושפע באופן זה מנטילת התרופה. קודאין עלול לגרום להפרעות בראייה.

התרופה עלולה להשפיע על היכולת שלך לנהוג מפני שהיא עלולה לגרום לך להיות ישנוני או מסוחרר.

אל תנהג במשך תקופת נטילת התרופה עד שתדע כיצד היא משפיעה עליך.

שוחח עם הרופא או הרוקח אם אינך יודע בודאות אם טווח עבורך לנהוג בעת נטילת התרופה זו.

באשר למתבגרים (מעל גיל 12 שנים), יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה התרופה מכילה סוכר שנקרא לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שלך שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

התרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתון בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתון.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא אם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. על הרופא לדון עמן על משך הטיפול בתרופה. שתכלול הסבר וכיצד להוריד הפסקת הטיפול, בהדרגה, עד להפסקה מלאה של נטילתה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

מבוגרים ומתבגרים מעל גיל 12 שנים:

1-2 טבליות כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 8 טבליות במשך 24 שעות.

התרופה אינה מיועדת לשימוש בילדים שגילם מתחת ל-12 שנים, בגלל הסיכון לבעיות נשימה חמורות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם אתה מרגיש כי ההשפעה של קוד אקמול חזקה מדי או חלשה מדי או שהתסמינים נמשכים, פנה לרופא או לרוקח.

אין ליטול תרופה זו למשך יותר משלושה ימים. אם החום נמשך למעלה מ-3 ימים או אם אין הקלה בכאבים תוך 3 ימים יש להפסיק השימוש ולפנות לרופא.

אם אתה קשיש ואם יש לך בעיות רפואיות אחרות, ייתכן ותצטרך מינון נמוך יותר, בדוק זאת עם הרופא.

אופן השימוש

אין ללעוס. אין מידע לגבי כתישה. ניתן לחצות את הטבליות בקו החציה. יש לבלוע את הטבליות עם כוס מים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים. הרופא יסביר כיצד לעשות זאת, גם אם הרגשתך טובה, טיפול מיידי הוא חיוני, בגלל הסיכון להתפתחות זקק חמור לכבד.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש ליטול את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק את נטילת התרופה באופן פתאומי. לפני הפסקת נטילת התרופה יש להיוועץ קודם ברופא שלך. הרופא יסביר כיצד לעשות זאת, ודרך כלל באמצעות הורדת המינון בהדרגה, וזאת על מנת למנוע כמה שניתן את תסמיני הגמילה. תסמיני גמילה כגון אי-שקט, קשיי שינה, עצבנות, חוסר מנוחה, חרדה, הרגשת פעימות הלב שלך (פלפיטציות), לחץ דם גבוה, בחילה או הקאה, שלשול, רעד או הזעה עלולים להופיע אם אתה מפסיק את נטילת התרופה באופן פתאומי.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהיגן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם היגן זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקוד אקמול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות:

כל התרופות עלולות לגרום לתגובות אלרגיות, אם כי תגובות אלרגיות חמורות הן נדירות ביותר.

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא או לבית חולים מיד אם מופיעות התופעות הבאות:

- תגובות אלרגיות כגון צפצופים פתאומיים בענפימה, קושי בנשימה, נפיחות של העפעפים, הפנים או השתיים, פריחה או גרד (במיוחד כאלה המשפיעות על כל הגוף).
- פראצטמול עלול לגרום במקרים נדירים להופעת מחלות עור חריפות, המאופיינות באדום, פריחה, שלפוחיות, פגיעה עורית נרחבת.

תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תרופות המכילות את המרכיב הפעיל פראצטמול ולא סבלת מתופעות הופעי.

אם מופיעות תופעות לוואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מיידי.

- מופיעים סימנים של שינויים במערכת הדם כגון: דימומים, חבורות, התפתחות דלקות ביתר קלות.

תופעות לוואי הבאות של קוד אקמול דווחו בתדירויות הבאות:

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- בחילה והקאה, עצירות
- תחושה שעומדים להתעלף, סחרחורת, שנוניות

- קוצר נשימה.

אם תופעות אלה מופיעות, שכיבה עשויה להקל על תופעות אלה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-עד 1 מתוך 100 משתמשים)

תסמיני גמילה:

עלול אתה תסמיני גמילה, אשר כוללים: חוסר שקט, קשיי שינה, עצבנות, חוסר מנוחה, חרדה, הרגשת פעימות הלב שלך (פלפיטציות), לחץ דם גבוה, בחילה או הקאה, שלשול, רעד או הזעה.

תופעות לוואי שכיחותן אינן ממושך, עשוי (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- תחושת-יתר של רוממות רוח, או דיכאון
- כאבי בטן, דלקת של הלבבל
- אישוני עיניים קטנים, בעיות ראייה, כאבי ראש
- אשך בדופק
- קושי בהטלת שתן
- חוסר יכולת לרוקן את שלפוחית השתן
- זקק לכבד, במיוחד אצל צורכי אלכוהול ביתר
- אובדן שמיעה

שינויים בתאי הדם, כגון מספר נמוך של תאים אשר נלחמים ביהיום ושל תאים המעורבים בקרישת דם

- תלות והתמכרות (ראה סעיף "כיצד אדע אם אני מכור לתרופה?").

כיצד אדע אם אני מכור לתרופה?
אם אתה שם לב לאחד מהסימנים הבאים במהלך הטיפול בקוד אקמול, ייתכן וזה סימן לך שהפכת להיות מכור:

- אתה צריך לקחת את התרופה למשך זמן ארוך יותר מאשר הרופא ייעץ לך
- אתה מרגיש שאתה צריך להשתמש במינון גבוה מהמומלץ
- אתה משתמש בתרופה בשל סיבות אחרות מאלו שגללן הפסיק הרופא נרשמה לך
- כאשר שבתה הטיפול ליטול את התרופה אתה לא מרגיש טוב, ונטילה מחדשת משרפת את הרגשתך.

אם אתה שם לב לאחד מהסימנים האלה, חשוב מאוד שתספר על כך לרופא שלך.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת הלוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il). הפנה למושב הקבריון (דיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מעט הרעלה: תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ללא חרדה מפרשת הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אחריות.

יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל-25°C.

אין להאשיך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, gelatin, sodium starch glycolate, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, col. FD&C blue No. 1 lake 12%

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: טבליות קוד אקמול מינון טבליות עגולות ושטוחות עם קצוות משופעים, בצבע כחול בהיר עם רסיסים לבנים. בצידה האחד של הטבליה קו חציה ובצדה האחר הטבעה של אותיות: "IKA".

האריזה מכילה 10 טבליות בבליסטר (מגשיתי).

שם בעל הרישום והיצרן וכתובת: טבע ישראל בע"מ, רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב.

העלון נערך בינואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 040.04.22978

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.