

كلورهيكسيدين لايسر غسول للفم

المادة الفعّالة وتركيزها: كلورهيكسيدين دي-جلوكونات (chlorhexidine digluconate) 0.12% w/v

قائمة المواد الإضافية مفصلة في البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء"، وفي البند 6. اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. الدواء معدّ لاستعمال المتعالمين فوق جيل 12 سنة. تحت هذا الجيل يجب التوجه إلى الطبيب قبل الاستعمال. يجب استعمال المستحضر بحسب تعليمات بند الجرعة في هذه النشرة. استشر الطبيب إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يجب عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو إذا لم تحسن.

1. لم أعد الدواء؟

- كمادة مساعدة لعلاج ومنع التهاب اللثة (gingivitis).
- للاستعمال بعد العمليات الجراحية أو علاجات الأسنان، لتعجيل شفاء اللثة.
- للاستعمال في التقرحات، في التهابات الناجمة عن أسنان اصطناعية والفطريات في الفم.
- كمادة مساعدة للحفاظ على نظافة الفم.
- لإعاقة تشكل البلاك (الرواسب المتحجرة على الأسنان).

المجموعة العلاجية: مُطهّر

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كان لديك رد فعل تحسسي لكلورهيكسيدين دي-جلوكونات أو لأحد مركبات الدواء.

تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء:

- يُمنع الاستعمال في كل مكان آخر باستثناء فمك. يُمنع البلع. في حالة حدوث تلامس مع العينين أو الأذنين، يجب غسلها جيداً بالماء.
- في حال حصول رد فعل تحسسي خطير، يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً للحصول على مساعدة. أنظر 'الأعراض الجانبية'.
- يُمنع الاستعمال فوراً بعد فرك أسنانك. أنظر 'كيف تستعمل الدواء' لمعلومات إضافية.
- يُمنع تبييض أقمشة كانت قد لامست غسول الفم.
- قد يظهر اصطبغ مؤقت على الأسنان واللسان. أنظر 'الأعراض الجانبية'.
- قد يحدث تغيير في حاسة التذوق، أو الشعور بالحرقة. أنظر 'الأعراض الجانبية'.

الأطفال والمراهقون

الدواء معدّ لاستعمال المتعالمين فوق جيل 12 سنة. لا يجوز الاستعمال للأطفال تحت جيل 12 سنة، إلا بتوصية من الطبيب.

ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإرضاع

يمكن استعمال الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء يحتوي الدواء على PEG-40 hydrogenated castor oil، الذي يمكن أن يُسبب ردود فعل في الجلد.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها. يُمنع البلع.

إن معاجين الأسنان يمكن أن تسبب خللاً في فعالية غسول الفم. بعد فرك الأسنان، أغسل فمك بالماء جيداً وانتظر 5 دقائق قبل استعمال كلور هيكسيدين لايسر غسول للفم. بدلا من ذلك، بإمكانك استعمال غسول الفم أيضاً في وقت آخر من اليوم.

الجرعة المعتادة عادة هي:

استعمل مرتين في اليوم. قم بتعبئة الغطاء حتى خط 15 ملل. أغسل الفم جيداً لمدة دقيقة واحدة، ومن ثم ابصق. التهاب اللثة: يوصى بالاستعمال لمدة شهر.

تقرحات في الفم وفطريات الفم: استمر في الاستعمال لمدة 2 أيام بعد الشفاء.

التهابات الفم بسبب الأسنان الاصطناعية: قم بتنظيف ونقع أسنانك الاصطناعية، بغسول الفم لمدة 15 دقيقة، مرتين في اليوم.

بعد جراحات أسنان: أغسل حسب تعليمات طبيب الأسنان الخاص بك.

إذا استمرت الأعراض، توجه إلى الطبيب.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه، فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال كلور هيكسيدين لايسر غسول للفم أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

توقف عن استعمال غسول الفم وتوجه فوراً للحصول على مساعدة طبية إذا ظهر لديك طفح جلدي، انتفاخ في الفم أو في الوجه أو إذا كانت لديك صعوبات في التنفس. قد تكون هذه أعراض رد فعل تحسسي خطير الذي هو نادر جداً.

توقف عن استعمال غسول الفم وتوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهر لديك تهيج في الفم، ألم أو انتفاخ في الوجه – الخدين.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) – أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

اصطبغ مؤقت للسان. يختفي هذا مع إيقاف العلاج.

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

جفاف في الفم

قد تلاحظ تغييراً في حاسة التذوق، شعور بالحرق، تنمل أو وخز في اللسان عندما تستعمل غسول الفم في المرة الأولى. تختفي هذه الأعراض عادة مع الاستمرار في العلاج. إذا استمرت الأعراض – يجب التوجه إلى الطبيب.

أعراض جانبية إضافية

اصطبغ مؤقت للأسنان. يمكن إزالته عادة بواسطة فرك الأسنان. بإمكانك منع الإصطبغ بواسطة تجنب شرب الشاي، القهوة أو النبيذ الأحمر – خاصة ساعة بعد الاستعمال، وبواسطة فرك الأسنان يوميًا بمعجون الأسنان (أنظر 'كيف تستعمل الدواء'). إذا بقي الإصطبغ فبالإمكان إزالته بواسطة التنظيف والصلل لدى طبيب الأسنان أو مساعدة طبيب الأسنان المختصة.

بإمكانك تنظيف أسنانك الاصطناعية بواسطة مادة لتنظيف الأسنان الاصطناعية.

إذا حدث تقشر للجلد داخل الفم، قم بتخفيف تركيز غسول الفم مع كمية متساوية من الماء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب، طبيب الأسنان أو الصيدلي.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن مجال رؤية ومنتناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقبّو بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

يجب الخزن تحت 25°C. يجب حمايته من الضوء.

للاستعمال حتى 21 يوماً من الفتح.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المادة الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضاً على-

Water, propylene glycol, glycerin, xylitol, PEG-40 hydrogenated castor oil, poloxamer 407, aroma (contains limonene , e-anethole, l-menthol, trans-menthole, l-menthyl acetate, (r)-p-mentha-1,8-diene, pin-2(3)-ene, p-cymene, (s)-p-mentha-1,8,diene, geraniol), potassium acesulfame, menthol, sodium saccharin, methyl salicylate, neohesperidin dihydrochalcone, lactic acid.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة –

محلول شفاف عديم اللون.

قناني بحجم 200 أو 500 ملل.

قد لا يتم تسويق كافة أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه:

تارو إنترناشيونال م.ض.، شارع هكيتور 14، خليج حيفا 2624761

اسم المنتج وعنوانه:

Lacer S.A., Boters 5 parc tecnologic del valles, E-08290 Cerdanyola del valles,
Barcelona, Spain

تمّ تحريرها في كانون الأول 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 161-50-35132-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.