

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

### **כלורהקסידין לייסר שטיפת פה**

**חומר פעיל וריכוזו: כלורהקסידין דיגלוקונאט (chlorhexidine digluconate) 0.12% w/v**

רשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

**התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל לגיל 12 שנה. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא לפני השימוש.**

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

- כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (גי'נג'יביטיס).
- לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים.
- לשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים תותבות ובפטרת בפה.
- כעזר בשמירה על היגיינת הפה.
- לעיכוב היווצרות פלאק.

קבוצה תרפויטית: אנטיספטי

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

**הייתה לך תגובה אלרגית לכלורהקסידין דיגלוקונאט או לאחד ממרכיבי התרופה.**

#### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- אין להשתמש בכל מקום אחר למעט הפה שלך. אין לבלוע. במקרה של מגע עם העיניים או האוזניים, יש לשטוף אותן היטב במים.
- במקרה של תגובה אלרגית קשה, עליך להפסיק השימוש ולגשת מיד לקבלת עזרה. ראה "תופעות לוואי".
- אין להשתמש מיד לאחר צחצוח השיניים שלך. ראה "כיצד תשתמש בתרופה" למידע נוסף.
- אין להלבין בדים שהיו במגע עם שטיפת הפה.
- עלולה להופיע הכתמה זמנית של השיניים והלשון. ראה "תופעות לוואי".
- ייתכן שיחול שינוי בתחושת הטעם, או שתורגש תחושת צריבה. ראה "תופעות לוואי".

## ילדים ומתבגרים

התרופה מיועדת לשימוש במטופלים מעל לגיל 12 שנה. אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 שנים אלא בהמלצת רופא.

## תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

## היריון והנקה

ניתן להשתמש בתרופה אם את בהיריון או מיניקה.

## מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה

התרופה מכילה PEG-40 hydrogenated Castor Oil, אשר עלול לגרום לתגובות בעור.

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע.

משחות שיניים עלולות לפגום בפעילות של שטיפת הפה. לאחר צחצוח השיניים, שטוף את פיך ביסודיות עם מים והמתן 5 דקות לפני השימוש בכלורהקסידין לייסר לשטיפת הפה. לחילופין, אתה יכול להשתמש בשטיפת הפה גם בזמן אחר של היום.

### המינון המקובל בדרך כלל הוא:

השתמש פעמיים ביום. מלא את הפקק עד לקו 15 מ"ל. שטוף את הפה ביסודיות למשך דקה אחת ולאחר מכן תירק.

דלקת חניכיים: מומלץ להשתמש במשך חודש.

כיבים בפה ופטרות פה: המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר החלמה.

דלקות פה בעקבות שיניים תותבות: נקה והשרה את התותבות שלך בשטיפת הפה למשך 15 דקות פעמיים ביום.

לאחר ניתוחים דנטליים: לשטוף לפי הוראות רופא השיניים שלך.

אם התסמינים שלך נמשכים, פנה לרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין לקחת תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בכלורהקסידין לייסר שטיפת פה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**הפסק להשתמש בשטיפת הפה ופנה מיד לעזרה רפואית אם מופיעה אצלך פריחה, נפיחות בפה או בפנים או אם יש לך קשיי נשימה.** תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה שהיא נדירה מאוד.

**הפסק להשתמש בשטיפת הפה ופנה לרופא אם מופיע אצלך גירוי בפה, כאב או נפיחות של פנים-הלחיים.**

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמופיעות ביותר ממשמש אחד מעשרה הכתמה זמנית של הלשון. זו נעלמת עם הפסקת הטיפול.

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100 יובש בפה

ייתכן שתבחין בשינוי בחוש הטעם, בתחושת צריבה, נימול, או דקירה בלשון כאשר אתה משתמש בשטיפת הפה לראשונה. זה בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול. אם התופעות ממשיכות - יש לפנות לרופא.

תופעות לוואי נוספות

**הכתמה זמנית של השיניים.** זו בדרך כלל ניתנת להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול למנוע הכתמה באמצעות המנעות משתיית תה, קפה או יין אדום - במיוחד שעה לאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומיומי במשחת שיניים (ראה "כיצד תשתמש בתרופה"). אם הכתמה נותרת היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השיננית.

אתה יכול לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר לניקוי תותבות.

אם מתרחש קילוף של העור בתוך הפה, דלל את שטיפת הפה עם כמות שווה של מים.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא, רופא השיניים או הרוקח.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**תנאי אחסון**

יש לאחסן מתחת ל- 25°C. יש להגן מפני אור.

**לשימוש עד 21 ימים מהפתיחה.**

## **6. מידע נוסף**

**נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם -**

Water, propylene glycol, glycerin, xylitol, PEG-40 hydrogenated castor oil, poloxamer 407, aroma (contains limonene, e-anethole, l-menthol, trans-menthole, l-menthyl acetate, (r)-p-mentha-1,8-diene, pin-2(3)-ene, p-cymene, (s)-p-mentha-1,8,diene, geraniol), potassium acesulfame, menthol, sodium saccharin, methyl salicylate, neohesperidin dihydrochalcone, lactic acid.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה –**

תמיסה שקופה ללא צבע.

בקבוקים של 200 או 500 מ"ל.

ייתכן שלא כל גודלי האריזה משווקים.

**בעל הרישום וכתובתו:**

תרו אינטרנשיונל בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761

**שם היצרן וכתובתו:**

Lacer S.A., Boters 5 parc tecnologic del valles, E-08290 Cerdanyola del valles, Barcelona, Spain

נערך בדצמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 161-50-35132-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.