

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הוטרינרית, צורתה וחוזקה

אלנקובן 200 וטרינרי

פרמיקס להגשה במזון בעלי החיים

2. חומר פעיל :

מוננסין(כמלח סודיום) : Monensin (as sodium) - 200 g/kg

3. למה מיועדת התרופה

אלנקובן 200 וטרינרי משמש למניעת קוקסידיוזיס בפטמים, עופות לחידוש הטלה, ותרנגולי הודו. בבקר משמש התכשיר למניעת קוקסידיוזיס הנגרם ע"י Eimeria bovis and E. zuernii .

קבוצה תרפויטית:

אנטיביוטיקה

4. התוויות נגד

אסור בהחלט לתת אלנקובן 200 וטרינרי לסוסים, לפרדות וחמורים.

עיקול של מוננסין ע"י סוסים הוא פטאלי!!!

מזון זה מכיל ינופורה: יש להימנע ממתן מקביל של טיאמולין (tiamulin) ולנטר לאיתור תגובות חריגות אפשריות כאשר נעשה שימוש במקביל לתרופות אחרות.

אין לטפל בבעלי-חיים, כולל עופות, במוצרים המכילים טיאמולין בעת קבלת מזון המכיל אלנקובן G200 או למשך שבעה ימים לפחות לפני ואחרי הקבלה. עלולים להתרחש עיכוב גדילה חמור או מוות.

5. תופעות לוואי

תופעות לוואי עקב מינון יתר של מוננסין בבקר:

ירידה בצריכת המזון ע"י פרות שטופלו בתכשיר. הירידה בצריכת המזון גוברת ככל שהמינון עולה.
מומלץ לבצע הסתגלות של שבוע בתחילת הטיפול במחצית המינון המומלץ בהוראות השימוש.
ירידה באחוז שומן החלב. ירידה זו גוברת עם הגדלת מנת התכשיר.
ירידה בשיעורי ההתעברות כולל עליה במספר ההזרעות וימים פתוחים (ימי ריק).
עלייה בהופעה של ציסטות בשחלות ודלקת רחם.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" (המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או www.health.gov.ilשנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות) ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

אם אתה מבחין בתופעות לוואי כלשהן, או כל השפעה שאינה מוזכרת בעלון, או שאתה חושב שהתרופה לא פעלה, אנא יידע את הווטרינר.

6. חיות מטרה

תרנגולי פטם, תרנגולות לחידוש הטלה, תרנגולי הודו, בקר המיועד לבשר .

7. אופן המתן והמינון:

תרנגולי פטם ותרנגולות לחידוש הטלה: יש לערבב 500 גרם עד 600 גרם של אלנקובן 200 וטרינרי בטון אחד של תערובת (100-120 גרם מוננסין חומר פעיל לטון תערובת).

תרנגולי הודו: יש לערבב 270 גרם עד 450 גרם של **אלנקובן 200 וטרינרי** בטון אחד של תערובת, (54-90 גרם מונסין חומר פעיל לטון תערובת) לפי חומרת החשיפה לקוקסידיוזיס.

בבקר:

בקר לפיטום במפטמות: 0.28 עד 0.84 מ"ג חומר פעיל לקילוגרם משקל גוף ליום, תלוי בחומרת הנגיעות, עד מקסימום של 360 מ"ג מונסין חומר פעיל לבעל חיים ליום.

בקר במרעה: 0.28 עד 0.84 מ"ג לקילוגרם משקל גוף ליום, תלוי בחומרת הנגיעות, עד מקסימום 200 מ"ג מונסין חומר פעיל לבעל חיים ליום. במשך 5 הימים הראשונים אין לתת מעל 100 מ"ג חומר פעיל ליום, כאשר החומר מעורבב בלא פחות מחצי ק"ג פרמיקס או תערובת המכילה את התכשיר.

בקר בוגר במפטמות או במרעה: 0.28 עד 0.84 מ"ג לקילוגרם משקל גוף ליום, תלוי בחומרת הנגיעות, עד מקסימום 200 מ"ג מונסין חומר פעיל לבעל חיים ליום. במשך 5 הימים הראשונים אין לתת מעל 100 מ"ג ליום, מעורבב בלא פחות מחצי ק"ג פרמיקס או תערובת המכילה את התכשיר.

עגלים: 0.28 עד 2.00 מ"ג חומר פעיל לקילוגרם משקל גוף ליום, תלוי בחומרת הנגיעות, עד מקסימום 200 מ"ג מונסין חומר פעיל לבעל חיים ליום.

8. אופן השימוש

תוסף למזונות בעלי החיים

אין להאביס ללא דילול

יש לדלל בהתאם להוראות השימוש.

לשימוש ישירות במשק, להכנת בלילי מזון:

יש להכין פרמיקס **אלנקובן 200 וטרינרי** עם כמות קטנה של תערובת מוכנה או חומר מדלל אחר (30-50 ק"ג) ורק לאחר קבלת ערבוב הומוגני להוסיף ליתר המזונות. רצוי להוסיף את הפרמיקס למזונות היבשים, לערבב היטב ורק לאחר מכן להוסיף מזונות רטובים ולערבב פעם נוספת. דבר זה מבטיח פיזור אחיד של **אלנקובן 200 וטרינרי** בתוך הבליל.

אזהרה: השימוש לפי הוראות רופא וטרינר. ערבוב לא מספיק של תערובות רפואיות המכילות את החומר הפעיל מונסין סודיום עם מזונות רטובים עלול לגרום לערבוב לא הומוגני אשר עלול בפרקציות מסוימות של המזון לגרום לעליה בריכוז המונסין לרמות המסכנות את הבקר. אם שאריות מזון המכילות מונסין ניתנות לקבוצות שונות של בקר, יש לקחת בחשבון את ריכוז המונסין בשארית זו ולהתאים בעזרת דילול וערבוב מחדש לסוג בעלי החיים (בקר) על מנת למנוע מתן יתר של מונסין.

9. זמני המתנה

לתרנגולי פטם ותרנגולי הודו לשחיטה: יום אחד.
לבקר לשחיטה – 0 שעות¹
אין להגיש לפרגיות שגילן גבוה מ-16 שבועות.
התכשיר אינו מיועד למטילות.
אין להגיש לפרות חולבות

זמן המתנה לא נקבע עבור עגלים שעדיין אינם מעלים גרה. אין להשתמש בעגלים שיועברו לייצור עגלי חלב.

10. אזהרות

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בעופות:

מזון זה מכיל ינופור: יש להימנע ממתן מקביל של טיאמולין (tiamulin) ולנטר לאיתור תגובות חריגות אפשריות כאשר נעשה שימוש במקביל לתרופות אחרות.

• בזמן הטיפול ב**אלנקובן 200 וטרינרי**, אין להשתמש בתרופות: טיאמולין (Tiamulin) וטרולאנדומיצין

(Troleandomycin), אלא מתום 7 ימים מסוף הטיפול, או עד 7 ימים לפני התחלת הטיפול, מחשש לעיכובי גדילה חמורים ואף תמותה.

• אין לתת כלוראמפניקול או סולפונאמידים בזמן הטיפול, מחשש להרעלה.

אין להשתמש ב**אלנקובן 200 וטרינרי** ביחד עם קוקסידיוסטט אחר

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בבקר

• יש לערבב היטב במזון לפני השימוש. האכלה ללא דילול או שגיאות בערבוב המובילות לריכוזים גבוהים

של מונסין היו קטלניות לבקר

• אכילת המזון המכיל מונסין על-ידי מינים לא מאושרים עלולה להוביל לתגובות רעילות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בבעלי חיים

מזיק לבעלי-חיים ימיים עם השפעות ארוכות טווח

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר:

- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- מזיק אם נבלע. גורם לנזק חמור בעיניים. עשוי לגרום לתסמיני אלרגיה או אסתמה או לקשיי נשימה אם נשאף. עשוי לגרום נזק לאיברים (שרירים, לב) במקרים של חשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת. יש להימנע משאיפת אבק².

בעת ערבוב **אלנקובן 200 וטרינרי** יש להקפיד ללבוש בגד-מגן, כפפות ומסכת-אבק. לאחר גמר ההכנה יש להתרחץ היטב במים ובסבון. אם במקרה חדר החומר לעיניים, יש לשטוף העיניים מיד במים זורמים אם נשאף: יש להעביר את האדם לאוויר צח ולשמור על מצב נוח לנשימה.

11. הוראות אחסון:

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו.או תינוקות ועל ידי כך תימנע הרעלה
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש
תנאי אחסון: יש לאחסן במקום קריר ויבש, בטמפרטורה עד 25°C

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב".

13. מידע נוסף

התכשיר ארוז בשק נייר ופולי אתילן רב שכבתי המכיל אבקה מגורענת בצבע חום כהה

בנוסף לחומר הפעיל התכשיר מכיל גם:

Anti-dusting oil (mineral oil)

⁵Limestone

משקל נטו: 25 ק"ג

מס' רישום התרופה: 81-45-91803

היצרן: Elanco Clinton Laboratories, USA

P.O.Box 99, 10500 South State

Road 63, Clinton Indiana 47842

USA

בעל הרישום:

יורומר בע"מ ת.ד. 1064 רמת השרון 47110000.

אושר ב- 04.2022