

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

פנטאדול 12, פנטאדול 25, פנטאדול 50, פנטאדול 75, פנטאדול 100 מדבקות עוריות

כל מדבקה של פנטאדול 12 מכילה 2.1 מ"ג פנטניל (Fentanyl) ומשחררת 12.5 מק"ג/שעה.

כל מדבקה של פנטאדול 25 מכילה 4.2 מ"ג פנטניל (Fentanyl) ומשחררת 25 מק"ג/שעה.

כל מדבקה של פנטאדול 50 מכילה 8.4 מ"ג פנטניל (Fentanyl) ומשחררת 50 מק"ג/שעה.

כל מדבקה של פנטאדול 75 מכילה 12.6 מ"ג פנטניל (Fentanyl) ומשחררת 75 מק"ג/שעה.

כל מדבקה של פנטאדול 100 מכילה 16.8 מ"ג פנטניל (Fentanyl) ומשחררת 100 מק"ג/שעה.

חומרים בלתי פעילים - ראה סעיף 6 בעלון.

קרא בעידע את העלון עד סופו. טרם שיתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שמור עלון זה, ייתכן שתרצה לעיין בו שוב.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק לאנשים אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

תרופות ממספת האופיואידים עלולות לגרום להתמכרות בעיקר בשימוש ממושך, והינן בעלות פוטנציאל לשימוש לרעה ולמינון גבוה. תגובה למינון יתר יכולה להתבטא בנשימה איטית ואף לגרום למוות. ודא כי הנך מכיר את שם התרופה, המינון שהנך לוקח, תדירות המתן, משך הטיפול, תופעות הלוואי והסיכונים הפוטנציאליים. מידע נוסף אודות הסיכון לתלות ולהתמכרות ניתן למצוא בקישור: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת הבנזודיאזפינים, תרופות אחרות המדכאות את מערכת העצבים המרכזית (כולל סמים) או אלכוהול, עלולה לגרום לתחושת שינוניות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי), תרדמת ומוות.

בנוסף לעלון, לתכשירים פנטאדול 12, 25, 50, 75, 100 קיים דף מידע למטופל. דף מידע זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדרעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בפנטאדול 12, 25, 50, 75, 100 ולפעול על פיו. יש לעיין בדף מידע למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשירים. יש לשמור את דף המידע לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לשיכוך כאבים כרוניים וכאבים שאינם חולפים, המצריכים טיפול במשככי כאבים אופיואידים. פנטאדול מיועד לחולים שכבר משתמשים בטיפול אופיואיד.

קבוצה תרפוטית: משכך כאבים אופיואיד.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6).
- אם אתה משתמש בעבר במשכך כאבים אופיואיד.
- לשיכוך כאבים המתמשכים לאורך זמן קצר (כגון: לאחר ניתוח).
- לשיכוך כאבים שאינם כרוניים/מתמשכים.
- לשיכוך כאבים קלים או בינוניים.
- אם יש לך בעיות נשימה מומרות.
- אם יש לך ליקוי חמור בפעילות מערכת העצבים המרכזית (כגון: פגיעה מוחית).
- אם אתה נוטל או נטלת ב- 14 הימים האחרונים מעכבי MAO לטיפול בדיכאון.
- אם את מניקה.
- בילדים מתחת לגיל שנתיים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

פנטאדול הינו תכשיר שעלול להיות מסכן חיים לילדים, גם אם מדובר במדבקה ששכר השתמשו בה. יש לקחת בחשבון שמראה המדבקה עלול להיות מפתה לילדים ובמקרים מסוימים עלול להוביל למצב מסכן חיים. פנטאדול עלול לגרום לתופעות לוואי מסכנות חיים באנשים שלא נוטלים באופן קבוע תרופות מרשם המכילות אופיואידים.

- מדבקות פנטאדול מכילות פנטניל, מרכיב אופיואיד, והינן בעלות פוטנציאל לשימוש בלתי רצוי.
- יש לידע את הרופא המטפל אם אתה או מישהו אחר במשפחתך פיתח בעבר תלות או שימוש לרעה באלכוהול, בתרופות מרשם או בסמים.

- משככי כאבים כדוגמת פנטאדול עלולים לגרום לתלות פיזית או נפשית בשימוש בתכשיר לטווח ארוך, אולם הדבר נדיר אם משתמשים בתכשיר על פי הוראות הרופא.

לאחר שקבע המינון לשימוש בפנטאדול, אין לעבור למינון שונה של פנטאדול או למדבקה אחרת המכילה את החומר הפעיל פנטניל, או למדבקה המכילה חומר נרקוטי אחר, ללא ההיעצות עם הרופא.

שימוש ממושך בתכשיר עלול לגרום להתפתחות של סבילות. ייתכן שלאחר פרק זמן מסוים רופאך יטכרך להעלות לך את המינון על מנת לשמור על רמה נאותה של שימוש בתכשיר.

הפסקה פתאומית של טיפול ממושך בפנטאדול עלולה לגרום להופעת סימני גמילה (ראה סעיף "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה"), לפיכך אין להפסיק את הטיפול בפנטאדול ביוזמתך, ללא הוראה מפורשת מהרופא המטפל. אם רופאך החליט להפסיק את הטיפול בתכשיר זה, מלא אחר הוראותיו בדייקנות. תופעות לוואי דומות לעלוות להתרחש בעת מעבר מפנטאדול למשככי כאבים אחרים ולהיפך. אם אתה חש בתופעות לוואי אלו, ידע את הרופא המטפל.

- השימוש בתרופות אופיואידיות, כמו פנטאדול, עלול לגרום לך לשינוינות בלתי רגילה ולבעיות בנשימה (כגון נשימה איטית וחלשה). לעיתים נדירות מאוד, קשי נשימה אלה עלולים להיות מסכני חיים (בייחוד במטופלים שלא השתמשו בתרופות אופיואידיות בעבר). במידה שנשימת המטופל הופכת לאיטית וחלשה יותר, **הסר את המדבקה ופנה מיד לקבלת עזרה רפואית או קרא לרופא בדחיפות! יש לדבר עם החולה ואף לנער אותו על מנת לוודא שהוא נשאר ער עד לקבלת העזרה הרפואית.**

- קשישים, אנשים רדים מאוד או חולים מאוד עלולים להיות רגישים יותר להשפעות התרופה. אם הנך קשיש או במצב גופני לא טוב, הרופא ינטר את מצבך בצורה הדוקה יותר. ייתכן שהרופא ייתן לך מינון נמוך יותר של התרופה.
- אין להדביק את המדבקה על עור שיש בו פצעים קטנים, אדמומיות, כוויות או על עור שעבר הקרנות.
- יש לבדוק מדי פעם (באמצעות ראייה או מישוש) את המקום בו מודבקת המדבקה, כדי לוודא שהיא מוצמדת כראוי, אינה הרפוי ושלא נפלה. במידה שהמדבקה אינה מודבקת כראוי, יש להצמיד אותה באמצעות פלסטר. אין לנסות להוריד את המדבקה ולהדביק במקום אחר!

יש להיוועץ ברופא המטפל לפני השימוש בפנטאדול אם הנך סובל או סבלת מאחד מהמצבים הבאים, מאחר שהחשש גבוה יותר לתופעות לוואי וייתכן שהרופא יטכרך לרשום לך מינון מופחת של פנטאדול:

- סוכמטת, קוויט או כל מחלת ריאות.
- לחץ דם נמוך או נפח נמוך של נוזל הדם (היפולמיה).
- ליקוי בתפקוד הכליה או הכבד.
- אם היתת לך פגיעה בראש, פגיעה תוך מוחית, גידול במוח, סימנים לעלייה בלחץ תוך גולגולתי (כגון: כאבי ראש, בעיות ראייה), הכרה מפורעלת, תרדמת.
- מחלה לר איטי ולא סדיר.
- הגברת הגורמת לעייפות ולחולשת שרירים (מיאסטניה גראביס).
- בעיות במערכת העיכול כגון חסימת מעיים, עצירות כרונית.
- בעיות בתפקוד הלבלב או כיס המרה.
- לפני הטיפול בפנטאדול, ספר לרופא אם אתה רגיש למזון או לתרופה כלשהי.

עלייה בחום הגוף עלולה לגרום לספיה מוגברת של התרופה דרך העור. לפיכך, **ידע את רופאך מיד במידה שהתפתח חום בגוף הטיפול.** הרופא עשוי להתאים את מינון התרופה לפי הצורך. **הינמנע מחשיפה למקור חום חיצוני ישיר כגון:** פדים מחממים, סדינים חשמליים, שמיכות או כריות חשמליות, בקבוקי מים חמים, מחמום מים חמומים, מנורות חימום או שיזוף ממושך, אמבטיות חמות ממושכות, סאונה, ג'קוזי או ספא.

הדבקת מדבקה בטעות על אדם אחר

פנטאדול מדבקות עוריות מיועדות לשימוש על פני העור בלבד רק עבור האדם שברשמה עבורו התרופה. אין לתת פנטאדול לאדם אחר ויש לנקוט כל אמצעי זהירות על מנת למנוע הגעת התרופה לאדם שאינו המטופל. **דווחו מקרים בהם בטעות מדבקת מסוג זה עבור המטופל לגופו של אדם אחר, לאחר מכן גופני קרוב או לאחר שחלק את יצועו עימו. כמו כן, המדבקה עלולה להידבק לילד שמוחצת על-ידי מבוגר שמדבקה מוצמדת לגופו. הדבקת מדבקה לעור של אדם אחר (במיוחד ילד) עלולה לגרום למינון יתר ולזנק מסכן חיים. במקרה בו מדבקה נדבקה בטעות לאדם אחר, יש להסירה ממוני מיד, לשטוף את המקום שנחשף למדבקה במים בלבד ולפנות מיד לקבלת עזרה רפואית.**

יש להקפיד על שימוש הולם וסילוק נכון של מדבקות פנטאדול (ראה סעיף 3). בעת השלכת המדבקה (משומשת או חדשה), יש לקפל אותה לנשיים כאשר הצד הדביק נכסי פנים, ולהשליך אותה בצורה בטוחה.

שימוש בילדים

אין להשתמש בפנטאדול בילדים מתחת לגיל שנתיים ובילדים מתחת 12 שנה **עברב במשככי כאבים חזקים כגון אופיואידים.**

תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות וילדים, אלא אם הורה רופא מינון להשתמש בה. קיים סיכון לבעיית נשימה חמורה ואף מסכנת חיים. בילדים קטנים נדרשת זהירות בבחירת אזור ההדבקה בכדי למנוע מצב בו ינסו להסיר את המדבקה בעצמם או ינסו לאכול אותה.

יש להקפיד על הדבקת המדבקה ובמקרה הצורך לאבטח את המדבקה באמצעים נוספים. המדבקה תושך ותושלך על-ידי צוות רפואי, רופא או מלווה מבוגר ובשום אופן לא על-ידי הילד עצמו. **יש לשמור את המדבקות החדשות והמשומשות במקום בטוח והרחק מהישיב ידם וראיימם של ילדים.**

אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

שימוש משולב יחד עם התרופות המצוינות מטה, המשפיעות על פעילות מערכת העצבים המרכזית, עלול להוביל להגברת תופעות הלוואי ובמיוחד להופעת ליקויים בנשימה (יש לציין כי הרשימה שלהלן מציינת את החומרים הפעילים בתרופות. אם אינך בטוח האם אתה משתמש בייחד מהתרופות הללו או שיתייץ עם הרופא את הרשמתך) יש לדעת את הרופא אם אתה נוטל:

- תרופות לטיפול בחדרה ולהרגעה (כגון בנזודיאזפינים).
- תרופות לטיפול בבעיות נפשיות (ניוורלוטים, אנטיפסיכוטיים).
- תרופות להרדמה כללית ולהרדמה לפני ניתוח.

משככי כאבים; אם אתה צריך לעבור הליך כירורגי רפואי או דנטלי, ספר לרופא שכל שאתה משתמש בפנטאדול.

- תרופות לטיפול בבעיות שינה (תרופות הפנטאדול, סדטיביות).
- תרופות לטיפול באלרגיות או מחלת הנסיעה (אנטי היסטמינים/אנטי אמטיים).

אם אתה כאבים אופיואידים אחרים (כגון: בופרורפין, נלבופין או פנטוצין).

תרופות להרפיית שרירים כגון לטיפול בכאבי גב.

משקאות אלכוהוליים.

תרופות ממשפחת הפנותאזיאים: כלורפרומזין, טיורידזין, פלופנזין לסכיזופרניה.

אין להשתמש בוז-זמנית עם התרופות המצוינות מטה, אלא אם הנך מנוטר בצורה צמודה על-ידי הרופא המטפל שלך:

- ריטונאביר, נלפיגבאיר, אמפרנויר, פוסאמפרנוויר (לטיפול באיידס - HIV).

קטוקונאזול, איטראקונאזול, פלוקונאזול, ווריקונאזול (לטיפול בדבחותים פטרייתיים).

טרולאנדומיצין, קלריתרומיצין, אריתרומיצין (אנטיביוטיקות מקבוצת המקורולידים).

- פופדאזולין (לטיפול בדיכאון).

וורפאמיל, דילטיאזם, אמיודארון (לטיפול בבעיות בתפקוד הלב וכלי הדם).

ריפאמפיצין (אנטיביוטיקה לטיפול בשחפת), אפרפרנט (למניעת הקאות).

- קרבמזפיץ, פנברביטל, פניטואין (לטיפול באפילפסיה).

ספר לרופא שלך אם הנך משתמש בתרופות הבאות לטיפול בדיכאון, מאחר ששימוש בו-זמני עם פנטאדול עלול להעלות את הסיכון לסידרנס סרטונין, שעלול לגרום לסכנת חיים:

- מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין/סלקטיביים (SSRIs).

מעכבי האנזים מונטאמיין אוקסידאז (MAOs) (כגון: ציטאלופוראם, דולוקסטיין, אסיטאלופוראם, פלואוקסטיין, פלובוקסאמיין, פארוקסטיין, סרטורלין, ונלאפאקסין, תרופות נוספות ממשפחת ה-SSRIs, טראיטריפאזין).

אין ליטול פנטאדול אם אתה נוטל מעכבי MAO (לטיפול בדיכאון או מחלת פרקינסון) או אם נטלת אותם במהלך 14 הימים האחרונים (ראה סעיף 2 "אין להשתמש בתרופה").

שימוש בתרופה לאחר אכילת אלכוהול

אין לשתות ינות או משקאות חריפים במהלך הטיפול בתרופה זו.

הריון והנקה

אם הנך בהריון, חושבת שהרית או מתכננת להרות יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

- אין להשתמש בפנטאדול במהלך לידה (כולל ניתוח קיסרי).

- אין להניח או פחות משתיים במדבקה.

- אין לקבלת לפחות 3 ימים לאחר המדבקה.

נהיגה ושימוש במכוונות

השימוש בתרופה עלול לפגוע בערנות ולהשפיע בצורה ניכרת על היכולת לנהוג, להפעיל מכוונות ועל כל פעילות המציינת ערנות, במיוחד בתחילת הטיפול או כאשר יש שינוי במנה שאתה מקבל. אל תנהג או תשתמש במכוונות בזמן הטיפול בתרופה, אלא אם אתה חש כי הטיפול אינו פוגע בערנותך, ובכל מקרה רק לאחר התייעצות ואישור הרופא.

3. כיצד להשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. **המינון יקבע על פי עצמת הכאב, מצבך הכללי, גילך וכן הטיפול האופיואידים הקודם בו השתמשת. אין לשנות את המינון ללא התייעצות עם הרופא.**

ההתאם לתגובתך יקבעו מינון המדבקה או מספר המדבקות ההשפיעות המקסימלית מורגשת תוך 24 שעות מהדבקת המדבקה הראשונה והשפעת שיכוך הכאב פוחתת בהדרגתיות לאחר הסרת המדבקה מהעור. אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות והוראה מפורשת מהרופא.

עלושה לגרום להופעת סימני גמילה (ראה ממשל בפנטאדול מיוחדות" ומטה בסעיף "אם אתה מפסיק את נטילת התרופה"). לפיכך, אין להפסיק את הטיפול בפנטאדול מיוזמתך, ללא הוראה מהרופא. אם רופאך החליט להפסיק את הטיפול בתכשיר זה, מלא אחר הוראותיו בדייקנות. תופעות לוואי דומות לעלוות להתרחש בעת מעבר מפנטאדול למשככי כאבים אחרים ולהיפך. הרופא יורה לך על מדבקה חדשה שיש לעשות זאת.

כל מדבקה מיועדת ל-3 ימי טיפול (72 שעות) בלבד. יש להחליף מדבקה כל 72 שעות, אלא אם הורה הרופא אחרת. עקב הספיגה האיטית של התרופה לעור, ייתכן שהופעת התכשיר לא תהיה מידית.

עם הדבקת המדבקה הראשונה. לעיתים ההשפעה המקסימלית מורגשת תוך לאחר 24 שעות מהדבקת המדבקה הראשונה. לפיכך, ייתכן שתדקק למשככי כאבים נוספים מסוגים אחרים לטיפול במידה שאתה מרגיש.

במידה שחכאב חוזר, פנה לרופא שלך שיכול לרשום לך משככי כאבים נוספים ולושתו על מינון הפנטאדול. ייתכן שהרופא יורה לך להשתמש במספר מדבקות בלבד וזמנית. הרופא יכול לרשום לך משככי כאבים נוספים על מנת להקטין את צורך כאב מקרי.

שים לב:

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע! לשימוש חיצוני בלבד.

אין לשים את המדבקה בפה, אין ללעוס ו/או לבלוע את המדבקה. אין לחתוך את המדבקה או להפריד את חלקיה.

אין להשתמש במדבקה אם היא חתוכה, פגומה או נראית פגומה.

אופן השימוש במדבקה:

חבירת מקום ההדבקה

פנטאדול מיועד לשימוש בפלג הגוף העליון או בחלק העליון של הזרוע, על עור נקי, יבש, ללא שיער (אם מעט שיער), באזור ללא חתכים, צלקות, פצעים קטנים, אדמומיות כוויות או עור שעבר הקרנות. **בילדים צעירים** (וגם במטופלים מוגבלים ביכולתם

השכלית/קוגניטיבית) - בחר בזוויות את אזור ההדבקה (מטה) על מנת למנוע מהם את האפשרות להסיר את המדבקה או להכניסה לפה. בדוק בקפידה שהמדבקה מודבקת היטב (אם יש צורך, ניתן להיעזר באמצעים נוספים כדי להבטיח זאת). ככל שניתן, ודא שהמדבקה איננה רפויה ואכן נשארה מודבקת לעור.

ילדים

בילדים צעירים יש להדביק את המדבקה בחלק העליון של הגב וזאת בכדי להבטיח שהילד לא יוכל להסיר אותה בעצמו. המדבקה תושך, תוסר ותושלך על-ידי צוות רפואי, רופא או מלווה מבוגר ובשום אופן לא על-ידי הילד עצמו.

במקרים הבאים יש לפקח בצורה צמודה ולנטר ילדים במשך 48 השעות הראשונות:

- לאחר הדבקת המדבקה לראשונה.
- לאחר הדבקת מדבקה במינון גבוה יותר מהקודמת.

הדבקת המדבקה

במידה שהעור הינו שטיר, יש לגזור את השטיר עם מספריים. אין לגלח על מנת לא לגרות את העור. רחץ את הרופא (אם יש צורך בכך) במים בלבד. אין להשתמש בסבון, שמן, תחליבים, אלכוהול או חומר ניקוי אחרים העלולים לגרות את העור. העור חייב להיות יבש לחלוטין לפני ההדבקת המדבקה. הדבק את המדבקה מיד לאחר פחיתות שקי המדבקה. בכדי להוציא את המדבקה מהשקיק, יש לקפל את השקיק לאורך הקו האדום, ולפתוח אותו בחריץ (איור 1).

יש לפתוח את השקיק בכיוון החץ, תוך משיכה איטית ורציפה. יש לקרוע בדביות את קצה השקיק עד הסוף, ולהוציא את המדבקה בזוויות. יש להסיר בזוויות כלפי חוץ מחצית מכיסוי המגן של המדבקה, תוך שימוש בקו החיתוך האלכסוני שבמרכז המדבקה, **מבלי לגעת במשטח הדביק** (איור 2). יש למקם את המדבקה על אזור העור המיועד וללחוץ אותה בחוזקה על העור ותוך כדי כך להסיר את המחצית השנייה של כיסוי המגן. **יש להימנע מלגעת במשטח הדביק**, יש ללחוץ בעזרת כף היד למשך 30 שניות על מנת להבטיח הדבקה טובה לעור (איור 3).

ודא שגם קצוות המדבקה מודבקים היטב. לאחר מכן רחץ ידיים עם מים נקיים (אין להשתמש בסבון או בחומרי ניקוי אחרים).

- אין לחשוף את מקום ההדבקה לחום ממקור חיצוני (ראה ב"אזהרות מיוחדות").

- מאחר שהמדבקה העורית מוגנת בצידה החיצוני מפני מים, ניתן להתקלח עם המדבקה.

- אין לשפשף או לסבן את מקום ההדבקה.

- יש לקפל את המדבקה המושמשת לשניים כאשר הצד הדביק כלפי פנים. השלך אותה מיד בצורה בטוחה.
- הדבק מדבקה חדשה כפי שמתואר מעלה, אך על אזור אחר בעור. ניתן לחזור ולהדביק מדבקה באותו המקום רק לאחר שחלפו לפחות 7 ימים.
- אין לשמור בבית מדבקות שנותרו לאחר תום הטיפול בתכשיר. אם נשארו מדבקות שאין בהן צורך, יש להוציא אותן משקיק האלומיניום, להסיר את כיסוי המגן, לקפל את המדבקה לשניים (כאשר הצד הדביק כלפי פנים) ולהשליך מיד בצורה בטוחה.
- אם מדבקה השתחררה או נפלה מאליה, יש להשליך אותה בצורה בטוחה ולהדביק מדבקה חדשה מיד כאשר הבחנת בכך. את המדבקה החדשה יש להדביק במקום אחר על העור כדי למנוע גירוי עורי או בעיות אחרות. **יש לידע את הרופא כי מדבקה נפלה.**
- אם בטעות נדבקה מדבקה על אדם אחר (ראה גם מערכת סעיף 2)** יש להשתמש במדבקה רק על גבי העור של האדם לו נרשמה התרופה.
- ודא שהמדבקה איננה נופלת או נדבקת בטעות לילד או לבן הזוג, במיוחד במגע קרוב או כשחולקים יחד מיטה.
- אם בטעות מדבקה נדבקת לאדם אחר או לילד, יש להסירה מיד ולפנות לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה.

אם בטעות בלע ילד או כל אדם אחר את המדבקה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון בבית חולים.

אם השתמשת בטעות במינון גבוה יותר

אם בטעות השתמשת ביותר מדבקות ממה שרשם לך הרופא, הסר מיד את המדבקה והתקשר לרופא המטפל או פנה לבית חולים. הסימן החשוב ביותר למנת יתר הוא קשיי נשימה. הסממנים הם שהמטופל נשום בצורה איטית או חלשה באופן יוצא דופן. במקרה זה, יש להסיר את המדבקה ולקרום בדחיפות לרופא! בזמן ההמתנה לרופא, יש להשאיר את המטופל בהכרה. יש לשוחח עימו או לנער אותו מדי פעם עד לקבלת העזרה הרפואית. סימנים נוספים כוללים: עייפות, נימונם רב, מחשבה בלתי צלולה, חוסר יכולת ללכת ו/או לדבר כרגיל, תחושת עילפון, סחרחורת או בלבול.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. עלִיך להחליף את המדבקה כל 72 שעות באותו זמן ביום, אלא אם הרופא יעץ לך אחרת. אם שכחת להחליף את המדבקה, ספר לרופא אותה מיד כשזכורת ורשום את הזמן והתאריך. ספר לרופא אם הבחנת שאיחרת להחליף את המדבקה, כיוון שבמקרה זה ייתכן שתצטרך משככי כאבים נוספים. אין להשתמש ביותר מדבקות ממה שהורה הרופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא. היוועץ ברופא אם אתה חושב שהתרופה אינה משפיעה כצפוי. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק את הטיפול בפנטאדול ביוזמתך, ללא הוראה מפורשת מהרופא.

הפסקה פתאומית של טיפול בפנטאדול עלולה לגרום להופעת סימני גמילה כגון: חרדה, רעד, בחילות, הקאות, שלשולים, חוסר תאבון, שימי בקצב הלב, שינוי בלחץ הדם, שינוי בקצב הנשימה, שיער סמור, חוסר מנוחה, חולשה, פיהוקים, כאבי שרירים, כאבי פרקים, כאבי גב, כאבי בטן, הזעה, הפרשת יתר מהאף, דמע, הרחבת תאשונים, דודי שינה. לפיכך, אם רופאך החליט להפסיק את הטיפול בתכשיר זה, מלא אחר הוראותיו בדייקנות.

אין ליטול תרופות בנחשף! בדוק את התוויות והנחש בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הכרזת מפסיקים אם הנך זקוק להם, אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפנטאדול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשת