

إس.آر. 50 ملغ
أقراص ذات تحرير ممتد
التركيب: كل قرص يحتوي على:
 كويتيابين 50 ملغ (على شكل فومارات)
 Cypine 50 mg (as fumarate)

كويتيابين إينوquamد
إس.آر. 150 ملغ
أقراص ذات تحرير ممتد
التركيب: كل قرص يحتوي على:
 كويتيابين 150 ملغ (على شكل فومارات)

كويتيابين إينوفا م
إس. آر. 200 ملغ
أقراص ذات تحرير ممتد
التركيز:
كل قرص يحتوي على:
كويتيابين 200 ملغ (على شكل فومارات)
e 200 mg (as fumarate)

کویتیاپین إینوquamد
إس. آر. 300 ملغ
أقراص ذات تحرير ممتد
التركيب:
كل قرص يحتوي على:
کویتیاپین 300 ملغ (على شكل فومارات)
pine 300 mg (as fumarate)

إس.أر. 400 ملغ
أقراص ذات تحرير ممتد
التركيز:
 كل قرص يحتوي على:
 كويتيابين 400 ملغ (على شكل فومارات)
 pine 400 mg (as fumarate)

للقائمة المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية
 أنظر "معلومات إضافية" في الفقرة 6. كذلك
 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في
 2 من هذه النشرة

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن ا
توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو ا
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخ
قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه
الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهقين د
18 سنة.
الدواء غير مخصص للمسنين الذين يعانون من
• تزيد الأدوية المضادة للإكتئاب والقلق من
حدوث تصرفات وأفكار إنتشارية لدى الـ

الراهقين والبالغين الشبان حتى عمر 25 مع بداية العلاج بالدواء، يتوجب على المتعامل كافة الأعمار وأقربائهم، متابعة التغيرات الدالة مثل: تفاقم الإكتئاب، أفكار إنتشارية، عدوا شابه. يجب مراجعة الطبيب حالاً، إذا طرحت هذه التغيرات.

- إن المتعالجين المسنين الذين يعانون من المرتبط بالخرف والذين يخضعون للعلاج مضادة للذهان معرضون لخطورة أكبر لل

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

- لمعالجة إنفصام الشخصية.

- لمعالجة حالة الهوس المرتبطة بإضطرابات القطب.
- لمعالجة الإكتئاب المرتبط بإضطرابات ثنائية.
- لمعالجة الإكتئاب بمشاركة دواء إضافي لعلاج الفصيلة العلاجية:

من الأدوية المضادة للذهان.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال كويتيابين إينوفامد إس

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة أو لك من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

الفقرة 6 ”معلومات إضافية“ والفقرة 2 ”مهمة عن بعض مركبات الدواء“.

- كنت تتناول الأدوية التالية:
 - أدوية لمعالجة متلازمة الفشل المناعي الـ (HIV)
 - أدوية من فصيلة الآزول (العلاج للتلوثات)
 - إريتروميسين أو كلاريتورميسين (التلوثات)
 - نيفازودون (العلاج الإكتئاب)

إذا لم تكن واثقا، راجع الطبيب قبل تناول كواينوڤامد إس.أر.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال كويتيابين إس.آر.

- قبل العلاج بـ كويتيابين إينوفا مدم إس.آر. إحدى لـ
- **وُجد لديك ضغط دم منخفض.**
- **كنت تعاني من مشاكل في الكبد.**
- حدثت لديك ذات مرة إحتلالات (صرع)،
- كانت لديك سكتة، بالأخص إذا كنت مسنًا.
- كان لديك في الماضي تعداد منخفض لـ **البيضاء** (الذي يمكن أن يحصل أو لا يحصل **إستعمال أدوية أخرى**).
- **كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك يعاني أو عانى في من مشاكل في القلب، مثل إضطرابات في نظم**

- ضعف أو إلتهاب عضلة القلب أو إذا كنت تتناول مؤثر على نظم القلب.
- وُجد لديك أو لأحد أفراد عائلتك سابقة طبية لخثرات دموية، لأن أدوية من هذا النوع تتشكل خثرات دموية.
- كنت تعاني من السكري أو إذا كنت ضمن الخطورة للإصابة بالسكري. في مثل هذه الحالات، لأن يقوم الطبيب بفحص نسبة السكر في أثناء معا حاجتك بـ كويتيابين إينوفامد إس. آر.
- لا يجوز تناول كويتيابين إينوفامد إس. آر. إذا كان يعاني من الخرف (dementia)، نظراً لأن إينوفامد إس. آر. قد يزيد من خطورة حدوث

قد يزيد في حالات معينة من خطورة حدو
لدى مسنين يعانون من الخرف.

- كنت مسنا وتعاني من مرض الباركينسونية.
- يوجد لديك أو وُجد لديك: حالة لإنقطاع في
لفترة قصيرة أثناء النوم في الليل (يسمى
التنفس - **(apnea)** وكنت تتناول أدوية الـ
النشاط الإعتيادي للدماغ.
- يوجد لديك أو وُجد لديك: حالة من عدم الفـ
تفرغ المثانة تماما (احتباس البول)، تضـ
البروستات، إنسداد المعي أو إرتفاع في الضـ

العين. هذه حالات ناتجة أحياناً عن أدوية (تسمى المضادة للفعل الكوليني)، التي تؤثر على الطعم وتحفيز الخلايا العصبية وذلك بغرض منح حالة طيبة.

- لديك سابقة من الإدمان على الكحول أو الأدوية.
- لديك نظم قلب سريع وغير منتظم أيضاً عندك في حالة راحة، ضربات قلب، مشاكل في التنفس في الصدر أو إرهاق غير مشخص. يحتاج المختص قلبك وعند الحاجة يوجهك حالاً إلى طبيب

بلغ الطبيب حالاً إذا كنت تشعر بواحد مما يليه

كويتيapin إينوفامد إس. آر.:

- منتج من سخونة تصل إلى حار

- سخونة، علامات إنفلوإنزا، ألم في الحنجرة أو آخر، لأن الأمر يمكن أن يكون نتيجة نسبة منخفضة في تعداد كريات الدم البيضاء، الأمر الذي يعني أن يتطلب التوقف عن العلاج بـ كويتيابين إس.أر. و/أو إعطاء علاج.
- إمساك مع ألم متواصل في البطن، أو إمساك يُستجيب لعلاج دوائي، الأمر يمكن أن يؤدي إلى أخطر لإنسداد الأمعاء.
- **أفكار إنتحارية وتفاقم الإكتئاب**
إذا كنت مكتئباً، فمن الممكن أن تراودك أحاسيس إنتحارية. إزدياد في الأفكار الإنتحارية يمكن في نهاية العلاج، كبيان: ابني قاتل اس

في بداية العِرْج بـ «ويكيبيديا» إيوحاد إس يستغرق وقتاً حتى يبدأ الدواء بالتأثير، والأسبوعين وأحياناً أكثر من ذلك. من الجائز زيادة في هذه الأفكار أيضاً عندما تتوقف عن بشكل مفاجئ. هذه الأفكار شائعة أكثر لدى الشبان. لقد أظهرت معلومات من أبحاث سريّة في الخطورة لحدوث أفكار إنتشارية و/إنتشاري لدى البالغين الشبان دون عمر 25، يعانون من الإكتئاب. إذا وُجدت لديك أفكار يجب التوجّه حالاً للطبيب أو للمستشفى. إن الشعور بالإكتئاب مع قريب عائلي أو صديق يمكن أن يساعد، ويجب توجيههم لقراءة هذه المقالة. أتمنى أن أكون قد أوضحت شيئاً ممّا يزعجك.

بإمكانك أن تطلب منهم أن يخبروك إذا شعر بالإكتئاب يتفاقم أو إذا كانوا قلقين من تغير سلوك.

أعراض جانبية جلدية خطيرة (SCARs)

أعراض جانبية جلدية خطيرة (SCARs)، تشكل خطراً على الحياة أو تسبب الموت، هي نادرة وبلغ عنها لدى متعالجين بهذا الدواء. هذه عادة متلازمة ستيفنس - جونسون (Stevens-Johnson syndrome) - طفح واسع مع حويصلات وتقشر للجلد، خاصة حول الفم والعينين والأعضاء التناسلية.

• انحلال البشرة النخرى السمي (Toxic epidermal necrolysis).

- مرض ليل (Epidermal Necrolysis)، أخطر التي تسبب تقشر واسع للجلد.
- متلازمة DRESS - متلازمة رد الفعل التي تترافق مع كثرة الحمضات وأعراض (Systemic) تشمل أعراض شبيهة بالإنفلونزا أيضا طفح، سخونة، إنتفاخ الغدد ونتائج فحوص الدم (بما في ذلك إرتفاع في مستوى الدم البيضاء [كثرة الحمضات] وإرتفاع في إنزيمات الكبد).
- (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) - مرض عارض ملائمة بفتح

- حمامي متعددة الأشكال (Ema Multiforme)
 - طفح جلدي يتراافق ببقاط غير اعتيادية، حمراء إذا كنت تعاني من هذه الأعراض يجب التوقف عن تناول كويتيابين إينوفامد إس.أر. وتبليغ التوجه لتلقي علاج طبي.
- زيادة في الوزن
 - لقد لوحظ حدوث زيادة في الوزن لدى المرضى يتناولون كويتيابين إينوفامد إس.أر.، يجب على طبيب متابعة وزنك بشكل دائم.

الأطفال والمرادقون

الدواء غير مخصص للأطفال والمرادقين

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية
بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية و
غذائية، إحث للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.
لا يجوز تناول كويتيابين إينوفامد إس.أر. إذا كنت
إحدى الأدوية التالية:

- أدوية لعلاج متلازمة الفشل المناعي المكتسب
- أدوية من فصيلة الآزول (العلاج التلوثات الذ
- إيريتروميسين أو كلاريتروميسين (العلاج ا
- نيفازودون (العلاج الإكتئاب)

- يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أدوية للصرع (مثل: فينيتوئين أو كاربامازين)
- أدوية لتخفيف ضغط الدم
- باربيتورات (للأرق)
- تيوريدازين أو ليثيوم (أدوية مضادة للذهان)
- أدوية تؤثر على نظم القلب، مثلاً، الأدوية التي على قلة توازن الشوارد (نسبة منخفضة للبوتاسيوم والمعنيزيوم)، مثل المدرات البولية أو مضادات معينة (أدوية لعلاج التلوثات)
- أدوية قد تسبب الإمساك
- أدوية (تسمى مضادات الفعل الكوليسي) التي تعيق امتصاص الدهون

على طريقة عمل الجهاز العصبي، وذلك لعدة طبية معينة

قبل التوقف عن تناول إحدى الأدوية التي تتناول التوجه للطبيب.

استعمال الدواء والطعام

- لا يجوز شرب عصير الچريب فروت أثناء الدواء. يمكن أن يؤثر عصير الچريب فروت على تأثير الدواء.
- يمكن أن يتأثر كويتيابين إينوفامد إس.آر. من لهذا يجب تناول الدواء ساعة على الأقل قبل النوم.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يجب توخي الحذر بخصوص كمية الكحول التي تتناولها مشاركةً كويتيابين إينوفايد إس.أر. والكحول الذي يسبب نعاساً.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنك حامل، للحمل أو مرحلة ففيجب استشارة الطبيب قبل الدواء. لا يجوز تناول كويتيابين إينوفايد إس.أر. في فترة الحمل، إلا إذا تحدثت مع طبيبك حول ذلك. لا يجوز تناول كويتيابين إينوفايد إس.أر. خلال الإرضاع. أعراض الفطام التالية يمكن أن تحدث لدى الولادة الذين تناولت أمهاهاتهم كويتيابين إينوفايد إس.أر.

إس.ار. في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل تصلب العضلات و/أو ضعف في العضلات، المعدم الهدوء (agitation)، مشاكل في التنفس الأكل. إذا تطورت لدى رضيعك إحدى تلك الأعراض التوجه إلى الطبيب المعالج.

السيادة وإستعمال الماكنا

إن إستعمال هذا الدواء قد يسبب نعاساً لا تقم أو تشغيل الماكنا الخطرة قبل أن تعرف ك الدواء عليك.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي الأقراص على لكتوز لامائي الذي يعتبر السكر إذا قرأت ذلك من قات الطابن. لأنك تعان

الأسمر. إداً، فين بت من قبل الطبيب بابت تعامي تحمل اللكتوز أو بأنك غير قادر على هضم معينة، فإستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

التأثير على نتائج فحوص البول

- يمكن أن يؤدي كويتيابين إينوفايد إس. آر. إيجابية في فحص البول لأدوية لا تتناولها مثل أو مستحضرات لعلاج الإكتئاب من نوع ثلاثي (TCAs). يجب التأكد من سلامة هذه النتائج فحوص إضافية.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا.

الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تبخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبيل فقط. يقوم الطبيب بملاءمة الجرعة الدوائية اليوم بجرعات دوائية بمدى يتراوح بين - 50 ملـ لـ (حسب المرض والإحتياجات الشخصية).

- لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى
- يجب تناول الأقراص مرة في اليوم.
- يتم تخفيض المقدار الدوائي بشكل تدريجي في العلاج.
- لا تتوقف عن العلاج بالدواء إلا بتعليمات من فرق طبية متخصصة تؤمن في ذلك.

• يجب تناول الدواء على الأقل ساعة قبل الأكل أو قبل النوم.

طريقة التناول:

• لا يجوز مضغ، لا يجوز سحق ولا يجوز شطر الأقراص! لأن الأقراص ذات تحrir ممتد.

• يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع الماء.

• لا يجوز شرب عصير الچریب فروت خلال فترة العلاج بـکویتیاپین إینوquamد إس. آر. قد يؤثر ذلك على طريقة عمل الدواء.

مشاكل في الكبد

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد فمن الجائز أن يغير الطبيب المقدار الدوائي الخاص بك.

المسنون

من الجائز أن يغير الطبيب المقدار الدوائي الخاص بك إذا كنت مسنًا.

الإستعمال لدى الأطفال والمرأهقين

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهقين دون عمر 18 سنة.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عليه الدواء. من الجائز أن تشعر بنعاس، دوار، وضربات قلب شاذة.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة دوائية حال تذكرك. ولكن لا يجوز بأي حال

من الأحوال تناول جرعتين دوائيتين بنفس الوقت. يجب

المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إن التوقف بشكل مفاجئ عن تناول الدواء، يمكن أن يسبب الأعراض التالية: عدم القدرة على النوم، غثيان، صداع، إسهال، تقيؤات، دوار وعصبية. يمكن لطبيبك أن يوصيك بخفض المقدار الدوائي بالتدرج قبل التوقف عن العلاج.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة

تناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كم بكل دواء، إن إستعمال کویتیاپین إینوquamد إس. آر. قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) -

أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:

• دوار (قد يسبب سقوطات)، صداع، جفاف الفم

• نعاس (يمكن أن يزول في سياق إستعمال الدواء، قد يسبب سقوطات)

• زيادة في الوزن

• علامات التوقف عن العلاج (أعراض التي قد تحدث عندما توقف عن تناول کویتیاپین إینوquamد إس. آر.) تشمل: تقيؤات، دوار، غثيان، صداع، إسهال، أرق وعدم الهدوء. يوصى بالتوقف تدريجياً خلال 1-2 أسبوع

• حركات غير عادية للعضلات (تشمل صعوبة بدء تحريك العضلات، رجفان، الشعور بعدم راحة، أو تصلب العضلات بدون ألم)

• تغيرات في نسب شحوم معينة (تريجليسيريدات وكوليسترول).

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

• نظم قلب سريع

• الشعور بضربات قلب قوية، سريعة أو تقوية ضربات

• إمساك، صعوبات هضمية

• ضعف

• إنتفاخ في الذراعين أو الرجلين

• إنخفاض ضغط الدم عند الوقوف حيث قد يسبب الدوار أو الشعور بإغماء (قد يسبب سقوطات)

• إرتفاع نسب السكر في الدم

• تشوش الرؤية

• أحلام غير عادية، كوابيس

• الشعور بجوع متزايد

• عصبية

• إضطرابات في النطق وفي اللغة

• أفكار انتشارية وتفاقم الإكتئاب

• ضيق تنفس

• تقيؤ (بالأخص لدى المسنين)

• سخونة

• تغيرات في نسب هرمونات الغدة الدرقية في الدم

• إنخفاض في نسبة من خلايا الدم الحمراء

• إرتفاع في نسبة هورمون الـHDL-C، إرتفاع نسب التريچليسيریدات في الدم، إرتفاع ضغط الدم وإرتفاع

السكر في الدم

• مزيج من سخونة، تعرق، تصلب العضلات، إرهاق

Neuroleptic malignant syndrome (syndrome)

• إصفرار الجلد والعينين (يرقان)

• إلتهاب الكبد (hepatitis)

• إنتصار متواصل ومؤلم

• إنتفاخ في الثدي وإنتج غير متوقع للحليب

• خثرات دموية في الأوردة، خاصة في البطن، تناقص نسبة "الكوليسترول الجيد" (HDL-C)، إرتفاع في الدم

• إرتفاع في نسبة هورمون البرولاكتين في الدم. في حالات نادرة إن إرتفاع في هورمون البرولاكتين قد يؤدي إلى:

- إنتفاخ الصدر لدى الرجال والنساء وإفراز الحليب بشكل غير متوقع.

- توقف الدورة الشهرية لدى النساء، أو عدم إنتظام الدورة الشهرية.

أعراض جانبية غير شائعة - (uncommon)

أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• إختلالات أو تشنجات

• ردود فعل تحسسية التي يمكن أن تشمل كتل بارزة

على الجلد، إنتفاخ في الجلد وإنفاخ حول الفم

• متلازمة تمثل الرجلين (شعور غير مستحب في الرجلين)

• صعوبات في البلع

• حركات خارجة عن السيطرة، خاصة للوجه واللسان

• صعوبات في الأداء الوظيفي الجنسي

• سكري

• تغير في النشاط الكهربائي للقلب الذي يمكن ملاحظته في فقرة 2.

• أعراض إنسحابية قد تحدث لدى المرأة لأمهات

تناولون کویتیاپین إینوquamد إس. آر. في فترة الحمل

• سكتة

• إضطراب في عضلة القلب (cardiomyopathy)

• إلتهاب أووية دموية (myocarditis)

• إلتهاب جذري (vasculitis)، يترافق أحياناً

بطفح شديد، حويصلات، أو مناطق حمراء في الجلد

• إفراز غير سليم للهورمون الذي يتحكم بحجم البول

• تلف ألياف العضل والأعصاب (rhabdomyolysis) في العضلات

• تغيرات في نسبة السكر في الدم في فحوص العضلات

• تغيرات في نسبة الكوليسترول في الدم

• تغيرات في نسبة الصوديوم في الدم

• تغيرات في نسبة هرمونات الغدة الدرقية

• تناقص كمية أنواع معينة من خلايا الدم الحمراء

• إرتفاع نسب إيزيمات الكبد

• إنخفاض نسب الصوديوم في الدم

• إرتفاع نسب الإنزيم كرياتين فوسفوکيناز مصدره العضلات

• إرتفاع نسب هورمون البرولاكتين في الدم

• قد يسبب في أوقات نادرة إلى:

- تضخم الصدر لدى الرجال والنساء وإنفجار حليب

بشكل غير متوقع.

- توقف الدورة الشهرية لدى النساء، أو عدم إنتظام

الدورة الشهرية.

من الجائز أن يجري لك طبيبك فحوص دم من حين

إلى آخر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض

الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر

في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بإمكانك التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة

الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية» على الموقع

وزارة الصحة il. www.health.gov.il الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليل عن أعراض جانبية، أو عن

طريق تصفح الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في

مكان مغلق بعيداً عن متناول أيةدي ومحال رؤية الأطفال

و/أو الرضع، وذلك لتفادى إصابةهم بالتسنم.

التنبيه بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية

(exp. date)، إرتفاع في نسبة هورمون البرولاكتين في الدم دون 25

درجة مئوية. يجب التخزين في العلب الأصلية من أجل

الحماية من الرطوبة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على المواد

غير الفعالة التالية:

Crystalline maltose, Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1)

type A (Eudragit L100-55), Lactose anhydrous, Talc, Magnesium stearate vegetable, Triethyl citrate.

كيف يبدو الدواء؟

DRESS - متلازمة رد الفعل الدوائي

التي تتراافق بكثره الحمضيات وأعراض جهازية

(Systemic) التي تشمل أعراض شبهة بالإنفلونزا

تشمل أيضاً طفح، سخونة، إنفاسات، إسهال، أرق وعدم

الهدوء. يوصى بالتوقف تدريجياً خلال 1-2 أسبوع

• حركات غير عادية للعضلات (تشمل صعوبة بدء تحريك العضلات، رجفان، الشعور بعدم راحة، أو تصلب العضلات بدون ألم)

• تغيرات في نسب شحوم معينة (تريجليسيريدات وكوليسترول).

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى

1-10 مستعملين من بين 100,000:

• إختلالات أو تشنجات

• رد فعل تحسسي شديد من بين 1-10 مستعملين

يمكن أن يشمل صعوبات في التنفس وصدمة

• إنتفاخ سريع للجلد، على الأغلب من حول العينين

• الشفتين والحنجرة (وذمة وعائية)

• إنتفاخ في نسبة السكر في الدم

• الشعور بآلام في الصدر، خاصة في الذراعين

• إرتفاع نسب إيزيمات الكبد

• إنخفاض نسب الصوديوم في الدم

• إرتفاع نسب الإنزيم كرياتين فوسفوکيناز مصدره

العضلات

• إرتفاع نسب هورمون البرولاكتين في الدم

قد يسبب في أوقات نادرة إلى:

- تضخم الصدر لدى الرجال والنساء وإنفجار حليب

بشكل غير متوقع.

- توقف الدورة الشهرية لدى النساء، أو عدم إنتظام

الدورة الشهرية.

من الجائز أن يجري لك طبيبك فحوص دم من حين

إلى آخر.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاق