



لا يجوز تناول فكسوفينادين - تريما في فترة الحمل دون توصية من الطبيب.
لا يوصى باستعمال فكسوفينادين - تريما أثناء الرضاعة.

السيارة واستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثر فكسوفينادين - تريما على قدرتك على القيادة أو تشغيل ماكينات، لكن عليك التأكد قبل القيادة أو تشغيل ماكينات بأن الأقرص لا تسبب لك النعاس أو الدوار.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

للحلب والاطفال فوق عمر 12 سنة الجرعة الدوائية الموصى بها غالباً هي:

فكسوفينادين - تريما 120 ملغ: قرص واحد (120 ملغ) مرة في اليوم.

فكسوفينادين - تريما 180 ملغ: قرص واحد (180 ملغ) مرة في اليوم.

يجب بلع الدواء مع الماء قبل الأكل.

لا يوجد خط شطر في القرص. لا توجد معلومات فيما يتعلق بسحق/طحن القرص.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت بالخطأ جرعة أكبر من فكسوفينادين - تريما تزيد عن المطلوب

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من هذا الدواء، عليك التوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء. أعراض فرط الجرعة لدى الكبار هي: دوار، نعاس، إرهاق وجفاف الفم.

إذا نسيت تناول فكسوفينادين - تريما

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الزمن المطلوب، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الزمن المعتاد حسب تعليمات الطبيب.

إذا توقفت عن تناول فكسوفينادين - تريما

إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول فكسوفينادين - تريما قبل انتهاء العلاج الموصى به من قبل الطبيب، احك للطبيب عن ذلك.

إذا توقفت عن تناول فكسوفينادين - تريما قبل الأوان فمن شأن الأعراض أن تعود.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! افحص ملصقة الدواء والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توقفت لديك أسئلة أخرى حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال فكسوفينادين - تريما قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

راجع الطبيب حالاً وتوقف عن تناول فكسوفينادين - تريما إذا كنت تعاني من انتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة ومن صعوبات في التنفس، لأن من شأن ذلك أن يدل على أنك تعاني من رد فعل تحسسي شديد.

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية في التجارب السريرية مع فكسوفينادين، وكان مستوى شيوعتها شبيهاً بالمستوى الذي شوهد لدى مريض لم يتلق الدواء (دواء وهمي):

أعراض جانبية شائعة (تحدث لدى 10-11 مستعملين من بين 100): صداع، نعاس، غثيان ودوار.

أعراض جانبية غير شائعة (تحدث لدى مستعمل 1 من بين 100): إرهاق/الميل للنوم.

أعراض جانبية أخرى (ذات شيوحة غير معروف) يمكن أن تحدث: أرق، اضطرابات في النوم، آلام مبيطة، عصبية، نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة، إسهال، طفح جلدي وحكة، شرى، ردود فعل تحسسية شديدة من شأنها أن تسبب انتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة، تورد الوجه، ضغط في الصدر وصعوبة التنفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إبداً تفاهق أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير متكرر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية من خلال الضغط على رابط "تبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au)، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو من خلال الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

كما يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية على البريد الإلكتروني: safety@trima.co.il.

فكسوفينادين - تريما

180 ملغ

أقرص مطلية

فكسوفينادين - تريما

120 ملغ

أقرص مطلية

المادة الفعالة وكميتها:

كل قرص يحتوي:

فكسوفينادين هيدروكلوريد

(fexofenadine hydrochloride)

120 ملغ

كل قرص يحتوي:

فكسوفينادين هيدروكلوريد

(fexofenadine hydrochloride)

180 ملغ

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6.

أقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

• احفظ هذه النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.

• تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توقفت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

• عليك تناول المستحضر وفق التعليمات في بند الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج إلى معلومات إضافية. توجه إلى الطبيب إذا تفاقت أعراض (علامات) المرض أو إذا لم تحسن بعد مرور بضعة أيام.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

فكسوفينادين - تريما 120 ملغ: يستخدم الدواء لتسكين حالات الرشح التحسسي الموسمي.

فكسوفينادين - تريما 180 ملغ: يستخدم الدواء لتسكين حالات الطفح الجلدي المتواصل المصحوب بحكة.

الفصلية العلاجية: من مضادات الهيستامين.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كانت لديك حساسية (أرجية) لفكسوفينادين أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بفكسوفينادين - تريما عليك استشارة الطبيب إذا:

- كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى أو الكبد.

- كنت تعاني أو إذا عانيت في الماضي من مرض في القلب، لأن رد فعل هذا النوع يمكن أن

يسبب نظم سريع أو غير منظم للقلب.

- كنت مسناً.

إذا كانت إحدى هذه الحالات تنطبق عليك أو إذا لم تكن متأكدًا، فأخبر الطبيب قبل أن تتناول فكسوفينادين - تريما.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص لأطفال دون سن 12 سنة.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احكي للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأص

إذا كنت تتناول أدوية لمشاكل الهضم الحاوية ألومنيوم أو مغنيزيوم التي من شأنها أن تقلل كمية فكسوفينادين - تريما الممتصة وتؤثر في عمل فكسوفينادين - تريما. يوصى بتناول هذه الأدوية ساعتين قبل أو بعد تناول فكسوفينادين - تريما.

استخدام الدواء والطعام

يجب بلع الدواء مع الماء قبل الأكل.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة، تظنين أنك حامل أو تخططين للحمل، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

5. كيفية تخزين فكسوفينادين - تريما؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي وعن مجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف بدرجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية.
- لا تتخلص من أي دواء في مياه الصرف الصحي أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, opadry OY 8704 orange (hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), titanium dioxide, polyethylene glycol, FD&C yellow #6/sunset yellow fcf aluminum lake, D&C yellow #10 aluminum lake).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

فكسوفينادين - تريما 120 ملغ - قرص مطلي، دائري، مُحدب من الجهتين ولونه برتقالي باهت.
فكسوفينادين - تريما 180 ملغ - قرص مطلي، مُطوّل، مُحدب من الجهتين ولونه برتقالي باهت.
تحتوي كل عبوة على 15 قرصاً معبأً في لويحات (بليسترات).

هذه النشرة لا تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمستحضر. إذا خطر في بالك أي سؤال أو في حال عدم تأكّدك من شيء ما، الرجاء مراجعة الطبيب.

المنتج وصاحب التسجيل: تريما للمنتجات الطبية الإسرائيلية معبروت م.ض.، معبروت 4023000، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في آذار 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

فكسوفينادين - تريما 120 ملغ: 162-12-35365-00

فكسوفينادين - تريما 180 ملغ: 162-13-35366-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.



تريما

معبروت 4023000
منتجات طبية إسرائيلية
معبروت م.ض.

0222B