

رينفوك™ 15 ملغ

رينفوك™ 30 ملغ

أقراص ذات تحرير مطوّل

المُركب الفعّال وكميته:

يحتوي كل قرص ذو تحرير مطوّل من رينفوك 15 ملغ على أوياداسيتينيب (على شكل هيميهدرات) 15 ملغ

Upadacitinib (as hemihydrate) 15 mg

يحتوي كل قرص ذو تحرير مطوّل من رينفوك 30 ملغ على أوياداسيتينيب (على شكل هيميهدرات) 30 ملغ

Upadacitinib (as hemihydrate) 30 mg

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدأ لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر رينفوك 'بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج'. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة عن الأمان، التي عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ رينفوك والتصرف وفقها. يجب قراءة 'بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج' بتمعن والنشرة للمستهلك قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية عند الحاجة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

رينفوك مخصص لعلاج:

● التهاب المفاصل الروماتيزمي (Rheumatoid Arthritis) المتوسط حتى الشديد لدى الكبار، الذين عايشوا إستجابة غير كافية لعلاج سابق بدواء واحد مضاد للروماتيزم أو أكثر من مجموعة DMARDs أو لم يكن بإمكانهم تحمل العلاج. بالإمكان إستعمال رينفوك كعلاج منفرد أو بمشاركة ميتوتريكسات (methotrexate).

● التهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic Arthritis) لدى الكبار، الذين عايشوا إستجابة غير كافية لعلاج سابق بدواء واحد مضاد للروماتيزم أو أكثر من مجموعة DMARDs أو لم يكن بإمكانهم تحمل العلاج. بالإمكان إستعمال رينفوك كعلاج منفرد أو بمشاركة ميتوتريكسات (methotrexate).

● التهاب الفقار الرثياني (Ankylosing Spondylitis) لدى الكبار، الذين عايشوا إستجابة غير كافية لعلاج إعتيادي.

● التهاب الجلد التأتبي (Atopic Dermatitis) المتوسط حتى الشديد لدى كبار ومراهقين بأعمار 12 سنة وما فوق والمرشحين لعلاج جهازى.

الفصيلة العلاجية: من المثبطات الإنتقائية لجهاز المناعة، من مثبطات جانوس كيناز.

يعمل رينفوك عن طريق تقليل نشاط الإنزيم في الجسم المُسمى "جانوس كيناز" الذي يقلل الإلتهاب.

إلتهاب المفاصل الروماتيزمي

يستعمل رينفوك لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي لدى الكبار. إن التهاب المفاصل الروماتيزمي عبارة عن مرض يؤدي إلى التهاب المفاصل. إذا كنت تقاسي من التهاب مفاصل روماتيزمي نشط متوسط حتى شديد، فمن الجائز أن تتلقى في البداية أدوية أخرى، حيث أنّ أحدها سيكون على ما يبدو ميتوتريكسات. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كاف، ستلتقى رينفوك مع أو بدون ميتوتريكسات لعلاج التهاب المفاصل الروماتيزمي لديك.

يمكن أن يساعد رينفوك في تقليل الألم، تصلب وإنتفاخ المفاصل لديك، في تقليل الإرهاق، ويمكن أن يبطل تضرر العظم والغضروف في المفاصل لديك. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشاطك اليومي الإعتيادي وبذلك إلى تحسين جودة حياتك.

إلتهاب المفاصل الصدفي

يستعمل رينفوك لعلاج التهاب المفاصل الصدفي لدى الكبار. إن التهاب المفاصل الصدفي عبارة عن مرض يؤدي إلى التهاب المفاصل والصدفية.

إذا كنت تعاني من التهاب مفاصل صدفي نشط، فمن الجائز أن تتلقى في البداية أدوية أخرى. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كاف، ستلتقى رينفوك مع أو بدون ميتوتريكسات لعلاج التهاب المفاصل الصدفي لديك.

يمكن أن يساعد رينفوك في تقليل الألم، التصلب والإنتفاخ في المفاصل لديك وما حولها، الألم والتصلب في العمود الفقري، الآفات الجلدية الصدفية والإرهاق، ويمكن أن يبطل تضرر العظم والغضروف في المفاصل. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشاطك اليومي الإعتيادي وبذلك إلى تحسين جودة حياتك.

إلتهاب الفقار الرثياني

يستعمل رينفوك لعلاج التهاب الفقار الرثياني لدى الكبار. التهاب الفقار الرثياني عبارة عن مرض يؤدي بشكل أساسي إلى التهاب في العمود الفقري. إذا كنت تعاني من التهاب الفقار الرثياني النشط، فمن الجائز أن تتلقى في البداية أدوية أخرى. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كاف، سوف تتلقى رينفوك لعلاج التهاب الفقار الرثياني لديك.

يمكن أن يساعد رينفوك في تقليل آلام الظهر، التصلب والإلتهاب في العمود الفقري. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشاطك اليومي وبذلك إلى تحسين جودة حياتك.

إلتهاب الجلد التأتبي

يستعمل رينفوك لعلاج التهاب الجلد التأتبي المتوسط حتى الشديد لدى كبار ومراهقين بأعمار 12 سنة وما فوق. بالإمكان إستعمال رينفوك مع أدوية للدهن على الجلد التي تُعطى لعلاج التهاب الجلد التأتبي أو كعلاج منفرد.

إن تناول رينفوك يمكن أن يحسن وضع الجلد، يقلل الحكّة والإحتمات. يمكن أن يساعد رينفوك في تحسين أعراض الألم، القلق والإكتئاب التي من شأنها أن تظهر لدى مرضى التهاب الجلد التأتبي. يمكن أن يساعد رينفوك أيضاً في تحسين إضطرابات النوم وجودة الحياة بشكل عام.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لأوياداسيتينيب أو لكل واحد من المُركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مُفصلة في الفقرة 6)
- وُجد لديك تلوث حاد (مثل التهاب الرئتين أو تلوث جلدي جرثومي)
- وُجد لديك مرض السل النشط (TB)
- وُجدت لديك مشاكل خطيرة في الكبد
- كنت حاملاً (أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوبة")

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج وخلال العلاج بـ رينفوك إحك للطبيب إذا:

● وُجد لديك تلوث (سخونة، تعرق، أو قشعريرة، ضيق في التنفس، جلد دافئ، أحمر أو مؤلم أو تقرحات على جسمك، شعور بالتعب، سعال، شعور بحرقة أثناء التبول أو تبول بوتيرة أكبر من المعتاد، صداع شديد مع رقبة مُتصلبة)، أو إذا كان لديك ذات مرة تلوث متكرر - يمكن أن يقلل رينفوك من قدرة جسمك على محاربة التلوثات ولذلك قد يؤدي إلى تفاقم التلوث الحالي، أو قد يزيد الإحتمال لديك لتطور تلوث جديد

● عانيت من مرض السل أو كنت على إتصال قريب مع شخص مريض بالسل. سيجري طبيبك فحص لمرض السل قبل بدء العلاج بـ رينفوك ويمكن أن يكرر الفحص أثناء فترة العلاج

● عانيت من تلوث الهريس النطاقي (القوباء المنطقية)، لأن رينفوك يمكن أن يسمح بعودة التلوث. إحك لطبيبك إذا كان لديك طفح مؤلم على الجلد مع حويصلات، لأن هذه يمكن أن تكون علامات القوباء المنطقية

● كان لديك ذات مرة التهاب الكبد (hepatitis) من نوع B أو C

● تلقيت مؤخراً لقاحاً أو أنك مقدم على تلقي لقاح - ذلك لأن اللقاحات الحية غير موصى بها خلال إستعمال رينفوك

● وُجدت لديك سرطان - لأن طبيبك سيحتاج إلى أن يقرر فيما إذا لا يزال بإمكانك تلقي رينفوك

● أنت معرضاً لخطورة كبيرة لتطور سرطان الجلد، قد يوصي طبيبك على إجراءات وقائية، مثل فحوص الجلد الروتينية أثناء تناول رينفوك. تحدث مع طبيبك إذا تطوّرت لديك آفة جديدة أو تغير في مظهر الجلد في منطقة معينة. لقد تطوّرت سرطانات جلد لدى متعالجين معينين عولجوا بـ رينفوك

● وُجدت لديك مشاكل في القلب، ضغط دم مرتفع أو كولسترول مرتفع

● الكبد لديك لا يعمل كما يجب

● كانت لديك جلطات دموية في أوردة الرجلين (خثار الأوردة العميقة) أو في الرئتين (إنصمام رئوي). إحك لطبيبك إذا كنت تعاني من رجل منتفخة ومؤلمة، ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، لأنه من الجائز أن تكون هذه علامات لجلطات دموية في الأوردة

● وُجدت لديك مشاكل في الكلى

● وُجد لديك التهاب الرّتج (diverticulitis)، نوع من الإلتهاب في المعى الغليظ) (أنظر الفقرة 4)

إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية التالية، توجه فوراً إلى طبيبك:

● آلام شديدة في البطن، خاصة تلك المصحوبة بسخونة، غثيان وتقيؤات

الفحوص والمتابعة

سوف تحتاج إلى إجراء فحوص دم قبل بدء العلاج بـ رينفوك أو أثناء تناول الدواء. ذلك لكي تفحص ما إذا كان هناك تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات أو قلة اللبغويات)، نسب عالية للشحوم في الدم (كولسترول) أو نسب عالية من إنزيمات الكبد. الفحوص هي للتأكد من أن العلاج بـ رينفوك لا يسبب أية مشاكل.

المسنون

هنالك نسبة أعلى من التلوثات لدى مرضى بأعمار 65 وما فوق. إحك لطبيبك حال ملاحظتك علامات أو أعراض تلوث.

الأطفال والمراهقون

لا يوصى بإستعمال رينفوك لدى أطفال دون عمر 12 سنة أو لدى مراهقين يزنون أقل من 30 كلغ الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي، وهذا لأنه لم يتم فحصه لدى هؤلاء المرضى.

رينفوك غير موصى به للإستعمال لدى أطفال ومراهقين دون عمر 18 سنة الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتيزمي، التهاب المفاصل الصدفي أو التهاب الفقار الرثياني، وهذا لأنه لم يتم فحصه في هذه الفئة العمرية.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. ذلك لأن أدوية معينة بإمكانها التقليل من نجاعة العلاج بـ رينفوك أو قد تزيد خطورة حصول أعراض جانبية.

● أدوية لعلاج التلوثات الفطرية (مثل إيتراكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول)

● أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل كلاريثروميسين)

● أدوية لعلاج متلازمة كوشينغ (مثل كيتوكونازول)

● أدوية لعلاج مرض السل (مثل ريفامبيسين)

● أدوية لعلاج الإختلاجات أو النوبات (مثل فينيتوئين)

● أدوية التي تؤثر على جهاز مناعتك (مثل أزانثيوبرين، سيكلوسبورين وتاكروليموس)

● أدوية التي قد تزيد من خطورة حدوث التهاب الرّتج (diverticulitis) مثل مضادات الإلتهاب اللاستيرويدية (غالباً تستعمل لعلاج الألم و/أو حالات إلهاب العضلات أو المفاصل)، و/أو المواد الأفيونية (المستعملة لعلاج الآلام الحادة)، و/أو الكورتيكوستيروئيدات (غالباً تستعمل لعلاج حالات الإلهاب) (أنظر الفقرة 4)

إذا كنت تتناول إحدى الأدوية من القائمة أعلاه أو إذا لم تكن واثقاً، إحك للطبيب أو للصيدلي الخاص بك قبل تناول رينفوك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

لا يجوز إستعمال رينفوك أثناء فترة الحمل.

الإرضاع

إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، تحدثي مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء. لا يجوز إستعمال رينفوك أثناء الإرضاع لأنه من غير المعروف فيما إذا كان هذا الدواء ينتقل لحليب الأم. أنت وطبيبك تقرران فيما إذا كنت سترضعين أو تتناولين رينفوك. لا تقومي بعمل الإثنين معاً.

منع الحمل

إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، يتوجب عليك إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل من أجل تجنب حصول حمل أثناء تناول رينثوك ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد جرعتك الدوائية الأخيرة من رينثوك. إذا حملت خلال هذه الفترة، عليك التوجّه مباشرة إلى طبيبك.

إذا تلقت طفلك الدورة الشهرية الأولى خلال فترة تناول رينثوك، فعليك إطلاع الطبيب.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا يوجد لـ رينثوك تأثير على القدرة على السياقة وإستعمال الماكينات.

3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بالنسبة للجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

إلتهاب المفاصل الروماتيزمي، إلتهاب المفاصل الصدفي وإلتهاب الفقار الرثياني

الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

إلتهاب الجلد التأتبي

الكبار:

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ أو 30 ملغ مرة واحدة في اليوم، كما وُصف من قبل طبيبك. من شأن الطبيب أن يقرر رفع أو خفض جرعتك الدوائية وفقاً لعمل الدواء في جسمك.

المسنون:

إذا كان عمرك 65 سنة وما فوق، فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

المراهقون (بأعمار 12-17 سنة) الذين يزنون 30 كلغ على الأقل:

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

طريقة تناول

● يجب بلع القرص كاملاً مع الماء. لا يجوز شطر، سحق، مضغ أو كسر القرص قبل بلعه لأن هذا قد يغيّر من كمية الدواء التي تدخل لجسمك

● لمساعدتك على تذكر تناول رينثوك، تناوله كل يوم في نفس الوقت

● بالإمكان تناول الأقراص مع أو بدون طعام

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فعليك التوجّه لطبيبك. لربما تقاسي بعضاً من الأعراض الجانبية المُفصلة في الفقرة 4.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

● إذا فوّت جرعة دوائية واحدة، قم بتناولها فور تذكر ذلك

● إذا نسيت جرعتك الدوائية لمدة يوم كامل، قم بتفويت الجرعة الدوائية التي خسرتها وتناول فقط جرعة دوائية واحدة في اليوم التالي كالمعتاد

● لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن القرص المنسي

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول رينثوك إلا إذا أعطاك الطبيب تعليمات للتوقف عن تناوله.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال رينثوك قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية خطيرة

إحك مع طبيبك أو توجّه فوراً لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تقاسي من أية علامات لتلوث، مثل:

● القوباء المنطقية أو طفح جلدي مؤلم مع حويصلات (الهربس النطاقي)

- أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

● تلوث في الرئتين (إلتهاب الرئتين)، الذي بإمكانه أن يسبب ضيق في التنفس، سخونة وسعال مع بلغم - أعراض جانبية غير شائعة (uncommon)

- أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

أعراض جانبية أخرى

إحك مع طبيبك إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة

● تلوثات في الحنجرة والأنف

● حب الشباب

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

● سعال

● سخونة

● جروح البرد (الهربس البسيط)

● غثيان

● إرتفاع في نسبة الإنزيم المُسمى كرياتين كيناز، الذي يظهر في فحوص الدم

● تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء، الذي يظهر في فحوص الدم

● إرتفاع نسب الكوليسترول (نوع من الشحوم في الدم) كما يظهر في الفحوص

● إرتفاع في نسب إنزيمات الكبد، الذي يظهر في فحوص الدم (علامة لمشاكل في الكبد)

● زيادة في الوزن

● إلتهاب (إنتفاخ) بصيلات الشعر

● إنفلونزا

● فقر الدم

● آلام في البطن

● إرهاق (شعور بإرهاق غير عادي وضعف)

● صداع

● شرى (urticaria)

● تلوث في المسالك البولية

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

● فطريات في الفم (بقع بيضاء في الفم)

● إرتفاع نسب الدهون الثلاثية (نوع من الشحوم) في الدم، كما يظهر في الفحوص

● إلتهاب الرتج (diverticulitis)، تطور إلتهاب مؤلم في جيوب صغيرة تتشكل داخل المعى الخاص بك)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5 كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة الخارجية واللويحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر

● يجب التخزين بدرجة حرارة حتى 30 درجة مئوية

● يجب التخزين في اللويحة الأصلية (بليستر) للحماية من الرطوبة

● لا يجوز رمي أي أدوية إلى المجاري أو إلى القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة

6 معلومات إضافية

ماذا يحتوي رينثوك

يحتوي الدواء بالإضافة للمُركب الفعّال أيضاً على:

رينثوك 15 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل

● لب القرص:

microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

● طلاء الفيلم:

polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172)/ferrosoferric oxide, iron oxide red (E172)

رينثوك 30 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل

● لب القرص:

microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/colloidal silicon dioxide

● طلاء الفيلم:

polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة

رينثوك 15 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل

رينثوك 15 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل هي بلون بنفسجي، مطاولة، محدّبة من كلا الجانبين، مطبوع على جانب واحد 'a15'.

تتوفر الأقراص بلويحات (بليسترات) ضمن علب تحتوي على 28 أو 98 قرصاً ذات تحرير مطوّل وفي عبوة ذات 84 تحتوي على 3 علب، كل واحدة تحتوي على 28 قرصاً ذو تحرير مطوّل.

كل لويحة (بليستر) التي تمثل أيام الأسبوع تحتوي على 7 أقراص.

رينثوك 30 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل

رينثوك 30 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل هي بلون أحمر، مطاولة، محدّبة من كلا الجانبين، مطبوع على جانب واحد 'a30'.

تتوفر الأقراص بلويحات (بليسترات) ضمن علب تحتوي على 28 أو 98 قرصاً ذات تحرير مطوّل.

كل لويحة (بليستر) التي يظهر عليها أيام الأسبوع تحتوي على 7 أقراص. من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

● صاحب الإمتياز وعنوانه: أبقي بيوفارما م.ض.، شارع هاحاراش 4، هود هشارون، إسرائيل

● إسم المنتج وعنوانه: أبقي دويتشلاند جي. أم. بي. إيتش أند كو. كاي. جي، كنولشترسا، لودفيغسهافن، ألمانيا

● تم إعدادها في نيسان 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة

● رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

رينثوك 15 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل 164-29-36194

رينثوك 30 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل 168-69-37036

لمعلومات إضافية ولمركز برنامج الدعم

إتصلوا *6718



من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

RIN APL APR22_CL_P2