

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

תרופה זו משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קרסטור® 5 מ"ג	קרסטור® 10 מ"ג
טבליות מצופות	טבליות מצופות

קרסטור® 20 מ"ג	קרסטור® 40 מ"ג
טבליות מצופות	טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה מכילה:

רוסובסטטין	Rosuvastatin 5 mg
(as rosuvastatin calcium)	(as rosuvastatin calcium)
רוסובסטטין	Rosuvastatin 10 mg
(as rosuvastatin calcium)	(as rosuvastatin calcium)

רוסובסטטין	Rosuvastatin 20 mg
(as rosuvastatin calcium)	(as rosuvastatin calcium)
רוסובסטטין	Rosuvastatin 40 mg
(as rosuvastatin calcium)	(as rosuvastatin calcium)

למרכיבים בלתי פעילים אבא ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

שמור את העלון אולי תצטרך אותו בשנית.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם זומה.

קרסטור אינה מיועדת לילדים ומתגברים מתחת לגיל 18 שנה.

אם אחת מתופעות הלואי מתמירה, או אם הנך חש בתופעת לוואי שאינה מוכרת כאן, אבא פנה לרופא שלך מיד.

1. למה מיועדת התרופה?

קרסטור מיועד לטיפול במבוגרים:

- בהיפרכולסטרולמיה ראשונית (מסוג Іa כולל היפרכולסטרולמיה משפחתית הטרנזיגוטית) (מבצים בהם יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) או דיסליפידמיה מעורבת מסוג ІІb (הפרעה ברמות השומנים השונים בדם). התרופה ניתנת כתוספת לדיאטה במבצים בהם התגובה לדיאטה וטיפולים שאינם תרופתיים (כגון פעילות להורדת משקל) אינה מספקת.
- בהיפרכולסטרולמיה משפחתית הומוזיגוטית (מצב בו יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) בשילוב עם דיאטה וטיפולים אחרים להורדת רמות השומנים בדם (כגון טילוק שומנים LDL apheresis) או במקרים בהם טיפולים אלו אינם מתאימים.

קבוצה תרופוית

מעכב אנדים HMG-CoA reductase

קרסטור שייכת לקבוצת תרופות הנקראת סטטינים, פועלת להורדת רמת השומנים בדם, הפנפו ביותר בקרא כולסטרול. ישנם מספר סוגי כולסטרול בדם, "כולסטרול רע" ו- "כולסטרול טוב".

קרסטור פועלת ומסייעת לגוף לחסום את יצור ה"כולסטרול הרע" ובפניויו מהגוף ומסייעת להעלות את רמות ה"כולסטרול הטוב".

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אבא ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- הינך בהריון, או מניקה. אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש בקרסטור הפסיקי לטיפול קרסטור מיידית ועדי את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים.
- יש לך מחלת כבד.
- הינך סובל מבעיות כליה חמורות.
- הינך סובל ממיחושים או כאבי שרירים חוזרים או בלתי מוסברים.
- הינך נוטל שילוב תרופתי של סופוסובוביר/ולפטסביר/וקליספרלפריר (הממששות לטיפול בדיוהם ויראלי של הכבד הנקרא הפטיטיס C).
- הינך נוטל ציקלוספורין (שימוש בציקלוספורין למשל לאחר השתלת אברים).
- הינך מתחת לגיל 18.

אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק), אבא פנה לרופא שלך.

<p>בנוסף, אין להשתמש בטבליות של 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) אם:</p> <ul style="list-style-type: none">הינך סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה (במידה ויש ספק, אבא פנה לרופא). הינך סובל מבעיות בפעילות בלוטת התריס (תיארידי). הינך סובל ממיחושים או כאבים חוזרים או בלתי מוסברים בשרירים, אם הנך בעל עבר משפחתי או אשתי של בעיות בשריים, או סבלת בעבר מבעיות בשרירים בעת נטילת תרופות אחרות להורדת כולסטרול. הינך צורך כמיות גדולות של אלכוהול באופן קבוע. מוצאך אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני). הינך נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיברטים. אבא פנה לרופא אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק).
--

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בקרסטור

לפני הטיפול בקרסטור ספר לרופא אם:

- הנך צורך כמיות גדולות של אלכוהול באופן קבוע.
- הנך סובל מליקוי בתפקוד הכבד, הכליות או בלוטת התריס.
- הנך נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיברטים, אבא קרא עלון זה בעל מין אם השתמשת בתרופות להורדת כולסטרול בעבר.
- הנך נוטל תרופות המיועדות לטיפול בגנפי הכשל החיסוני האנושי (כגון ריטוביר עם לופיבנרי /או אטאזאנביר). אבא פנה לסעיף "אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות"
- הנך נוטל או נטלת אנטיביוטיקה המכילה חומצה פוסידית ב- 7 הימים האחרונים (לטיפול בדיוהם חיידקי: בלליעה או בהזקתה). השילוב של חומצה פוסידית וקרסטור עלול לגרום לבעיות שריר חמורות (רבדומיליזיס). אבא פנה לסעיף "אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות".
- הנך סובל מכשל נשימתי חמור.
- הנך סובל ממיחושים או כאבים חוזרים או בלתי מוסברים בשרירים, או אם אתה סבלת או בן משפחתך סבל בעבר מבעיות בשרירים, או שיש לך היסטוריה של בעיות בשרירים בעת לקיחת תרופות אחרות להורדת כולסטרול. יש לייעד מיד את הרופא המטפל אם מופיעים מיחושים או כאבים בלתי מוסברים בשריים במיוחד אם אלו מלווים בהרגשה כללית לא טובה או חום. יש לייעד את הרופא גם במידה והינך סובל מחולשת שרירים מתמשכת.
- אם אי פעם פיתחת פריחה חמורה בעור או קילוף בעור, שלפוחיות ו/או כאבים בפה לאחר נטילת קרסטור או תרופות קשורות אחרות.
- מוצאך אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני). הרופא יבחר מינון התחלתי של קרסטור המתאים לך.
- הינך מעל לגיל 70 (הרופא יבחר מינון התחלתי של קרסטור המתאים לך).

אם אחד המצבים הרשומים מעלה מתייחס אליך (או אם אינך בטוח):

אל תיטול קרסטור 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) ובדוק עם הרופא או הרוקח שלך לפני תחילת השימוש של קרסטור בכל מינון.

תגובות עור חמורות כולל תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ותסמונת התגובה התרופתית עם אאודינופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS) זוחו בהקשר לטיפול בקרסטור. הפסק להשתמש בקרסטור ופנה לעזרה רפואית מיידית אם הינך מבחין באחד מהתסמינים המתוארים בסעיף 4.

במספר קטן של מטופלים, סטטינים עלולים להשפיע על הכבד, דבר המחווה בבדיקת דם פשוטה הבודקת עלייה ברמות אנדמי הכבד. לכן, הרופא יבקש לבצע בדיקות דם של תפקודי כבד, לפני ובמהלך הטיפול בקרסטור.

בזמן שהנך מטופל בתרופה זו, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אם יש לך סוכרת או הנך בסיכון לפתח סוכרת, חומצה שתנית בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, או אם יש לך משקל עודף ולחץ דם גבוה.

ילדים ומתגברים:

קרסטור אינה מיועדת לילדים ומתגברים מתחת לגיל 18 שנה.

אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לדילול דם (כגון וורפרין או קלופיגורל)
- ציקלוספורין (בשימוש לאחר השתלת איברים)
- פיבראטים (כגון גמפיברודיל או פנופיברט) או כל תרופה אחרת להורדת כולסטרול (כגון אטטימיב)
- תרופות לקלקול קיבה (משמשות כסותריי חומצה בקיבה)
- אירתרומיצין (אנטיביוטיקה), חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה – ראה למטה וכן בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בקרסטור")
- גלולות למניעת הריון
- גורפריב (לטיפול בסרטן)
- דרולוטמיד (לטיפול בסרטן)
- טיפול הרומובלי תחליפי
- תרופות לטיפול בדיוהמים ויראליים, כולל לנגפי הכשל החיסוני הנרכש (HIV) או דלקת כבד (הפטיטיס) מסוג C, לבד או בשילוב עם (בא ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בקרסטור"). ריטובנרי, לופיבנרי, אטאזאנביר, סופוסובוביר, וקסילפרירי, אומביטסביר, פריטפרירי, דסבוביר, ולפטסביר, גרזופרירי, אלנסביר, גלקפרירי, פיברנטסביר.
- ההשפעה של תרופות אלו עלולה להשתנות על ידי קשומה בזמנית עם הרסטור או שהן עלולות לשנות את ההשפעה של הרסטור
- חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה) – אם עליך לטול חומצה פוסידית בזמן פומי לטיפול בדיוהם חיידקי, יהיה עליך להפסיק באופן זמני את הטיפול בקרסטור. הרופא יאמר לך מתי ניתן לחזור לטיפול קרסטור. נטילת קרסטור עם חומצה פוסידית עלולה לגרום לעיתים נדירות לחולשה, רגישות, או כאב בשרירים (רבדומיליזיס). בא ראה מידע נוסף לגבי רבדומיליזיס בסעיף 4.**

שימוש בקרסטור ומדון:

ניתן לטול בתרופה ללא קשר למדון.

הריון והנקה:

אין לטול קרסטור אם הנך בהריון או מניקה.

אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש בקרסטור **פסקי לטול קרסטור מיידית** ועדי את הרופ שלך. יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים בתקופת הטיפול בתרופה זו.

נהיגה ושימוש במכוונות:

מרבית המטופלים יכולים לנהוג ברכב ולתפעל מכוונת בזמן השימוש בקרסטור – התרופה לא תפגום בכשרותך לבצע פעולות אלו. אולם חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחורת תוך כדי השימוש בקרסטור. במידה והנך חש סחרחורת עליך לפנות לרופא בטרם הפעלת מכוונת או נהיגה ברכב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה לקטוז. אם נלקח לך על-ידי הרופא היוועץ ברופא סובל מאי טבליות מסוכרים מסוימים (גם בקטור או סוכרי חלב) הוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו. אבא ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו ע"י הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
הטיפול עם קרסטור יתחיל עם טבליה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג פעם ביום, גם אם נטלת לפני כן סטטינים אחרים במינון גבוה יותר. הבחירה במינון ההתחלתי תהיה תלויה ב:

- רמת הכולסטרול שתלוק בהתקף לב או שבץ מוחי.
- מידת הסבירות כי תהיה רגיש יותר לתופעת לואי אפשרית.

יתכן כי הרופא יחליט לתת את המינון הנמוך ביותר 5 מ"ג כאשר:

- מוצאך אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).
- הנך בן 70 ומעלה.
- הנך סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכלייה.
- הנך בסיכון לסבול מכאבי שרירים (מיופתיה).

העלאת המינון ומינון יומי מירבי

ייתכן והרופא יחליט להעלות את המינון שהנך נוטל על מנת שיתאים עבורך.

לקרסטור 10 מ"ג, לאחר מכן 20 מ"ג ובמידת הצורך יעלה ל- 40 מ"ג. במידה והתחלת עם מינון של קרסטור 10 מ"ג, יתכן והרופא יכפיל את המינון ל- 20 מ"ג, לאחר מכן במידת הצורך יעלה ל- 40 מ"ג. יהיה מרווח של 4 שבועות בין כל העלאת מינון.

המינון המקסימלי היומי הינו 40 מ"ג. הוא ניתן בדרך כלל לחולים עם רמות גבוהות מאוד של כולסטרול וסיכון גבוה ללקות בהתקף לב או שבץ מוחי, כאשר רמות הכולסטרול אינן יורדות מספיק עם 20 מ"ג.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נוטלים סותריי חומצה מסוג מלחי אלומיניום או מגנזיום, יש ליטול את הקרסטור לפחות שעתיים לפני נטילה של סותריי חומצה מסוג מלחי אלומיניום/מגנזיום.

יש לבדוק את רמות הכולסטרול באופן קבוע, על מנת לוודא שהכולסטרול שלך הגיע לרמה הרצויה ושרמה זו נשמרת.

ניתן ליטול התרופה בכל שעות היום עם או בלי אוכל. מומלץ ליטול את התרופה מדי יום בשעה קבועה.

יש לבלוע הטבליות בשלמותן עם מים.

אין מידע בנוגע לריסוק, חצייה וכתישת הטבליה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עליך ליצור קשר עם הרופא או לפנות לבית החולים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכתה ליטול את התרופה, יש לדלג על המנה בשנכחה וליטול המנה הבאה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל. אין לטול שתי מנות ביחד לפצות על זו שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה רמות הכולסטרול שלך עשויות לעלות שוב.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או בזקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקרסטור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואי. ייתכן ולא תסבל מאף אחת מהן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת, הפסק את הטיפול בקרסטור ופנה לרופא מיד אם:

- יש לך אחת מתגובות רגישות היתר (אלרגיה) הבאות:
 - קושי נשימתי עם או בלי נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון.
 - נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון, שעשויים לגרום לקשיי בליעה.
 - גרד חריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מורמות).
 - כתמים אדמומים שאינם מוגבהים, דמויי מטרר או מעגליים על הגוף, לעיתים עם שלפוחיות במרכז, קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף
 - באיברי המין ובעיניים. לפריחת עור חמורות אלו יכול להיות שקדמו חום ותסמינים דמויי שפעת (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון).
- פריחה מפושטת חום גבוה ובלוטות לימפה מוגדלות (תסמונת Dress או תסמונת רגישות היתר)
- יש לך כאבי שרירים ומיחושים לא רגילים, אשר נמשכים זמן רב יותר מהמצופה. כמו עם סטטינים אחרים, מספר מוצמדם של מטופלים חוו השפעה בלתי נעימה בשרירים, ולעיתים נדירות תופעה זו הופכת למסכנת חיים, פוגעת בשרירים ויודעה בשם רבדומיליזיס (rhabdomyolysis).
- יש לך קרע בשריר.
- יש לך תסמונת דמוית דאבת (lupus-like disease syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100):

- עצירות,
- כאבי ראש,
- הרגשת חולי,
- סחרחורת,
- כאבי בטן,
- חולשה,
- כאב שרירים,
- עלייה בכמות החלבון בשתן - אלו בדרך כלל חזרות לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עבור קרסטור 40 מ"ג),
- סוכרת. הסיכון לפתח סוכרת סביר יותר אם הנך בעל רמות גבוהות של שומנים וסוכר בדם, בעל עודף משקל ולחץ דם גבוה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופת הטיפול.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- פריחה בעור, גרד, ותגובות עוריות אחרות.
- עלייה בכמות החלבון בשתן - אלו בדרך כלל חזרות לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עבור קרסטור 5 מ"ג, 10 מ"ג ו- 20 מ"ג).
- תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):**
 - תגובה אלרגית חמורה שסימניה כוללים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון, קושי בבליעה ובשימה, גרד חמור בעור (עם שלפוחיות מורמות). אם הנך חושב שיש לך תגובה אלרגית, הפסק לקחת קרסטור ופנה מיד לעזרה רפואית.
 - קיעקה בשריר במבוגרים – ליתר ביטחון, הפסק לקחת קרסטור ודבר עם הרופא שלך מיד אם הנך חש במיחושים או בכאבי שרירים לא רגילים הנמשכים יותר זמן מהמצופה.
 - כאב בטן חמור (דלקת בלבלב).
 - עלייה באנדמי כבד בדם.
 - דימום או נטייה מוגברת לחלחלות בשל רמות נמוכות של טסיות דם.
 - תסמונת דמוית דאבת (lupus-like disease syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות המופיעות בפחות ממשמשש 1 מתוך 10,000):

- צהבת (הצהבת העור והעיניים)
- הפטיטיס (דלקת בכבד)
- עקבות דם בשתן
- כאבי פרקים
- דק לעצבים בדורעות וברגליים (כגון חוסר תחושה או תחושת נימול)
- אובדן זיכרון
- הגדלת החדה בגברים (gynaecomastia)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- שלשל
- בצקת (נפיחות עקב הצטברות נוזלים)
- הפרעה בשינה, כולל נדודי שינה וחלומות בלהה
- בעיות בתפקוד המיני
- דיכאון
- קוצר נשימה
- בעיות נשימה כולל שיעול מתמיד ו/או קוצר נשימה או חום
- חולשת שרירים קבועה
- שיעול
- פציעה בגיד

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שממצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il (המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי), או ע"י כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il

5. איןך לאחסן את התרופה?

- אין לאחסן מעל 30°C.
- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של לדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. **אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!**
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
- אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, calcium phosphate, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, glycerol triacetate, טבליות 5 מ"ג ferric oxide yellow

טבליות 10, 20, 40 מ"ג ferric oxide red

כל טבליה של קרסטור 5 מ"ג מכילה גם 94.88 מ"ג לקטוד מונוהידראט. כל טבליה של קרסטור 10 מ"ג מכילה גם 91.3 מ"ג לקטוד מונוהידראט. כל טבליה של קרסטור 20 מ"ג מכילה גם 182.6 מ"ג לקטוד מונוהידראט. כל טבליה של קרסטור 40 מ"ג מכילה גם 168.32 מ"ג לקטוד מונוהידראט.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליות קרסטור 5 מ"ג: טבליות עגולות מצופות, קמורות בשני הצדדים, בעלות צבע צהוב, חרוטות עם הסימון "ZD4522 5" מצידן האחד.

טבליות קרסטור 10 מ"ג: טבליות עגולות מצופות, קמורות בשני הצדדים, בעלות צבע ורוד, חרוטות עם הסימון "ZD4522 10" מצידן האחד.

טבליות קרסטור 20 מ"ג: טבליות עגולות מצופות, קמורות בשני הצדדים, בעלות צבע ורוד, חרוטות עם הסימון "ZD4522 20" מצידן האחד.

טבליות קרסטור 40 מ"ג: טבליות אליפטייות מצופות, קמורות בשני הצדדים, בעלות צבע ורוד, חרוטות עם הסימון "40" מצידן האחד ו-"ZD4522" מצידן השני.

האריזה מכילה 7 או 28 טבליות באריזת בלסט. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משוקים.

מיוצר ע"י:

איי.פי.אר פרמציוטיקלס אינק, פוארטו ריקו

עבור אסטרהנזיקה אנגליה בע"מ,

מקלספילד, אנגליה.

באתר השימוש והיבואן:

אסטרהנזיקה (ישראל) בע"מ,

רח' עתירי ידע 1,

כפר סבא 4464301.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

קרסטור 10 מ"ג: 129 74 30798 00

קרסטור 20 מ"ג: 129 75 30799 00

קרסטור 40 מ"ג: 129 76 30800 00