

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ترامادكس فلاشتاب، أقراص ذوابة في الفم، 50 ملغ

يحتوي كل قرص ذوابة على ترامادول هيدروكلوريد (Tramadol hydrochloride) 50 ملغ
وإدوية فعالة ومؤثرة للحساسية في الدواء - انظر البند 6
"معلومات إضافية" في البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة يمتنع حتى نهائيتها وذلك قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كنت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
وصف الدواء أنك لا تعطيه لأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بد أنك إن مآلتهم الطبية مشابهة لحالتك.
الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 14 عاماً.

قد تسبب الأدوية من عائلة الأفيونيات الإدمان، بالإسلاس عند الاستعمال المتواصل، كما أنه من الممكن أن يتم إساءة استخدامها وأخذ جرعة مفرطة. قد تتمثل ردة الفعل على الجرعة المفرطة ببطء التنفس وحتى قد تسبب الوفاة.
تأكد من أنك تعرف اسم الدواء، العلامات التي تتنبأها، وبوتيرة تناولها، مدة العلاج، الأعراض الجانبية والمخاطر التي من الممكن حدوثها.
بإمكان إيجاد معلومات إضافية بشأن خطر التعرق والإدمان، في الرابط:
https://www.health.gov.au/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_apdf

قد يؤدي تناول هذا الدواء مع عائلته النيزويدربينات، أوية أخرى مثبطة للجهاز العصبي المركزي (وبضمن ذلك المخدرات) أو الكحول، إلى الشعور بالنعاس، صعوبات التنفس (تنشيط التنفس)، الغيبوبة والموت.

1. لِمَ أعْطِ هَذَا الدَّوَاءَ؟

ترامادكس فلاشتاب مخصص لعلاج الألم المتوسط حتى الشديد. المجموعة الجينية: الأفيونية. الإنبوبات.

الترامادول، المادة الفعالة في ترامادكس فلاشتاب، هي مسكن الألم ينتمي إلى مجموعة الأفيونيات، وهي تعمل على جهاز الأصبغ المركزي. تسكن الألم من خلال التأثير على الخلايا العصبية في العمود الفقري وفي الدماغ.

2. قَبْلُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ

يُمنَعُ اسْتِعْمَالُ الدَّوَاءِ:

- إذا وجدت لديك حساسية (أولية) للمادة الفعالة (ترامادول هيدروكلوريد) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6)
- إذا كنت في حالة تسنم شديدة بسبب الكحول، الأقرص المنومة، مسكّنات الألم أو أوية أخرى لعلاج الحالة النفسية (الأدوية التي تؤثر على الحالة النفسية والمشاعر).
- إذا كنت تتناول مضطبات الأوكسيكود أحادي الأمين (MAO) (أوية محددة لعلاج الاكتئاب)، أو إذا كنت قد تناولتها خلال آخر 14 يوماً قبل تناول ترامادكس فلاشتاب (انظر بند "تروء فعل بي الأوية").
- إذا كنت مصاباً بالمترع وليست هناك سيطرة كما ينبغي من الوقيات على خلال العلاج الذي تتلقاه.
- كبديل للظلم عن المخدرات.

تعتبرات خاصة متعلقة بإسعمال الدواء
قبل بدء العلاج بترامادكس فلاشتاب، أخبر الطبيب إذا:
كنت تعقد بآلك تعاني، أو عانيت في الماضي من التعلّق بمسكّنات الألم الأخرى (أفيونيات)، الكحول، الأوية بوصفة طبيب أو الأوية غير القانونية.

عانيت في الماضي من أعراض الظلم مثل: انعدام الهنوء، الهلع، الارتجاف أو التعرق عند التوقف عن إسهلاك الكحول أو المخدرات.

كنت تشعر بالحاجة لإسهلاك المزيد من ترامادكس فلاشتاب من أجل الوصول إلى نفس المستوى من تسكين الألم، فقد يشير ذلك إلى بدء مقاومة بعض الأوية وبدء الإدمان عليه. توجه للطبيب الذي يسوقها معنأفة علاجك والذي قد يغير لك الجرعة أو يغير العلاج إلى مسكّن ألم آخر.

كنت تعاني من اضطرابات في حالة الوعي (إذا كنت تشعر بآلك على وشك الإغماء).

كنت في حالة صدمة (قد يكون التعرق البارد إشارة لذلك).

كنت تعاني من ارتفاع الضغط على الدماغ (قد يحصل جزء تعرض لأمية إصابة أو مرض دماعي).

كنت تعاني من صعوبات التنفس.

كنت تعاني من الصرع أو الميل لنوبات صرعية، لأن مخاطر النوبات الصرعية قد تزداد.

كنت تعاني من الاكتئاب وتتناول الأوية مضادة للاكتئاب، لأن بعضها قد يتفاعل مع الترامادول (انظر لاحقاً "التفاعلات بين الأوية").

كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى.

مشاكل تنفس تتعلّق بالظلم

يحتوي ترامادكس فلاشتاب على مادة فعالة تنتمي لمجموعة أوية تطلق عليها اسم الأفيونيات. قد تسبب الأفيونيات مشاكل تنفس تتعلّق بالظلم، مثل انخفاض ضغط الدم، انخفاض ضغط التنفس خلال النوم (Apnea)، وانخفاض أوكسجين الدم المتعلّق بالظلم (مستوى أوكسجين منخفض في الدم).

يتعلّق خطر حصول انخفاض ضغط التنفس خلال النوم بجرعة المادة الأفيونية. قد يفكر طبيبك بخفض الجرعة الإجمالية من المادة الأفيونية التي تتناولها إذا كنت مصاباً بانقطاع التنفس خلال النوم.

هناك خطورة عالية للتعرض لتصلب السيروتونين التي قد تحصل بعد تناول ترامادول بالدعم مع بعض الأوية المضادة للاكتئاب أو بعد تناول ترامادول لوحده. توجه فوراً لتلقي الاستشارة الطبية إذا شعرت بأحد الأعراض المتعلّقة بهذه المتلازمة الخطيرة (انظر البند 4 "الأعراض الجينية").

قد الإبلاغ عن نوبات صرع لدى متلقي العلاج الذين يتناولون ترامادول بمستوى الجسمية الموسمي. بما في ذلك الخطر عندما تكون جرعات الترامادول أعلى من الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها (400 ملغ).

من شأن تناول هذا الدواء بصورة دائمة، وخصوصاً لفترات طويلة، أن يؤدي للإدمان. كان من الواجب على طبيبك أن يشرح لك ما هي فترة الإدمان المطلوبة، متى من المبدأ التوقف وكيفية القيام بذلك بصورة آمنة.

في بعض الأحيان المتباعدة، قد تحدث زيادة جرعة الدواء أكثر حساسية للألم. إذا شعرت بذلك، الرجاء التحث مع الطبيب المعالج بشأن العلاج.

الشهية، الرجة أو التعرق. سيحدث معك طبيبك حول كيفية خفض الجرعة تدريجياً قبل التوقف عن تناول الدواء. من المهم عدم التوقف عن تناول الدواء بغير واحد، لأن خطر الشعور بأعراض الظلم يزداد في هذه الحالة.

من المفترض أن يتم إسخدم المواد الأفيونية من قبل من وصفها الطبيب لهدف محدد لإعطاء الدواء لأي شخص آخر. من شأن تناول المواد الأفيونية بجرعة كبيرة أو بوتيرة أعلى أن يزيد من مخاطر الإدمان. قد يؤدي فرط الاستعمال أو إساءة الاستعمال إلى جرعة زائدة أو الوفاة.

يتم الترامادول بعملية معالجة في الكبد بواسطة إنزيم. لدى بعض الناس، خلافاً عن متعين من الإنزيم، المراد الذي قد يؤثر عليهم بطرق مختلفة. بعض الناس لن يشعروا بالآثار من التغيير على الألية، في حين قد يعاني أشخاص آخرون من أعراض جانبية شديدة وبخاصةً الكبد. إذا لاحظت أحد الأعراض الجانبية التالية، فيجب عليك التوقف عن تناول الدواء والتوجه لطبيب فوراً. فيجب طبعي أو سطحي، بيلة، نعاس، مسكّن حجم حقدات العين، تشوش بالغباق أو التقيؤ، إسهال، انعدام الشهية.

تفاعلات بين الأوية
إذا كنت تتناول، أو إذا كنت تتناول مؤخرناً أوية أخرى بما في ذلك الأوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يُمنَعُ تناول ترامادكس فلاشتاب مع مضطبات الأوكسيكود أحادي الأمين MAO (أوية محددة لعلاج الاكتئاب) أو إذا كنت قد تناولتها خلال آخر 14 يوماً قبل تناول ترامادكس فلاشتاب.

قد يحصل انخفاض بتأثير ترامادكس فلاشتاب وقد تكون فرقاً تأثيراً أضعف أو أكثر من تناوله مع الأوية التي تحتوي على: كارامازيبين (علاج نوبات الصرع) أروناستينون (لمنع الغثيان)

سيقول لك الطبيب إن كنت بحاجة لتناول ترامادكس فلاشتاب، وما هي الجرعة.

قد يزيد الخطر للأعراض الجانبية إذا كنت تتناول: مسكّنات الألم أخرى مثل المورفين والكوبتاين (حتى لأجل تخفيف السعال) أو الكحول خلال فترة تناول ترامادكس فلاشتاب. قد تشعر بالنعاس أو قد تشعر بآلك على وشك الإغماء. إن حصل لك ذلك، توجه إلى طبيبك.

من شأن استعمال ترامادكس فلاشتاب في نفس الوقت مع أوية مهدئة أو منومة (مثل بنزودرينيدات) أن يزيد من الخطر للنعاس، صعوبات التنفس (تنشيط التنفس)، الغيبوبة وقد يتسكّل الحفاظ على الحياة. بناء على ذلك، يجب التفكير بالاستخدام المتوازي فقط إذا لم تكن البدائل الأوية الأخرى متاحة. مع ذلك، إذا وصف لك ترامادكس فلاشتاب مع أوية منومة أخرى، فيجب أن يتم تحديد الجرعة ومدة الإدمان.

الموازي من نفس الطبقة، الرجاء اخبار طبيبك بكل الأدوية المنومة التي تتناولها، وعليك الالتزام بدقة بتوصيات الطبيب بشأن الجرعة. قد يكون الخطر من الإسهال أو الأرقاب معرفة العلامات والأعراض الجانبية مفيداً. اتصل بطبيبك إذا عانيت من هذه الأعراض.

الأوية التي قد تسبب نوبات صرعية (نوبات الصرع)، مثل بعض أنواع الأوية المضادة للاكتئاب أو الأوية المضادة للذهان، من الممكن أن يكون احتمال التعرض لأكثر أكبر إذا تناولت ترامادكس فلاشتاب في نفس الوقت. سيقول لك طبيبك إذا كان ترامادكس فلاشتاب ملائماً لك.

أوية معينة قد تتفاعل مع ترامادكس فلاشتاب معيها، وقد تسعر بمتلازمة السروتونين (انظر البند 4 "الأعراض الجينية").

مضادات التخثر من مشتقات الكورامين (أوية تسهيل الدم)، مثل وارفارين، قد تتأثر فاعلية هذه الأوية على تخثر الدم، وعندما من الممكن حصول حالات نزيف.

استعمال الدواء والمغذات
لا يؤثر الغذاء على فاعلية ترامادكس فلاشتاب. استخدام الدواء واستهلاك الكحول
لا لتسبب المشروبات الكحولية خلال فترة علاج ترامادكس فلاشتاب.

فلاشتاب، لأن تأثيره قد يزداد.

الأطفال والمراهقون

استعمال ترامادكس فلاشتاب للأطفال الذين لديهم صعوبات تنفس:
ليس من المبدأ استخدام ترامادول للأطفال المصابين بصعوبات التنفس، لأن أعراض التسبم بالترامادول قد تكون أكثر شدة لدى هؤلاء الأطفال.

الحمل والإرضاع الحويصة

لا تتناول ترامادكس فلاشتاب إذا كنت حاملاً أو تعتديين بآلك حامل، إلا إذا تحثت مع الطبيب وتبين أن الفائدة في العلاج تفوق خطر الظلم للمن المأتملاً. إذا كنت تتناولين ترامادكس فلاشتاب أثناء الحمل، فمن شأن ذلك أن يسبب للطفل حالة من التعلّق والشعور بأعراض الظلم بعد الولادة، ممّا يستدعي العلاج. يُمنَعُ تناول ترامادكس فلاشتاب خلال فترة الرضاعة، لأنه يتم إفرازه عن خلال لبن الأم ومن الممكن أن يؤثر على طفلك. اعتماداً على التجربة لدى نبي البشر، لا يؤثر ترامادول على الحوية المرأة أو الرجل.

الصحية والاستعمال الميكائيات

قد يؤدي ترامادكس فلاشتاب للشعور بالنعاس، والتوار وتشويش الرؤية، ولذلك فإنه قد يسمن برود فطك. إذا شعرت بأن ردود فطك (تجاوبك) قد تآثرت، فلا تقم بتسليم سيارة أو أي مركبة أخرى، لا قم بتشغيل الأجهزة الكهربائية أو الميكائيات.

قد يؤثر الدواء على قدرتك على السيقاة لأنه قد يسبب النعاس أو التوار. لا تقم بالسيقاة خلال فترة تناول هذا الدواء، إلى أن تعرف كيفية تأثيره عليك.

تحث مع طبيبك أو مع الصيدلي إذا لم تكن مقتنعاً بأن السيقاة خلال فترة تناول هذا الدواء آمنة.

بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب على مقربة من الشارع أو ما شابه.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على 20 ملغ أسيلبراتين في كل قرص. أسيلبراتيم هو مضاد للفطريات. قد يسبب الضرر إذا كنت مصاباً ببيلة الفينيل كيتون، وهو اضطراب وراثي نادر يؤدي التراكم الفينيل للأئين لأن جسمك لا يستطيع التخلص من كما يجب.

3. كيف تسعمل الدواء

يجب استعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الحفظ مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة تناول الدواء. الجرعة وطريقة العلاج سيحددها الطبيب فقط.

يجب أن تكون الجرعة ملائمة لشدة الألم وحساسيتك الشخصية للألم.

بصورة عامة، يجب تناول أقل جرعة ممكنة تساعد في تسكين الألم. يُمنَعُ تناول أكثر من 400 ملغ ترامادول هيدروكلوريد في اليوم، إلا إذا وجهك طبيبك بذلك.

إلا إذا تم إرشادك من قبل طبيبك بتعليمات أخرى، فإن الجرعة المقيّمة هي:

البالغون والمراهقون من جيل 14 عاماً
قرص واحد أو قرصان (مساويين لـ 50-100 ملغ ترامادول هيدروكلوريد) في كل 4-6 ساعات.

قد يصعب عليك طبيبك جرعة مختلفة وأكثر ملائمة لك، هذه الحاجة للأطفال
ترامادكس فلاشتاب ليس مخصصاً للأطفال دون سن 14 عاماً المسنون

لدى المسنين (فوق جيل 75 عاماً) من الممكن أن يتأخر إفراز ترامادول من الجسم. إذا كان هذا الأمر صحيحاً بالنسبة لك، فقد يوصي طبيبك بزيادة الفواصل الزمنية بين الجرعات.

مرض خطير في الكبد أو الكلى (فشل) مرضى غسل الكلى
يجب على متلقي العلاج المصابين بفشل الكبد أو الكلى بمسئوى خطر، الامتناع عن تناول ترامادكس فلاشتاب. إذا كنت تعاني من قصور (فشل) بمسئوى معتدل أو متوسط، فمن الممكن أن

• تعرق.
• **أعراض جانبية شائعة** (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 1,000):
• تأثيرات على القلب والدورة الدموية (الشعور بضربات القلب، نبض سريع، الشعور بالإنعاش أو الالتهاب). تحصل هذه الأعراض الجانبية بالأمس لدى متلقي العلاج في وضعية الوقوف أو خلال الجهد الجسدي.
• الرغبة بالتقيؤ، شكايا في البطن (مثل الشعور بالهضغ مع البطن، انتفاخ)، إسهال.
• ردود فعل جلدية (مثل الحكة، الطفح الجلدي).

• **أعراض جانبية نادرة** (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 10,000):
• ردود فعل حساسية (مثل صعوبات التنفس، صفير، انتفاخ الجلد) والصدمة (فشل مفاجئ في تدفق الدم).
• نبض بطيء.
• ارتفاع ضغط الدم.
• شعور غير عادي (مثل آلام، لسع، انعدام الشعور)، رجفة، نوبات صرع، تشنجات العضلات، عدم التنسيق الحركي، فقدان الوعي المؤقت (إغماء)، اضطرابات الكلام.
• حصلت نوبات الصرع بصورة أساسية في حالات الجرعات المرتفعة من الترامادول أو عندما تم تناول ترامادول بموازاة أدوية أخرى التي من شأنها تحفيز النوبات.
• تغييرات في الشهية.
• خدران، بلبلة، اضطرابات في النوم، حالات هلع وكوابيس.
• من الممكن الإصابة من شكايا نفسية بعد العلاج بـ ترامادول فلاشتاب. قد تحدث عنها وطبيعتها (بحسب شخصية متلقي العلاج ومدّة العلاج). قد تظهر على شكل تغييرات في الحالة المزاجية (في الغالب حالة مزاجية ممتازة، أحيانا غضب، تغيرات في النشاط وعجز هبوط وأحيانا ارتفاع) وترافق في الإدراك العقلي والحسي (وعى أقل وفترة أقل على اتخاذ القرارات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى أخطاء في الحكم).
• توشوش الزووية، فرط توسع الحدقات، انقباض الحدقات.
• تنفس سطحي، ضيق تنفس.
• تم الإبلاغ عن تفاعلات في حالات الزو، لكن لم يثبت أن ذلك نتج عن الترامادول. إذا تم تجاوز الجرعات المسموح بها، أو إذا تم تناول أدوية أخرى تثبط الأداء الدماغي في نفس الوقت، فمن الممكن أن يحصل تباطؤ في التنفس.
• ضعف العضلات.
• صعوبات أو الألم عند التبول، قلة التبول.

• تشعر بحاجة لتناول الدواء لفترة أطول من الفترة الموصى بها لك.
• تشعر بأنك بحاجة لاستعمال جرعة أعلى من الجرعة الموصى بها.
• تستعمل الدواء لأسباب غير التي تم وصفه لها.
• عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر بالسوء، وتعود لتشعر بحالة جيدة عند تناول الدواء.
• إذا لاحظت أحد الأعراض المذكورة، فمن المهم أن تتحدث مع طبيبك.

• إذا ظهر عرض جانبي، أو تفاعل أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

• **التبليغ عن الأعراض الجانبية**
من الممكن التبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "تقرير عن الأعراض الجانبية" <https://sideeffects.health.gov.il>
• **5. كيف يخزن الدواء؟**
• يجب التمسك به يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد وأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تتسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
• يمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ ترموز) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
• شروط التخزين: احفظه بدرجة حرارة دون 25°C، في العبوة الأصلية.

• إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى
• عموما، إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة إضافية، فليس من المتوقع أن يسبب ذلك أية أعراض سلبية. واصل تناول الجرعة المعتادة كما يجب.
• إذا تناولت أنت (أو أي شخص آخر) كمية كبيرة من ترامادول فلاشتاب دفعة واحدة، فيجب التوجه فوراً للمستشفى للطبيب. احضر عبوة الدواء معك.
• تشمل أعراض الضغط المفرطة صفر حجم حدقات العين، التقيؤ، انخفاض ضغط الدم، نبض قلب سريع، انقباض، فقدان الوعي، نوبات صرع متوالية وصعوبات في التنفس أو تشنج سطحي.

• إذا نسيت تناول الدواء
• إذا نسيت تناول ترامادول فلاشتاب، من المحتمل أن يعود الأداء لا يتأثر لدرجة مضاعفة للتعرض عن الجرعة المعتادة، ببساطة تابع تناول الدواء كما في السابق.
• إذا توقفت عن تناول الدواء
• يُمنع التوقف عن تناول الدواء دفعة واحدة. إذا كنت ترغب بالتوقف عن تناول الدواء، استشر الطبيب أولاً. سيشرح لك كيفية القيام بذلك، بالاعتماد من خلال خفض الجرعة تدريجياً، بحيث تكون أعراض الظلم المزعومة بالحد الأدنى.
• تحصل أعراض الظلم، مثل عدم الراحة، صعوبات النوم، العصبية، انعدام الشهية، الهلع، الشعور بضربات في القلب، ارتفاع ضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، الإسهال، الزجفة أو التعرق، إذا توقفت عن تناول الدواء دفعة واحدة.
• يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.
• حتى إذا طرأ تحسين على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

• **6. معلومات إضافية**
• بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً: Mannitol, crospovidone, aspartame, ethylcellulose, mint rootbeer flavouring, copovidone, silicon dioxide, magnesium stearate
• **كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:**
• قرص دائري، أبيض، مدموع عليه "T" من إحدى الجهتين و- "50" من الجهة الثانية.
• أحجام العبوات المصاحبة عليها: 2، 5، 7، 10، 14، 20، 28، 30، 40، 50، 56، 60، 100 قرص. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.
• رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 132-15-31083-00
• تم تعديريها في شباط 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة من أجل سهولة وتبوير الفراء، من صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. من هذا فالدواء مع كل الكلا الجنسين.

• **المنتجات وصاحب التسجيل: دكسل م.ض.**
• شارع دكسل 1، أور عكيفا 3060000، إسرائيل

• **4. الأعراض الجانبية**
• جميع الأدوية، قد يسبب استعمال ترامادول فلاشتاب أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتدهش عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.
• عليك مراجعة الطبيب فوراً إذا شعرت بأعراض ردة فعل تنحسب مثل انتفاخ الوجه، اللسان والحو الحلق وأو صعوبات في البلع أو الشرى (hives، رضات/كدمات حمراء في الجلد) بالإضافة إلى صعوبات التنفس.
• أعراض جانبية شائعة جدا (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة):
• حالات دوام.
• حالات غثيان.
• أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 100):
• الألم الرأس، نعاس.
• تعب.
• إمساك، جفاف الفم، تقيؤات.

• **كيف أعرف إذا كنت مدمنا؟**
• إذا لاحظت أحد الأعراض التالية خلال فترة تناول ترامادول فلاشتاب، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإدمان:
• عند التوقف عن تناول ترامادول فلاشتاب قد يتم الشعور بأعراض الظلم، والتي تشمل عدم الراحة، صعوبات النوم، الغثيان، حالات الإسهال، الزجفة، التعرق.

• **كيف أعرف إذا كنت مدمنا؟**
• إذا لاحظت أحد الأعراض التالية خلال فترة تناول ترامادول فلاشتاب، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإدمان:

• **الغفام (الإقلاع) عن الدواء:**
• عند التوقف عن تناول ترامادول فلاشتاب قد يتم الشعور بأعراض الظلم، والتي تشمل عدم الراحة، صعوبات النوم، الغثيان، حالات الإسهال، الزجفة، التعرق.

• **كيف أعرف إذا كنت مدمنا؟**
• إذا لاحظت أحد الأعراض التالية خلال فترة تناول ترامادول فلاشتاب، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإدمان:

• **الغفام (الإقلاع) عن الدواء:**
• عند التوقف عن تناول ترامادول فلاشتاب قد يتم الشعور بأعراض الظلم، والتي تشمل عدم الراحة، صعوبات النوم، الغثيان، حالات الإسهال، الزجفة، التعرق.

• **كيف أعرف إذا كنت مدمنا؟**
• إذا لاحظت أحد الأعراض التالية خلال فترة تناول ترامادول فلاشتاب، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإدمان:

• **الغفام (الإقلاع) عن الدواء:**
• عند التوقف عن تناول ترامادول فلاشتاب قد يتم الشعور بأعراض الظلم، والتي تشمل عدم الراحة، صعوبات النوم، الغثيان، حالات الإسهال، الزجفة، التعرق.