

إيموفان

أقراص مطلية 7.5 ملغ

التريكيب:

يحتوي كل قرص على: زوبيكلون 7.5 ملغ Zopiclone 7.5 mg
لمعلومات عن المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتدبير حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء للعلاج من ألكل. لا تعطيه للأطفال. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إيموفان مخصص لمعالجة الحالات التالية من اضطرابات النوم الشديدة:
أ. الأرق المؤقت. ب. الأرق قصير الأمد.

الفصيلة العلاجية: منوم ومخدر من مجموعة سيكلوبيروليبات.

2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الرجحي) لـ زوبيكلون أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6). علامات رد الفعل التحسسي تشمل: طفح، مشاكل في البلع أو التنفس، انتفاخ في الشفتين، الوجه، والحنجرة أو اللسان.
- كنت تعاني من مشكلة تسبب غشلي شديد (وهن غشلي وديل).
- كنت تعاني من مشكلة في الأداء الوظيفي للرتين (قصور تنفسي).
- كنت تعاني من مشكلة تتوقف عن أعقابها عن التنفس لفترات قصيرة من الزمن أثناء الليل (توقف التنفس أثناء النوم).
- كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد.
- كنت ما دون عمر 18 سنة. لم تُحدد بعد سلامة وفعالية إيموفان لدى الأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.
- قاسيت في الماضي من السير خلال النوم أو من أي سلوك شاذ آخر حينما لا تكون يقظا بشكل تام بعد تناول إيموفان (مثل السباحة، تناول الطعام، إجراء مكالمة هاتفية أو ممارسة علاقات جنسية وإلى آخره).

لا تتناول هذا الدواء إذا كانت إحدى الحالات التي ذكرت سابقاً تنطبق عليك. إذا لم تكن واثقا، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول إيموفان.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بـ إيموفان، تأكد أنك طبيبك إن:
• كنت تعاني من أية مشاكل في الكبد (انظر أيضا الفقرة "لا يجوز استعمال الدواء إذا").
• من الجائز أن يضطر الطبيب أن يصف لك مقدارا دوائيا مُخفّضا من إيموفان.

• كنت تعاني من أية مشاكل في الكلى. من الجائز أن يضطر الطبيب أن يصف لك مقدارا دوائيا مُخفّضا من إيموفان.

• كنت تعاني من مشاكل بسيطة في التنفس. يقرر الطبيب فيما إذا توجب عليك تلقي إيموفان (انظر أيضا الفقرة "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

• وُجد لديك في الماضي اضطراب نفسي (بما في ذلك الإكتئاب واضطراب في الشخصية) أو أسباب استعمال أو تعاطت بالكحول أو المخدرات.

• استعملت مؤخرا إيموفان أو أدوية أخرى مشابهة لفترة أكثر من 4 أسابيع. إن استعمال إيموفان قد يؤدي إلى تطور إساءة الإستعمال و/أو التعاطق السديسي والنفسي. تزداد خطورة التعلق مع المقادير الدوائية مع مدة العلاج وتكون أكبر عندما يتم استعمال إيموفان لأكثر من 4 أسابيع، ولدى متعاطليهم لديهم سابقة لإضطرابات نفسية و/أو إساءة استعمال الكحول. المواد غير القانونية و/أو المخدرات. صعوبات في التنفس، صعوبات في الحركة وقد تظهر إذا تم تناول إيموفان سوية مع مستحضرات أفيونية المفعول. إن استعمال إيموفان ومستحضرات أفيونية المفعول بالتزامن يتسبب في فقدان القدرة على التفكير والتناولها وإحرص على التيقظ بلغ طبيبك عن كافة الأدوية أفيونية المفعول التي تتناولها وإحرص على التيقظ بتوصيات الطبيب فيما يتعلق بالمقدار الدوائي.

• الدواء غير مخصص لمعالجة الإكتئاب.

لقد أظهرت عدة أبحاث عن وجود خطورة زائدة لأفكار إنتحارية، محاولة الإنتحار و الإنتحار لدى المتعاطلين الذين يتناولون أدوية معينة للتهدئة وأدوية لمعالجة مشاكل النوم، بما في ذلك الدواء، لكن، لم يُحدد فيما إذا نجم ذلك عن الدواء أو من الجائز أن هناك سببا آخرى. إذا وُجدت لديك أفكار إنتحارية، راجع طبيبك بأسرع ما يمكن لتلقي استشارة طبية إضافية.

قبل تناول إيموفان، من المهم التأكد من أنه باستطاعتك النوم على الأقل 7 حتى 8 ساعات من النوم المتواصل، وذلك لمساعدتك على تقليل خطورة حدوث أعراض جانبية معينة (انظر الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية").

قد يؤدي إيموفان إلى السير خلال النوم أو إلى سلوك شاذ آخر (مثل السباحة، تناول الطعام، إجراء مكالمة هاتفية أو ممارسة العلاقات الجنسية وإلى آخره) حينما لا تكون يقظا بشكل تام. في صباح اليوم التالي، من الجائز ألا تتذكر بأنك فعلت شيئا خلال الليل. هذه المشاطات من شأنها أن تحدث سواء كنت أو لم تكن تشرب الكحول أو تتناول أدوية أخرى تسبب لك التعاس سوية مع إيموفان. إذا كنت تقاسي من إحدى تلك الأعراض، فتوقف عن العلاج بـ إيموفان فوراً واتصل بالطبيب أو بفر من الطاقم الطبي الخاص بك.

إذا لم تكن واثقا فيما إذا كانت إحدى الحالات السابقة تنطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول إيموفان.

الأطفال والمراهقون:

هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمراهقين ما دون عمر 18 سنة.

الفحوص والمتابعة:

إيموفان قد يُغيّر من نسب إنزيمات الكبد التي تظهر في فحوص الدم. قد يدل هذا الأمر على خلل في الأداء الوظيفي للكبد لدى.

إذا كنت مقبلا على إجراء فحوص الدم، من المهم إبلاغ طبيبك بأنك تتناول إيموفان.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، إذا استعملت مؤخرا، أو إذا من شأنك أن تستعمل أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إكح للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. وذلك لأن إيموفان قد يؤثر على عمل أدوية معينة أخرى. كما أن، بعض الأدوية قد تؤثر على عمل إيموفان بالأخص إذا كنت تستعمل:

إيموفان قد يزيد من تأثير الأدوية التالية:

- أدوية لمعالجة الأمراض النفسية (الأدوية المضادة للذهان)
- أدوية لمعالجة الإكتئاب
- أدوية لمعالجة داء الصرع (مضادات الإختلاج)
- الأدوية المستعملة في العمليات الجراحية (أدوية التخدير)
- الأدوية المهدئة أو التي تقلل من القلق أو أدوية لمعالجة مشاكل النوم (الأدوية ذات التأثير المنوم)
- أدوية لمعالجة الحمى، العلف، الطبخ، أو الحساسيات الأخرى، التي قد تسبب لك النعاس (مضادات الهيستامين منومة) مثل كلورفينامين أو بريميتازين
- أدوية معينة لتسكين الألم المتوسط حتى الشديد (مسكنات الألم المخدرة) مثل كودئين، ميتادون، مورفين، أو أكسيكودون، بتيدين أو ترامادول
- الأدوية التالية قد تزيد من احتمال حدوث أعراض جانبية إذا تم تناولها سوية مع إيموفان. لتقليل احتمال حصول ذلك، من الجائز أن يقرر طبيبك على تخفيض المقدار الدوائي من إيموفان الذي تتناوله:
- مضادات حيوية معينة مثل كلاريفاميسين أو إريثروميسين
- أدوية معينة لمعالجة التلوثات الفطرية مثل كيتوكونازول وإيتراكونازول
- ريتوناير (من فصيلة مثبطات الـ بروتياز) لمعالجة ثلوث HIV
- إن استعمال إيموفان بالتزامن مع مستحضرات أفيونية المفعول يزيد من خطورة حدوث نعاس، صعوبات في التنفس، سبات الوفاة. إحرص على التيقظ بإرشادات طبيبك فيما يتعلق بالمقدار الدوائي.

الأدوية التالية قد تقلل من تأثير إيموفان:

- أدوية معينة لمعالجة الصرع مثل كارامازيبين، فينوباربيتال أو فينيوتوين
- ريفاميسين (مضاد حيوي) - لمعالجة التلوثات
- St. John's wort (دواء من منشأ نباتي) - لمعالجة تغيرات الحالة النفسية والإكتئاب

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب الكحول خلال فترة استعمال إيموفان. الكحول قد يزيد من تأثير إيموفان وأن يسبب لك نوما عميقا جدا، بحيث تنتفس بشكل غير سليم أو أن تعاني من صعوبة في الإستيقاظ.

الحمل والإرضاع:

لا يوصى بإستعمال إيموفان خلال فترة الحمل. إستشير طبيبك قبل تناول الدواء إذا كنت في فترة الحمل. متعديين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخطئين للحمل. إذا تم إستعماله خلال فترة الحمل فهناك خطورة أن يتأثر الجنين من ذلك. لقد أظهرت عدة أبحاث على أنه من الجائز أن تحصل زيادة في خطورة حدوث شق في الشفة والحنك (يسمى أحيانا "شفة الأرنب") لدى المولود.

قد يحدث أيضا تناقص في الحركة وتغيرات بنظم القلب لدى الجنين بعد تناول إيموفان خلال الثلث الثاني وأو الثالث من الحمل.

إذا تم تناول إيموفان في نهاية الحمل أو خلال الولادة، فقد يبدي رضيعك ضعف في العضلات، تناقص في حرارة الجسم، صعوبة في الإطعام ومشاكل في التنفس (تنبيب تنفسي).

في حال تناول هذا الدواء بشكل دائم في مراحل الحمل المتأخرة، فقد يتطور لدى جنينك تعلق جسدي وقد يكون معرضا لخطورة لتطور أعراض الفطام مثل عصبية أو رجفان. في مثل هذه الحالة يجب مراقبة المولود بشكل حثيث خلال الفترة التي تلي الولادة.

الإرضاع

لا يجوز تناول إيموفان إذا كنت في فترة الرضاعة أو تخطئين للإرضاع. وذلك لأن كميات ضئيلة قد تنتقل إلى حليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تخطئين للإرضاع، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، فيجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال أي دواء.

السياقة وإستعمال الماكينات:

بالمشابه للأدوية الأخرى التي تستعمل لمشاكل النوم، إيموفان قد يؤدي لتباطؤ الأداء الوظيفي السليم للمخ (تنبيب الجهاز العصبي المركزي).

إن خطورة حدوث تضرر نفسي حركي بما في ذلك تضرر القدرة على السياقة، تزداد إذا:

- كنت تقوم بنشاطات تتطلب منك اليقظة خلال 12 ساعة من تناول إيموفان
- كنت تتناول مقدارا دوائيا أكبر من المقدر الدوائي الموصى به من إيموفان
- كنت تتناول إيموفان في أثناء تناولك حاليا لدواء آخر يُنبت الجهاز العصبي المركزي أو لدواء آخر يرفع من نسب إيموفان بدمك، أو في أثناء شرب الكحول
- لا يجوز الإشتغال بششاطات خطيرة التي تتطلب اليقظة التامة، مثل السياقة أو تشغيل الماكينات بعد تناول إيموفان، وخاصة، خلال 12 ساعة التي تلي تناول الدواء.

الحصول على معلومات إضافية حول الأعراض الجانبية المحتملة التي قد تؤثر على قدرتك على السياقة، أنظر الفقرة 4 من هذه النشرة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- يحتوي إيموفان على:
- **لكثون:** يعتبر هذا نوع من السكر. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه للطبيب قبل بدء إستعمال هذا الدواء.
- **صوديوم:** يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم (23 ملغ) صوديوم في القرص، أي أنه فعليا "خال من الصوديوم".
- **جلوتين:** يحتوي هذا الدواء فقط على نسب منخفضة جدا من الجلوتين (من نشاء الحنطة) وهذالك احتمالية منخفضة جدا بأن يؤدي إلى مشاكل إذا كنت مريض سيلياك celiac. إذا وُجدت لديك حساسية للحنطة (التي تختلف عن مرض السيلياك)، فلا تتناول هذا الدواء.
- يحتوي هذا الدواء على واحد ليس أكثر من 6 ميكروغرام جلوتين.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب أن يكون العلاج قصيراً ما أمكن وألا يزيد عن 4 أسابيع (بما في ذلك مرحلة التوقف عن العلاج).

يجب إستعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيحاء من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الكبان:

المقدار الدوائي الإعتيادي هو قرص واحد من إيموفان (7.5 ملغ) حلاً قبل النوم.

المسنون:

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو نصف قرص (3.75 ملغ) حلاً قبل النوم.

من الجائز أن يتم رفع المقدار الدوائي في السباق، بحسب الحاجة.

يجب الحذر والإستناد أثناء النهوض من الفراش!

الأطفال والمرهقون:

إيموفان غير مخصص للإستعمال لدى الأطفال والمرهقين ما دون عمر 18 سنة. تم تحديد بعد نجااعة وسلامة إيموفان لدى الأطفال والمرهقين دون عمر 18 سنة.

المتعاجون لديهم المئين مثل الكبد، في التنفس أو في الكلى: المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو نصف قرص (3.75 ملغ) حلاً قبل النوم. لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

فترة العلاج:

فترة العلاج الموصى بها هي يومين حتى 3 أسابيع.

شكل الإعطاء:

- يجب بلع الدواء مع الماء.
- لا يجوز تقطيع أو مضغ الأقراص.
- بالإمكان شطر القرص إذا تطلب الأمر مقداراً دوائياً منخفضاً قدره 3.75 ملغ.
- يجب تناول المقدار الدوائي المطلوب من إيموفان دفعة واحدة ولا يجوز تناول جرعة إضافية بنفس الليلة.
- يجب تناول المستحضر عندما تكون في الفراش، حلاً قبل النوم، والتأكد من أنه يمكنك النوم 7 - 8 ساعات من دون إنزعاج.
- إذا تناولت مقدراً دوائياً أكبر أو إذا بلغ طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حلاً إلى الطبيب أو للمستشفى وأحضر معك علبة الدواء.
- إن تناول جرعة مفرطة من إيموفان هو خطير جداً. فأنت قد تعاني من الأعراض التالية: الشعور بنعاس، إرتباك، نوم عميق لا بل إمكانية حدوث سبات إرتعاش العضلات (قلّة التوتر)
- الشعور بدوار، بضيائية أو إغماء، هذه الأعراض هي جراء إنخفاض ضغط الدم.
- سقوطات أو فقدان التوازن (ترنح)
- تنفس سطحي أو صعوبات في التنفس (تثبيط تنفسي)

إذا نسيت تناول الدواء:

يجب تناول إيموفان حلاً قبل النوم فقط. إذا نسيت تناول الدواء حلاً قبل النوم، فلا يجوز تناول الدواء في أي وقت آخر. ولا فأت قد تشعر بنعاس، دوار، وإرتباك خلال اليوم.

لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعتين سوية عوضاً عن المقدار الدوائي المنسي!

في حال توقفك عن تناول الدواء:

يجب مواصلة تناول إيموفان إلى أن يبلغك طبيبك بالتوقف. لا تتوقف عن تناول إيموفان بشكل مفاجئ، لكن بلغ طبيبك إذا كنت ترغب بالتوقف عن العلاج. يرشك طبيبك كيف يتوجب عليك التوقف عن العلاج.

في حال توقفك عن العلاج بـ إيموفان بشكل مفاجئ، فإن مشاكل النوم قد تعود لديك، وأنت قد تعاني من "أعراض القمام".

إذا حدثت هذه الحالة، فأنت قد تعاني من بعض الأعراض المُفصّلة لاحقاً.

يجب التوجه حلاً إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أي عرض من الأعراض التالية:

- الشعور بقلّة نيت، غيبوبة، عصبية، هياج، إرتباك أو لديك نوبات من القلق
- ترقق
- صداع
- ضربات قلب أسرع أو غير منتظمة (خفقان)
- تدني مستوى اليقظة ومشاكل في القدرة على التركيز أو التركيز
- كوابيس ليلية، رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هذيان)
- حساسية زائدة عن المعتاد للضوء، للضجيج واللمس

● خلل في إدراك الواقع

● خدر والشعور بوخز في اليدين وفي راحتي القدمين

● آلام عضلية

● مشاكل في البطن

قد تظهر أيضاً في حالات نادرة تشنجات (إختلاجات).

لا يجوز تناول الأدوية في العمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع الإنطارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيموفان قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين.

لا تتدهس من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حلاً إلى الطبيب أو إلى المستشفى إذا:

- كنت تعاني من رد فعل تحسسي لـ إيموفان. العلامات يمكن أن تشمل: طفح،

مشاكل في البلع أو التنفس، إنتفاخ في الشفتين، الوجه، الحنجرة أو اللسان.

يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعاني من أي عرض

من الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية نادرة (rare)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- تضرر الناكرة منذ تناول إيموفان (نسيان). يمكنك تقليل احتمال حدوث هذا

العرض، في حال تأكد من أنه يمكنك النوم 7-8 ساعات بشكل متواصل من

دون إنزعاج بعد تناول إيموفان.

- رؤية أو سماع أشياء غير حقيقية (هذيان)

- سقوطات، بالأخص لدى المسنونين

أعراض جانبية ذات شيع غير معروف (أعراض لم يُحدد بعد شيعوها):

- أفكار عن أشياء غير حقيقية (أوهام)

- الشعور بإحباط أو حزن (تدني الحالة النفسية)

يجب مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقم أو إستمر أي عرض من الأعراض

الجانبية التالية لأكثر من عدة أيام:

أعراض جانبية شائعة (common)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من

بين 100:

- طعم قليل المرارة أو معدني في الفم أو جفاف الفم

- الشعور بنعاس أو الغم أو الميل للنوم

- جفاف الفم

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين

من بين 1,000:

- غثبان أو تقيؤ

- الشعور بدوخة أو نعاس

- صداع

- كوابيس

- الشعور بإرهاق جسدي أو نفسي

- عصبية

أعراض جانبية نادرة (rare)، أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- الشعور بإرتباك

- طفح حاك، درنات (شرى)

- الشعور بعصبية أو عدوانية

- تناقص الرغبة الجنسية

- صعوبة في التنفس أو ضيق تنفس

أعراض جانبية ذات شيع غير معروف (أعراض لم يُحدد بعد شيعوها):

- الشعور بقلّة راحة أو غضب

- الشعور بدوار أو مشاكل في التنسيق

- إزدواج الرؤية

- حركة غير ثابتة أو متأرجحة

- ضعف العضلات

- إضطراب في الهضم

- تطور تعلق بـ إيموفان

- تباطؤ التنفس (تثبيط تنفسي)

شعور غير عادي في الجلد مثل خدر، وخز، نخز، إكتواء أو تنمل (paresthesia)

- مشاكل ذهنية مثل تضرر الذاكرة

- صعوبة التركيز

- إضطراب في النطق

قد يؤدي إيموفان إلى السير خلال النوم أو إلى سلوك شاذ آخر (مثل السياقة، تناول الطعام، إجراء مكالمات هاتفية أو ممارسة العلاقات الجنسية وإلى آخره)

حيماً لا تكون يقظاً بشكل تام.

إذا ظهر عرض جانبي، أو تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما

تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط

لتبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية

لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر

للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال والأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على

ظهر العلبة، يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية.

لا ترمي أي دواء في مياه الصرف الصحي أو في القمامة المنزلية.

إسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد بعد قيد الإستعمال.

تساع هذه الخطوات في الحفاظ على جودة البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للعامة أيضاً:

لكثور (يحتوي كل قرص على 31.575 ملغ لكثور مونو هيدرات) و آثار من

الجلوتين (يحتوي كل قرص على 60 ملغ نشاء حنطة).

Wheat starch; Calcium hydrogen phosphate dihydrate; Lactose

monohydrate; Hypromellose; Sodium starch glycolate type A;

Titanium dioxide; Macrogol 6000; Magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أقراص إيموفان هي عبارة عن أقراص مطلية، بيضاء، بيضوية الشكل، عليها خط

للشطر من جانب واحد.

حجم العلبة: 14، 20 قرصاً. من الجائز ألا تتسوّ كافة أحجام العلب.

هذه النشرة لا تشمل كافة المعلومات عن المستحضر. إذا توفرت لديك أية

أسئلة أو إذا لم تكن واثقاً من أمر ما، الرجاء مراجعة الطبيب.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي - أفنتيس إسرائيل م.ض. شارع

بني جاونون 10، נתانيا.

تم إعدادهما في آذار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

1011924581.

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.

على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.