

كيقزارا 150 ملغ

محلول للحقن ضمن قلم / محقنة
جاهز / ة للإستعمال

كيقزارا 200 ملغ

محلول للحقن ضمن قلم / محقنة
جاهز / ة للإستعمال

المادة الفعالة:

كيقزارا 150 ملغ - كل قلم / محقنة جاهز / ة للإستعمال يحتوي /
تحتوي على 150 ملغ ساريلوماب بـ 1.14 ملل
(Sarilumab 131.6 mg/ml)

كيقزارا 200 ملغ - كل قلم / محقنة جاهز / ة للإستعمال يحتوي /
تحتوي على 200 ملغ ساريلوماب بـ 1.14 ملل
(Sarilumab 175 mg/ml)

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

إحفظ هذه النشرة. من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية. تحتوي
هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك
أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم
حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر كيقزارا بطاقة
معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على
معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل
بدء العلاج وخلال فترة العلاج بـ كيقزارا والتصريف وفتحها.
يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج والنشرة
للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ
البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

1) لأي غرض مخصص كيقزارا؟

يستعمل كيقزارا للعلاج لدى الكبار الذين يعانون من إتهاب
المفاصل الروماتيزمي النشط بدرجة متوسطة حتى شديدة
إذا كان علاجاً سابقاً لم يعمل بشكل كاف أو لم يكن بالإمكان
تحمله. بالإمكان إستعمال كيقزارا لوحده أو بمشاركة دواء
يسمى ميتوتريكسات.

الفصيلة العلاجية

يحتوي كيقزارا على المادة الفعالة ساريلوماب التي تعتبر بروتين
حيث يسمى ضد وحيد النسيلة. يرتبط كيقزارا بروتين إضافي
يسمى مستقبل IL-6 (IL-6) ويعيق عمله.

للبروتين IL-6 دور مركزي في التسبب بأعراض إتهاب المفاصل
الروماتيزمي، مثل ألم، انتفاخ في المفاصل، التصلب الصباحي
والإرهاق.

2) قبل إستعمال الدواء

✘ لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (اليرجي) لساريلوماب أو لأحد المركبات
الأخرى التي يحتويها كيقزارا (انظر الفقرة 6).
- إذا وجد لديك تلوث نشط وخطير.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ كيقزارا إحك للطبيب إذا:

- وجد لديك أي تلوث أو ميل للعدوى بتلوثات عديدة. قد يضعف
كيقزارا من قدرة جسمك على محاربة التلوثات: أي، أنك قد
تصاب بتلوثات بسهولة بالغة وقد يتفاقم تلوث حالي.
- كنت تعاني من السلس، أعراض السلس (سعال متواصل، تناقص
الوزن، لا مبالاة، سخونة طفيفة) أو كنت على تماس قريب من
شخص مريض بالسلس. قبل تلقيك كيقزارا، يجري لك طبيبك
فحوص لوجود مرض السلس.
- وجد لديك يرقان فيروسي أو مرض كبدي آخر. قبل إستعمال
كيقزارا، يجري لك الطبيب فحص دم لوظائف الكبد.
- وجد لديك إتهاب في الرتج (diverticulitis، في الأمعاء)، أو
تقرحات في المعدة أو في الأمعاء، أو تطورت لديك أعراض
مثل سخونة وألم في البطن (المعدة) لا يزول.

- وجد لديك ذات مرة سرطان من أي نوع كان.

- تلقيت لقاحاً في الآونة الأخيرة أو كنت مقبلاً على تلقي
لقاح.

إذا كان واحد من البنود المذكورة سابقاً يخصك (أو إذا لم تكن
واثقاً من ذلك)، توجه إلى الطبيب قبل إستعمال كيقزارا.

الأطفال والمراهقون

كيقزارا غير مخصص للأطفال والمراهقين دون عمر
18 سنة.

الفحوص والمتابعة

عليك إجتياز فحوص الدم، قبل العلاج بـ كيقزارا وخلالها. وذلك
بهدف تقصي وجود تعداد منخفض للدم، مشاكل في الكبد أو
تغيرات في نسب الكولسترول لديك.

الأدوية الأخرى و كيقزارا

إحك للطبيب أو للصيدلي إذا كنت تستعمل، إستعملت مؤخراً
أو تنوي إستعمال أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون
وصفة طبية وإضافات غذائية. وذلك لأن كيقزارا قد يؤثر
على طريقة عمل أدوية أخرى، وكذلك فإن أدوية أخرى قد تؤثر
على طريقة عمل كيقزارا.

لا تستعمل كيقزارا وأخبر طبيبك أو الصيدلي خاصة إذا كنت
تستعمل:

- مجموعة أدوية تسمى مثبطات جانوس كيناز (مثبطات JAK)،
تستعمل لعلاج الإتهاب المفاصل الروماتيزمي أو السرطان.

- أدوية بيولوجية أخرى تستعمل لعلاج الإتهاب المفاصل
الروماتيزمي.

قد يؤثر كيقزارا على طريقة عمل أدوية معينة: أي، من الجائز
أن يحتاج الأمر إلى تغيير المقدار الدوائي للأدوية الإضافية
التي تستعملها. إذا كنت تستعمل واحد من الأدوية التالية، أخبر
الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال كيقزارا:

- ستاتينات - تعطى لتخفيض نسب الكولسترول.

- أقراص منع الحمل.

- تيوفيلين - يستعمل لعلاج الربو.

- وارفارين - يعطى لمنع تشكل الخثرات الدموية.

إذا إنطبقت عليك إحدى البنود المذكورة أعلاه (أو إذا لم تكن واثقاً
من ذلك)، راجع الطبيب أو الصيدلي.

الحمل والإرضاع

أخبري طبيبك قبل إستعمال كيقزارا، إذا كنت في فترة الحمل أو
الرضاعة، تعتمدين بانك حامل أو تخططين للحمل.

• لا يجوز إستعمال كيقزارا إذا كنت في فترة الحمل، إلا إذا
أوصاك الطبيب بذلك صراحة.

• إن تأثيرات كيقزارا على الجنين غير معروفة.

• يتوجب عليك وعلى طبيبك أن تقررا فيما إذا عليك إستعمال
كيقزارا في حال كنت مرضعة.

السياقة وإستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثر إستعمال كيقزارا على قدرتك على
السياقة أو إستعمال الماكينات. مع ذلك، إذا شعرت بإرهاق أو إذا
شعرت بسوء، بعد إستعمال كيقزارا، فلا تقم بالسياقة ولا تشغل
الماكينات.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

إن العلاج بـ كيقزارا هو بتوصية طبيب خبير في تشخيص وعلاج
الإتهاب المفاصل الروماتيزمي.

دائماً يجب إستعمال كيقزارا بحسب توصية الطبيب بالضبط.
عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً
بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

يعطى كيقزارا بالحقن تحت الجلد (حقنة تحت الجلد).
المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
المقدار الدوائي الاعتيادي هو عادة حقنة واحدة ذات 200 ملغ،
كل أسبوعين.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

من شأن الطبيب أن يلائم المقدار الدوائي من الدواء، وفقاً لنتائج
فحوص الدم لديك. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية
الطبيب.

كيفية إستعمال القلم أو المحقنة الجاهز / ة للإستعمال

- يريك الطبيب، الصيدلي أو الممرضة كيف تحقن كيقزارا. بعد
تلقي تلك الإرشادات، بالإمكان حقن كيقزارا ذاتياً أو بمساعدة
معالج.

- تابع بحذر "تعليمات الإستعمال" المرفقة للعبوة.

- إستعمل القلم أو المحقنة الجاهز / ة للإستعمال، بالضبط كما
هو موصوف في "تعليمات الإستعمال".

إذا إستعملت أكثر مما هو مطلوب من كيفزارا

إذا إستعملت أكثر مما هو مطلوب من كيفزارا، أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالا إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت حقن مقدار دوائني من كيفزارا

إذا مرت 3 أيام أو أقل منذ نسيان المقدار الدوائي:

- إحقن المقدار الدوائي المنسي لحظة إستطاعتك بذلك.
- بعد ذلك، إحقن المقدار الدوائي التالي بموجب جدول الأوقات الإعتيادي الخاص بك.

إذا مرت 4 أيام أو أكثر، فقم بحقن المقدار الدوائي التالي بموجب جدول الأوقات الإعتيادي الخاص بك. لا يجوز حقن مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي المنسي.

إذا لم تكن واثقا متى تحقن المقدار الدوائي التالي الخاص بك، توجه للطبيب، الصيدلي أو الممرضة لتتلقى إرشاداتهم.

إذا توقفت عن إستعمال كيفزارا

لا يجوز التوقف عن إستعمال كيفزارا بدون إستشارة الطبيب. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كيفزارا قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيا منها.

أعراض جانبية خطيرة

توجه لطبيبك حالا إذا كنت تعتقد بأن لديك **توتوث** (من شأنه أن يظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص). الأعراض (العلامات) من شأنها أن تشمل سخونة، تعرق أو قشعريرة.

أعراض جانبية إضافية

توجه لطبيبك، للصيدلي أو للممرضة إذا لاحظت أية عرض جانبي من الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة)

- تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء في فحوص الدم
- أعراض جانبية شائعة** (أعراض تظهر لدى حتى 1 من 10 مستعملين)
 - التهابات في الجيوب الأنفية أو الحنجرة، رشح أو إنسداد الأنف وآلم في الحنجرة (إلتهاب في الطرق التنفسية العلوية)
 - إلتهاب في المسالك البولية
 - قروح البرد (هربس الفم)
 - تعداد منخفض للصفائح الدموية في فحوص الدم
 - إرتفاع الكوليسترول، إرتفاع الشحوم الثلاثية في فحوص الدم
 - عدم سلامة فحوص وظائف الكبد
 - ردود فعل في مكان الحقن (بما في ذلك إحمرار وحكة)

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من 100 مستعمل)

- توتوث في الرئتين
- إلتهاب في النسيج الجلدي العميق
- إلتهاب الرتج (Diverticulitis) - مرض يؤثر على الأمعاء، يترافق في أحيان متقاربة بالعم في البطن، غثيان وتقيؤ، سخونة، إمساك، أو بشكل أقل شيوعاً بإسهالات.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى حتى 1 من 1000 مستعمل)

- إنتناب في المعدة أو في الأمعاء (تقب الذي يتطور في جدار الأمعاء)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسميم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العلبة والقلم/المحقنة.

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

خزن في البراد (2-8 درجات مئوية).

- لا يجوز تجميد أو تسخين القلم/المحقنة.
- إذا قمت بإخراج الدواء من البراد، لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية.
- دُونَ تاريخ الإخراج من البراد في المكان المخصص لذلك على العلبة الخارجية.
- يجب إستعمال القلم/المحقنة خلال 14 يوماً من لحظة الإخراج من البراد ولا يجوز إعادته/إعادتها إلى البراد.
- خزن القلم/المحقنة في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كان المحلول في القلم/المحقنة عكراً، يبدو بلون مختلف أو يحوي جزيئات، أو إذا بدأ أحد أجزاء القلم أو المحقنة الجاهزة/ة للإستعمال ليس سليماً.

بعد الإستعمال، إرم القلم أو المحقنة في وعاء مقاوم للإنتقاب. دائماً إحفظ الوعاء بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال. إسال الطبيب، الصيدلي أو الممرضة عن كيفية التخلص من الوعاء. لا تعاود إستعمال الوعاء.

لا يجوز رمي الأدوية في القمامة المنزلية أو في المجاري المنزلية. إسال الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد بحاجتها بعد. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً المواد غير الفعالة التالية:

Sucrose (57 mg), L-arginine hydrochloride, L-histidine, polysorbate 20, and water for injections.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة:

كيفزارا عبارة عن محلول رائق، عديم اللون حتى مائل للون الأصفر الشاحب، مخصص للحقن ويتوفر ضمن قلم أو محقنة جاهز/ة جاهزة للإستعمال.

كيفزارا 150 ملغ: كل قلم أو محقنة جاهز/ة للإستعمال يحتوي/تحتوي على 1.14 ملل محلول ويحرق/تحرر مقدار دوائي واحد ذو 150 ملغ. يتوفر المنتج ضمن علبة تحتوي على 2 أو 6 أقلام/محاقن جاهزة للإستعمال. ليست كافة أحجام العلب مسوّقة.

كيفزارا 200 ملغ: كل قلم أو محقنة جاهز/ة للإستعمال يحتوي/تحتوي على 1.14 ملل محلول ويحرق/تحرر مقدار دوائي واحد ذو 200 ملغ. يتوفر المنتج ضمن علبة تحتوي على 2 أو 6 أقلام/محاقن جاهزة للإستعمال. ليست كافة أحجام العلب مسوّقة.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه: سانوفي - أفنتيس إسرائيل م.ض، شارع بني جاؤون 10، نتانيا.

لا تحتوي هذه النشرة على كافة المعلومات عن المستحضرات. إذا توفر لديك أي سؤال أو لم تكن واثقا بخصوص أمر ما، الرجاء توجه للطبيب.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

كيفزارا 150 ملغ: 00-35260-37-160


كيفزارا 200 ملغ: 00-35261-38-160

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في كانون الأول 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

אجزاء القلم الجاهز لإستعمال كيقفزارا، تظهر في الصورة لשימוש كقبزרה، مוצגים בתמונה הבאה: חלקי העט המוכן

קבוצה 150 מ"ג תמיסה להזרקה
 בעט מוכן לשימוש
 סרילומאב 131.6 מ"ג/מ"ל
 קיפזארא 150 מ"ג מחلول للحقن
 ضمن قلم جاهز للإستعمال
 ساريلومات 131.6 مل/م
 تعليمات الإستعمال



תווית מלصقة

חלון נאפדה

כיסוי מחט צהוב גطاء לאפרה

מכסה גطاء

מידע חשוב
 התכשיר הינו עט מוכן לשימוש חד פעמי (מכונה "עט" בהוראות השימוש), המכיל 150 מ"ג של קבזרה להזרקה מתחת לעור (זריקה תת עורית) אחת לשבועיים. בקש מהצוות הרפואי שלך, להראות לך מהי הדרך הנכונה להשתמש בעט, לפני ההזרקה הראשונה שלך.

עשה:

- ✓ קרא את כל ההוראות בעיון לפני השימוש בעט.
- ✓ ודא שברשותך התרופה הנכונה במינון הנכון.
- ✓ שמור עטים שאינם בשימוש באריזה המקורית במקרר, בטמפרטורה שבין 2°C-8°C.
- ✓ שמור את האריזה בתיק מבודד עם אריזת קרחון, בזמן נסיעה.
- ✓ אפשר לעט להגיע לטמפרטורת החדר במשך לפחות 60 דקות לפני השימוש.
- ✓ השתמש בעט תוך 14 ימים מרגע הוצאתו מהמקרר.
- ✓ שמור את העט הרחוק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.

אל תעשה:

- ✗ אל תשתמש בעט אם הוא ניזוק או אם המכסה חסר או איננו מחובר.
- ✗ אל תסיר את המכסה לפני שאתה מוכן להזריק.
- ✗ אין ללחוץ או לגעת בכיסוי המחט הצהוב, עם האצבעות שלך.
- ✗ אל תנסה להחזיר את המכסה חזרה לעט.
- ✗ אל תעשה שימוש חוזר בעט.
- ✗ אין להקפיא את העט.
- ✗ מרגע הוצאה מהמקרר, אל תאחסן את העט מעל ל-25°C.
- ✗ אין להחזיר את העט לקירור לאחר הוצאתו מהמקרר.
- ✗ אל תחשוף את העט לאור שמש ישיר.
- ✗ אל תזריק דרך הבגדים שלך.

בכל שאלה נוספת, שאל את הרופא שלך, הרוקח או האחור.

מعلومات هامة

המستحضر عبارة عن قلم جاهز للإستعمال لمرة واحدة (يسمى "قلم" في تعليمات الإستعمال), يحتوي على 150 ملغ كيقفزارا للحقن تحت الجلد (حقنة تحت الجلد) مرة واحدة كل أسبوعين.

أطلب من الطاقم الطبي الخاص بك، أن يريك ما هي الطريقة الصحيحة لإستعمال القلم، قبل عملية الحقن الأولى الخاصة بك.

إفعل:

- ✓ اقرأ كافة التعليمات بتمعن قبل إستعمال القلم.
- ✓ تأكد من أنه بحوزتك الدواء الصحيح بالمقدار الدوائي الصحيح.
- ✓ إحتفظ الأرقام غير المستعملة في العبوة الأصلية في البراد، بدرجة حرارة ما بين 2-8 درجات مئوية.
- ✓ إحتفظ العبوة ضمن حقيبة منفردة تحتوي عبوة جليد، خلال السفر.
- ✓ دع القلم يبلغ درجة حرارة الغرفة لمدة 60 دقيقة على الأقل قبل الإستعمال.
- ✓ إستعمل القلم خلال 14 يوماً من لحظة إخراجها من البراد.
- ✓ إحتفظ القلم بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.

لا تفعل:

- ✗ لا تستعمل القلم إذا تضرر أو إذا كان الغطاء ناقصاً أو غير موصولاً.
- ✗ لا تنزع الغطاء قبل أن تكون جاهزاً للحقن.
- ✗ لا تضغط أو تلمس الغطاء الأصفر للإبرة، بواسطة أصابعك.
- ✗ لا تحاول إعادة الغطاء ثانية إلى القلم.
- ✗ لا تعاود إستعمال القلم.
- ✗ لا يجوز تجميد القلم.
- ✗ من لحظة الإخراج من البراد، لا تخزن القلم بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية.
- ✗ لا يجوز إعادة القلم إلى البراد بعد إخراجها من البراد.
- ✗ لا تعرض القلم لضوء الشمس المباشر.
- ✗ لا تحقن عبر الملابس الخاصة بك.

بخصوص أي سؤال إضافي، إسأل طبيبك، الصيدلي أو الممرضة.

שלב א': הכנה להזרקה - المرحلة أ: التحضير للحقن


- 1 **הכן את כל הציוד שתזדקק לו, על גבי משטח עבודה נקי ושטוח.**
 - ודא שברשותך פד אלכוהול, כדור צמר גפן או גזה ומיכל עמיד לניקוב.
 - הוצא עט אחד מהאריזה על ידי אחיזה באמצע גוף העט. שמור את העט הנוותר באריזה, במקרר.
- 1 **חצר كافة المععدات التي تحتاجها, على سطح عمل نظيف ومستوي.**
 - تأكد من أن بحوزتك ضماد كحولي, كرة قطنية أو ضماد شاشي ووعاء مقاوم للإلتنجاب.
 - قم بإخراج قلم واحد من العبوة بواسطة الإمساك بجسم القلم من الوسط. إحتفظ في البراد القلم المتبقي في العبوة.

- 2 **הסתכל על התווית**
 - בדוק שברשותך התרופה הנכונה במינון הנכון.
 - בדוק את תאריך התפוגה (EXP). הוא רשום בצד העטים.
 - ✗ אל תשתמש בעט אם תאריך התפוגה עבר.
- 2 **אנظر إلى الملصقة**
 - تأكد من أن بحوزتك الدواء الصحيح بالمقدار الدوائي الصحيح.
 - تأكد من تاريخ إنتهاء الصلاحية (EXP). فهو مدون في جانب الأقلام.
 - ✗ لا تستعمل القلم إذا إنتقضى تاريخ الصلاحية.

- 3 **הסתכל על חלון העט**
 - בדוק שהנזול צלול, חסר צבע עד צהוב חיזור.
 - ייתכן ותבחין בבעות אוויר, זה נורמלי.
 - ✗ אל תזריק אם הנזול עכור, שינה את צבעו או מכיל חלקיקים.
 - ✗ אל תזריק אם החלון בצבע צהוב חזק.
- 3 **أنتظر إلى نافذة القلم**
 - تأكد من أن السائل رائق, عديم اللون حتى مائل للأصفر الشاحب.
 - من الجائز أن تلاحظ فقاعات هواء, هذا الأمر طبيعي.
 - ✗ لا تحقن إذا كان السائل عكراً, تغير لونه أو يحوي جسيمات.
 - ✗ لا تحقن إذا كانت النافذة بلون أصفر فاقع.

- 5 **בחר את אתר ההזרקה.**
 - אתה יכול להזריק לתוך הירך או לזרוע, למעט 5 ס"מ סביב הטבור שלך. אם מישהו אחר מזריק לך, ניתן להזריק גם לאזור החיצוני של הזרוע העליונה.
 - שנה את אתר ההזרקה בכל הזרקה.
 - ✗ אל תזריק לעור רגיש, פגוע או עם חבורות או צלקות.
- 5 **إختار موقع الحقن.**
 - يمكنك الحقن في الفخذ أو البطن, عدا 5 سم من حول السرة لديك. إذا كان شخص آخر يحقنك, فيمكن أيضاً الحقن في المنطقة الخارجية لأعلى الذراع.
 - بدل موقع الحقن في كل عملية حقن.
 - ✗ لا تحقن في جلد حساس, متضرر أو فيه كدمات أو ندب.

- 6 **הכן את מקום ההזרקה.**
 - רחץ את ידך.
 - נקה את העור עם פד אלכוהול.
 - ✗ אל תיגע שוב באתר ההזרקה לפני ההזרקה.
- 6 **حضر مكان الحقن.**
 - إغسل يديك.
 - نظف الجلد بواسطة ضماد كحولي.
 - ✗ لا تلمس موقع الحقن ثانية قبل إجراء الحقن.



- 3 **לחץ כלפי מטה והחזק את העט בחוזקה כנגד עורך.**
 - יישמע "קליק" כשההזרקה מתחיל.
- 3 **إضغط نحو الأسفل وأمسك القلم بقوة مقابل جلدك.**
 - ستسمع "طقة" عند بدء الحقن.
- 4 **המשך להחזיק בחוזקה את העט כנגד עורך.**
 - החלון יתחיל להפוך לצהוב.
 - הזריקה עשויה להמשך עד 15 שניות.
- 4 **واصل مسك القلم بقوة مقابل جلدك.**
 - تبدأ النافذة بالتحول إلى اللون الأصفر.
 - من شأن الحقن أن يستمر حتى 15 ثانية.

- 6 **משוך את העט מעורך.**
 - אם אתה רואה דם, לחץ עם צמר גפן או גזה על המקום.
 - ✗ אל תשפשף את עורך אחרי ההזרקה.
- 6 **إسحب القلم عن جلدك.**
 - إذا لاحظت وجود دم, فإضغط بواسطة كرة قطنية أو ضماد شاشي على المكان.
 - ✗ لا تفرك جلدك بعد الحقن.
- 7 **השלך את העט ואת המכסה למיכל עמיד לניקוב מיד לאחר השימוש.**
 - שמור תמיד את המיכל מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים.
 - ✗ אל תחזיר את המכסה חזרה.
 - ✗ אל תשליך את העט לפסולת הביתית.
 - ✗ אל תשתמש שנית במיכל העמיד לניקוב שלך.
 - ✗ אל תשליך את המיכל לניקוב שלך לפסולת הביתית, אלא אם המדיניות המקומית מאפשרת זאת. שאל את הרופא, הרוקח או האחור כיצד להשליך את המיכל.
- 7 **إرم القلم والغطاء في وعاء مقاوم للإلتنجاب مباشرة بعد الإستعمال.**
 - دائماً إحتفظ الوعاء بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال.
 - ✗ لا تعيد الغطاء ثانية.
 - ✗ لا ترم القلم في القمامة المنزلية.
 - ✗ لا تعاود إستعمال الوعاء المقاوم للإلتنجاب الخاص بك.
 - ✗ لا ترم الوعاء المقاوم للإلتنجاب الخاص بك في القمامة المنزلية, إلا إذا سمحت بذلك القوانين المحلية. إسأل الطبيب, الصيدلي أو الممرضة حول كيفية التخلص من الوعاء.

المرحلة ب: إجراء الحقن - طبق المرحلة ب فقط بعد إتمام المرحلة أ " التحضير للحقن "

שלב ב': ביצוע ההזרקה - בצע את שלב ב' רק אחרי שהשלמת את שלב א' "הכנה להזרקה"

