

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

תרופה זו חייבת במרשם רופא

### **אלטרול®**

טבליות

### **הרכב**

כל טבליה מכילה:

אמיטריפטילין הידרוכלוריד 25 מ"ג (Amitriptyline Hydrochloride 25 mg)

### **אלטרולט**

טבליות

### **הרכב**

כל טבליה מכילה:

אמיטריפטילין הידרוכלוריד 10 מ"ג (Amitriptyline Hydrochloride 10 mg)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

## **1. למה מיועדת התרופה?**

### **פעילות רפואית**

טיפול בסימפטומים של דיכאון ולטיפול בהרטבת לילה (Enuresis nocturna)

### **קבוצה תרפויטית**

מעכבי ספיגת מונואמין לא ברניים (N06AA)

## **2. לפני השימוש בתרופה**

### **אין להשתמש בתכשיר אם:**

- אתה רגיש לחומר הפעיל, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף")
- עברת לאחרונה התקף לב. (אוטם שריר הלב)
- הינך סובל ממחלת לב, כגון: הפרעות בקצב הלב אשר נראים באלקטרוקרדיוגרם (א.ק.ג.), חסם לב, או מחלת לב כלילית
- הינך נוטל תרופות מקבוצות מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOI).
- נטלת MAOI במהלך 14 הימים האחרונים
- נטלת מוקלובמיד יום קודם
- הינך סובל ממחלת כבד חמורה.
- אם אתה מטופל בטבליות אלטרול/אלטרולט עליך להפסיק את התרופה ולחכות 14 ימים לפני התחלת טיפול ב- MAOIs
- הינך מתחת לגיל 12 שנים.

### **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

**ספר לרופא או לרוקח לפני התחלת הטיפול בטבליות אלטרול/אלטרולט**

ייתכנו הפרעות בקצב לב ותת-לחץ דם אם אתה מקבל מינון גבוה של התרופה. תופעות אלו עלולות להתרחש גם במינונים רגילים אם קיימת מחלת לב.

הארכת מקטע QT

בטיפול באמיטריפטילין דווח על בעיה בלב הנקראת הארכת מקטע QT (הפרעות בקצב הלב שניתן לזהות בבדיקת אלקטרוקארדיוגרם - א.ק.ג.) ועל הפרעות בקצב הלב (דפיקות לב מהירות או בלתי סדירות).  
ספר לרופא שלך אם:

- יש לך קצב לב איטי
- יש לך או היתה לך בעיה בה הלב אינו מסוגל להזרים את הדם בגוף באופן תקין (מצב שנקרא אי-ספיקת לב)
- אתה נוטל תרופה אחרת כלשהי שעלולה לגרום לבעיות לב, או
- יש לך בעיה הגורמת לרמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום בדם, או לרמה גבוהה של אשלגן בדם.
- הינך עומד לעבור ניתוח, ייתכן ויהיה צורך בהפסקת הטיפול עם אמיטריפטילין לפני מתן חומר אלחוש. במקרה של ניתוח חירום, יש לדווח לרופא המרדים המטפל על נטילת תרופה זו.
- אתה סובל מפעילות יתר של בלוטת התריס (תירוואיד) או נוטל תרופות לטיפול בהפרעה בתפקוד בלוטת התריס.

#### מחשבות אובדניות, החמרה של הדיכאון או החרדה

אם אתה מדוכא, לפעמים יכולות להופיע לך מחשבות על התאבדות או פגיעה עצמית. מחשבות אלו עלולות להתגבר בתחילת הטיפול בתרופות נוגדות דיכאון, היות ולוקח זמן עד שהתרופות מתחילות להשפיע, בדרך כלל כשבועיים אבל לעיתים יותר.

יש סבירות גבוהה שתחשוב מחשבות כאלה אם:

- היו לך בעבר מחשבות על התאבדות או על פגיעה עצמית
- אתה צעיר. מידע ממחקרים קליניים הראה עליה בסיכון להתנהגות אובדנית במבוגרים (מתחת לגיל 25 שנים) עם מצבים פסיכיאטריים, אשר טופלו בנוגדי דיכאון.

אם, בכל זמן שהוא, יש לך מחשבות על התאבדות או על פגיעה עצמית פנה מיד לרופא שלך או לבית חולים.

ייתכן שיהיה מועיל לספר לקרוב משפחה או לחבר קרוב שאתה מדוכא ולבקש מהם לקרוא עלון זה. אתה יכול לבקש מהם לומר לך אם הם חושבים שהדיכאון או החרדה שלך מחמירים, או אם הם מודאגים לגבי שינויים בהתנהגות שלך.

#### אירועים של מאניה (mania)

ייתכן ששטופלים מסוימים עם הפרעת מאניה-דפרסיה יכנסו לשלב המאני, שלב המאופיין בפזרנות וברעיונות המשתנים במהירות, עליזות מוגזמת ופעילות גופנית מופרזת. במקרים אלו חשוב לפנות לרופא שלך שכפי הנראה יחליף לך את התרופה.

ספר לרופא אם אתה סובל או סבלת בעבר מבעיה רפואית כלשהי ובמיוחד אם:

- יש לך גלאוקומה צרת זווית (אובדן ראייה עקב לחץ תוך עיני גבוה באופן חריג) יש לך אפילפסיה, היסטוריה של התכווצויות או התקפים
- יש לך קושי במתן שתן
- אתה סובל מערמונית מוגדלת
- יש לך מחלה בבלוטת התריס
- יש לך הפרעה ביפולארית
- יש לך סכיזופרניה
- יש לך מחלת כבד חמורה
- יש לך מחלת לב חמורה
- יש לך היצרות של השוער (היצרות של פתח היציאה מהקיבה - pylorus stenosis) וחסמת מעיים שיתוקית (paralytic ileus)
- יש לך סכרת (ייתכן ותידרש התאמת מינון של תרופות הסכרת שלך)
- אם אתה משתמש בנוגדי דיכאון כגון SSRIs, ייתכן והרופא שלך ישקול לשנות את המינון של התרופה (ראה סעיף 2- "תגובות בין תרופתיות")
- שימוש בבופרופרין יחד עם אמיטריפטילין עלול לגרום לתסמונת סרוטונין ( מצב מסכן חיים), ראה סעיף 2 "תגובות בין תרופתיות."
- לקשישים נטייה מוגברת לסבול מתופעות לוואי מסוימות כגון סחרחורת במעבר לעמידה עקב לחץ דם נמוך ( ראה סעיף 4- "תופעות לוואי")

#### **שימוש בילדים ומתבגרים:**

##### **דיכאון**

אין לתת תרופה זו לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים לטיפול בדיכאון כיוון שבטיחות ויעילות לטווח ארוך לא נקבעו בקבוצת הגיל הזו.

- **הרטבת לילה**

- א.ק.ג. צריך להתבצע לפני תחילת הטיפול עם תרופה זו כדי לשלול הפרעה של הארכת מקטע QT.
- אין להשתמש בתרופות אלו ביחד עם תרופה אנטיכולינרגית (ראה סעיף 2 - "תגובות בין תרופתיות").

מחשבות והתנהגויות אובדניות יכולות להופיע בשלבים ראשונים של הטיפול עם נוגדי דיכאון גם עבור הפרעות אחרות שאינן דיכאון; לכן במטופלים עם הרטבה, יש לנקוט באותם אמצעי זהירות שצוינו עבור מטופלים עם דיכאון.

- **תגובות בין-תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:**

- מעכבי MAO (כגון פנלזין, איפרוניאזיד, איזוקרבוקסאזיד, ניאלאמין או טרנילציפרומין (לטיפול בדיכאון)). או סלג'לין (לטיפול בלמחלת פרקינסון) אין ליטול תרופות אלו בו-זמנית עם אמטרפטילין (ראה סעיף 2 - "אין להשתמש בתרופה אם")
- אדרנלין, אפדרין, איזופרנלין, נוראדרנלין, פנילאפרין ופנילפרופנולאמין (אלו נמצאים בתרופות לשיעול והצטננות ובחלק מהתרופות להרדמה)
- תרופות להורדת לחץ-דם למשל, חוסמי תעלות סידן (כגון, דילטיאזם וורפאמיל), גואנתדין, בתאנידין, קלונידין, רסרפין ומתילדופה
- תרופות אנטיכולינרגיות כמו תרופות מסוימות לטיפול במחלת פרקינסון או בעיות במערכת העיכול (כגון, אטרופין, היוסקיימין) תיורידאזין (לטיפול בסכיזופרניה)
- טרמדול (משכך כאבים)
- תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים (כגון, פלוקונאזול, טרבינאפין, קטוקונאזול ואיטראקונאזול)
- תרופות להרגעה (כגון, ברביטורטים)
- תרופות נוגדות דיכאון (כגון SSRI (פלואקסטין, פרוקסטין, פלובוקסמין), דולוקסטין ובופרופיון)
- תרופות לטיפול במחלות לב מסוימות (למשל, חוסמי-בטא, תרופות לטיפול בהפרעות קצב לב)
- סימטידין (לטיפול בכיב קיבה)
- מתילפנידאט (לטיפול בהפרעת קשב וריכוז עם היפראקטיביות - ADHD)
- ריטונאביר (לטיפול ב-HIV)
- גלולות למניעת היריון
- ריפמיציין (לטיפול בזיהומים)
- פניטואין וקרבמזפין (לטיפול באפלפסיה)
- St. John's wort (היפריקום- צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון)
- תרופות לטיפול בבלוטת התריס
- חומצה ולפרואית
- בופרורופין/אופיאדים-תרופות אלו עלולות להגיב עם אמטרפטילין ועלולות לגרום לסימפטומים כגון התכווצויות שרירים לא רצוניות כולל שרירים השולטים בתנועת העיניים, חרדה, הזיות, תרדמת, הזעה מרובה, רעד, רפלקסים מוגזמים, מתח שריר מוגבר, טמפרטורת גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, פנה לרופא שלך באם אתה חש תסמינים כאלה.

אתה צריך לספר לרופא אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות שמשפיעות על קצב הלב כגון:

- תרופות לטיפול בדופק לא סדיר (כגון כינידין, סוטלול).
- אסטמיזול וטרפנאדין (לטיפול באלרגיות ובקדחת השחת)
- תרופות לטיפול במחלות נפש מסוימות (כגון, פימוזיד וסרטינדול)
- ציסאפריד (לטיפול בסוגים שונים של קשיי עיכול)
- הלופאנטרין (לטיפול במלריה)
- מתאדון (לטיפול בכאב ולגמילה)
- משתנים (כגון פורוסמיד)

אם אתה צריך לעבור ניתוח ולקבל חומר להרדמה כללית או מקומית יש לדווח לרופא על נטילת טבליות אלטרולט/אלטרול.

כמו כן, יש לידע את רופא השיניים על נטילת טבליות אלטרולט/אלטרול אם הטיפול כרוך במתן חומר הרדמה מקומי.

**שימוש בתרופה ומזון**  
ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון

**שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**  
לא מומלץ לשתות אלכוהול בזמן נטילת תרופה זו כיוון שזה עלול להגביר את ההשפעה המרדמה.

### היריון והנקה

אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת היריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.  
לקיחת התרופה אינה מומלצת במהלך ההריון אלא אם הרופא שלך חושב שיש בכך צורך ורק לאחר שיקול זהיר של התועלת מול הסיכון.  
אם נטלת את התרופה במהלך החלק האחרון של ההיריון, התינוק עלול לסבול מתסמיני גמילה כגון, עצבנות, מתח שרירים מוגבר, רעד, נשימה לא סדירה, שתייה ירודה, בכי חזק, אצירת שתן ועצירות.  
הרופא ימליץ לך האם להתחיל / להמשיך / להפסיק להניק או להפסיק להשתמש בתרופה זו לפי שיקולים של תועלת ההנקה עבור הילד שלך ותועלת הטיפול התרופתי עבורך.

### נהיגה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לנמנום וסחרחורת, במיוחד בתחילת הטיפול. אל תנהג או תפעיל מכונות אם אתה חש שהתרופה משפיעה עליך באופן זה  
באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

### מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אלטרולט ואלטרולט מכילות לקטוז אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, אנא ידע את הרופא שלך לפני נטילת התרופה.  
התרופה מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבות "נטולות נתרן".  
אלטרולט מכילה גם חומר צבע, sunset yellow, שעלול לגרום לתגובה אלרגית.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא.  
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.  
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

### אין לעבור על המנה המומלצת

יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

### צורת הנטילה

אין ללעוס, לכתוש או לחצות!  
יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.  
אין לחצות את הטבליה, בהעדר קו חציה.  
אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

### אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.  
תסמינים של מינון יתר כוללים אישונים מורחבים, דופק מהיר או לא סדיר, קושי במתן שתן, יובש בפה ובלשון, חסימת מעיים, התקפים, חום, עצבנות, בלבול, הזיות, תנועות לא רצוניות, תת-לחץ דם, דופק חלש, חיוורון, קשיי נשימה, שינוי בצבע העור לכחול, ירידה בקצב הלב, ישנוניות, אובדן הכרה, תרדמת, תסמינים לבביים שונים כגון, חסם לב, אי ספיקת לב, הלם קרדיוגני, חמצת מטבולית (אצידוזיס), תת-אשלגן בדם (היפוקלמיה).

מינון יתר בילדים עלול לגרום להשלכות רציניות. ילדים חשופים במיוחד לתרדמת, תסמינים לבביים, קושי בנשימה, התקפים, רמת נתרן נמוכה בדם, עייפות, נמנום, בחילות, הקאות ורמת סוכר גבוהה בדם.

### אם שכחת לקחת את התרופה:

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן שנקבע, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

#### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה באופן פתאומי ללא התייעצות עם הרופא, הרופא יחליט מתי וכיצד להפסיק את הטיפול כדי להימנע מתסמינים לא רצויים שעלולים לקרות במידה והטיפול מופסק בפתאומיות (כמו כאב ראש, הרגשה רעה, ישנוניות, עצבנות) כמו בתרופות אחרות לטיפול בדיכאון, ייתכן שייקח מספר שבועות לפני שתרגיש שיפור.

בטיפול בדיכאון משך הטיפול הוא אישי ובדרך-כלל נמשך לפחות 6 חודשים. משך הטיפול יקבע על-ידי הרופא. יש להמשיך בטיפול כל עוד הרופא ממליץ. המחלה הבסיסית עלולה להימשך זמן רב. אם תפסיק את הטיפול מוקדם מדי, התסמינים שלך עלולים לחזור.

טיפול בהרטבת לילה הרופא ישקול אם יש צורך להמשיך בטיפול מעבר ל- 3 חודשים.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

#### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באלטרול/אלטרולט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות:

- התקפים של ראייה מטושטשת לסירוגין, ראיית הילה צבעונית סביב נקודות אור או כאב בעיניים. יש לפנות מיידי לבדיקת עיניים בטרם תמשיך בטיפול, מצב זה יכול להעיד על גלאוקומה חריפה, תופעת לוואי נדירה העלולה להופיע בעד משתמש אחד מתוך 1000 משתמשים
- בעיה בלב הנקראת הארכת מקטע QT (ניתן לזהות אותה בבדיקת אלקטרוקארדיוגרם, א.ק.ג.). תופעת לוואי שכיחה העלולה להופיע בעד משתמש אחד מתוך 10 משתמשים
- עצירות קשה, בטן נפוחה, חום והקאה. תסמינים אלה עלולים להופיע כתוצאה מחסימת מעיים שיתוקית. תופעות לוואי נדירה העלולה להופיע בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים
- הצהבת העור והלבן בעיניים (צהבת). יכולה להיות בעיה בכבד. תופעות לוואי נדירה העלולה להופיע בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים
- חבורות, דימום, חיוורון או כאב גרון מתמשך וחום. תסמינים אלה עלולים להיות הסימן הראשון לבעיה בדם או במוח העצם. בעיה בדם יכולה להתבטא בירידה במספר תאי הדם האדומים (הנושאים חמצן לגוף), תאי הדם הלבנים (אשר מסייעים להילחם בזיהום) וטסיות דם (אשר עוזרות בקרישה). תופעות לוואי נדירה העלולה להופיע בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים
- מחשבות או התנהגות אובדניות, תופעות לוואי נדירה העלולה להופיע בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים

#### תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (מופיעות ביותר ממשתמש אחד מתוך 10 משתמשים):

- ישנוניות / נמנום
- רעד בידים או בחלקי גוף אחרים
- סחרחורת
- כאבי ראש
- דופק לא סדיר, חזק או מהיר
- סחרחורת כשנעמדים בגלל תת-לחץ דם (תת-לחץ דם אורתוסטטי)
- יובש בפה
- עצירות
- בחילה
- הזעה מוגברת
- עלייה במשקל
- קושי בדיבור או דיבור איטי
- תוקפנות
- גודש באף

**תופעות לוואי שכיחות (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10 משתמשים):**

- בלבול
- הפרעות בתפקוד המיני (ירידה בחשק המיני, בעיות זקפה)
- הפרעות קשב
- שינויים בטעם
- חוסר תחושה או תחושת עקצוץ בזרועות או ברגליים
- הפרעות בקואורדינציה
- אישונים מורחבים
- חסם בלב
- עייפות
- רמות נמוכות של נתרן בדם
- עצבנות
- הפרעות במתן שתן
- תחושת צמא

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 100 משתמשים):**

- התרגשות, חרדה, קשיי שינה, סיוטי לילה
- פרכוסים
- צלצולים באוזניים (טינטון tinnitus)
- עלייה בלחץ הדם
- שלשול, הקאה
- פריחה בעור, סרפדת (אורטיקריה), נפיחות של הפנים ושל הלשון
- קשיים במתן שתן
- ייצור מוגבר של חלב אם או זרימה של חלב אם ללא הנקה
- עלייה בלחץ התוך-עיני
- התמוטטות
- החמרה של אי ספיקת לב
- תפקוד כבד לקוי (כגון, כולסטזיס)

**תופעות לוואי נדירות (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 1,000 משתמשים):**

- ירידה בתיאבון
- בלבול חריף (בעיקר במטופלים קשישים), הזיות (במיוחד במטופלים עם סכיזופרניה)
- הפרעות בקצב הלב או בדופק
- נפיחות של בלוטות הרוק
- נשירת שיער
- רגישות מוגברת לאור השמש
- הגדלת חזה בגברים
- חום
- ירידה במשקל
- תוצאות חריגות של בדיקות תפקודי כבד

**תופעות לוואי נדירות מאוד (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים):**

- מחלת שריר הלב
- תחושה של חוסר מנוחה פנימי וצורך דחוף להיות בתנועה מתמדת
- הפרעה של העצבים ההיקפיים
- עלייה חריפה בלחץ בתוך העין
- הפרעת קצב מסוימות (מסוג הנקרא "torsade de pointes")
- דלקת אלרגית של נאדיות הריאות ושל רקמת הריאה.

**תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות שלא ניתן לקבוע את שכיחותן מהנתונים הזמינים):**

- חוסר תיאבון
- עלייה או ירידה ברמות הסוכר בדם
- פרונייה
- הפרעות תנועה (תנועות לא רצוניות או ירידה בתנועתיות)
- דלקת אלרגית של שריר הלב
- דלקת כבד

- גלי חום
- יובש בעיניים

עליה בסיכון לשברים בעצמות נצפתה במטופלים שנטלו סוג זה של תרופות.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:  
<https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

**יש לשמור תרופה זו במקום יבש, מתחת ל- 25°C.**

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**

אלטרול:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, hypromellose, titanium dioxide, D&C yellow #10 aluminium lake, macrogol/PEG 400, FD&C yellow #6/Sunset yellow FCF aluminium lake.

אלטרולט:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, starch, sodium starch glycolate, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, hypromellose, titanium dioxide, macrogol/ PEG 400.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

**אלטרולט:** טבליות עגולות קמורות, מצופות בצבע לבן.  
**אלטרול:** טבליות עגולות קמורות, מצופות בצבע צהוב.

כל אריזה מכילה 30, 50 או 100 טבליות. ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים

**שם בעל הרישום והיצרן וכתובתו:**

טבע ישראל בע"מ, רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

**העלון נערך במאי 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות**

**מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

אלטרולט® טבליות: 051 75 24391

אלטרולט טבליות: 051 41 24390

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.