

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו 1986  
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה.

**פרולסן וטרינרי**  
**PROLCEN Veterinary**  
אבקה להמסה במי שתייה

2. חומר פעיל כל גרם מכיל Amprolium (hydrochloride) 200mg  
חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף "מידע נוסף"

3. למה מיועדת התרופה?  
לטיפול בקוקסידיוזיס הנגרם על ידי eimeria spp. הרגיש ל-Amprolium, בתרנגולות פטם,  
תרנגולות הודו ומטילות.

**קבוצה תרפויטית**  
קוקסידיוסטט.

4. התוויות נגד:  
אין להשתמש אם ידועה רגישות לחומר הפעיל או לאחד מהחומרים הלא פעילים.

5. תופעות לוואי:  
אם הבחנת בתופעות חמורות כלשהן או בתופעות אחרות אשר אינן מוזכרות בעלון לצרכן זה, אנא  
יידע את הרופא הווטרינר שלך. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על  
הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות  
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור  
<https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה:  
תרנגולות פטם, תרנגולות הודו ומטילות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו 1986  
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

**7. צורת המתן והמינון :**

אחרי המסה, התכשיר ניתן במי השתייה.

30 מ"ג אמפרוליום לכל ק"ג ליממה, למשך 5 - 7 ימים.  
השווה ערך ל 150 מ"ג פרולסן וטרינרי לכל ק"ג משקל גוף ליממה, למשך 5 - 7 ימים

**8. אופן השימוש בתכשיר:**

בעת הכנת מי השתייה יש להתחשב במשקל בעלי חיים המטופלות ותצרוכת מי השתייה היומית.  
צריכת מי השתייה יכולה להשתנות בהתאם לגיל, מצב רפואי, זן החיה ותנאי גידול.  
המנה היומית המדוייקת תחושב על בסיס המינון המומלץ וכן במספר ובמשקל בעלי החיים,  
בהתאם לנוסחה הבאה:

מינון חומר פעיל (מ"ג/ק"ג /ליממה) X ממוצע משקל בעלי החיים (ק"ג)

$$\text{גרם תכשיר לכל ליטר מי שתייה} = \frac{\text{כמות חומר פעיל בתכשיר (מ"ג/גרם) X ממוצע תצרוכת מים יומית (ליטר ליממה)}}{\text{מינון חומר פעיל (מ"ג/ק"ג /ליממה)}}$$

מי השתייה עם התרופה יהוו מקור בלעדי של שתייה בעת הטיפול, וכן לאפשר לבעלי החיים גישה חופשית למי השתייה הרפואי.

**9. זמן המתנה:**

בשר פטם ובהודים: 0 יום. ביצים: 0 ימים

**10. אזהרות:**

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחית המטרה:  
שימוש תכוף וחוזר בתכשיר עם אותו סוג של אנטיפרוטוזואל או שימוש לאורך זמן ארוך, מגביר את הסיכון להתפתחות עמידות לתרופה.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר :  
אנשים עם רגישות ידועה לאמפרוליום צריכים להמנע ממגע עם תכשירים וטרינריים אלה.  
יש לטפל בתכשיר בזהירות ולהיזהר משאיפת התכשיר או ממגע עם העור או העיניים.  
יש להזהר במיוחד בעת מיהול התכשיר במים:  
- יש למנוע פיזור של האבקה, בעת מיהולה במי השתייה.  
- יש ללבוש מסכת הגנה, כפפות, חלוק ומשקפי הגנה.  
- במקרה של מגע בעור ובעיניים, יש לשטוף מיידית בכמות גדולה של מים.  
אין לעשן, לאכול או לשתות בעת הטיפול בתרופה.

הריון והנקה:

לא תוארו תופעות לוואי במטילות

תגובות עם תרופות אחרות וסוגים אחרים של אינטראקציות:

התכשיר הוא אנלוג של תיאמין. מתן יחד עם ויטמין B קומפלקס יכול להפחית את יעילותו.

מינון יתר:

שימוש ממושך-עלול לגרום לירידה ברמות התיאמין (אם מופיעים סימפטומים יש לתת תיאמין).

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) תשמ"ו 1986  
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

### **11. תנאי אחסון:**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה
  - אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה על גבי הבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש
- תנאי אחסון:** מתחת ל  $25^{\circ}\text{C}$ .  
חיי מדף לאחר פתיחת התכשיר בפעם הראשונה – 3 חודשים.  
ניתן להשתמש בתמיסה המהולה למשך 24 שעות, לאחר מיהול התכשיר במי השתיה.

### **12. הוראות בדבר השמדת התכשיר / שאריות התכשיר בתום השימוש**

יש להשמיד כל שארית של תרופות וטרינריות או חומרים שמקורם בתכשירים וטרינריים בהתאם להוראות ההשמדה של המשרד לאיכות הסביבה,

### **13. מידע נוסף :** נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

silica colloidal anhydrous, Lactose monohydrate.

### **כיצד נראת התרופה ומה תוכן האריזה:**

אבקה לבנה בשקיות פוליפרופילן/אלומיניום/פוליאיתילן, אטומות תרמית.  
**גודל האריזה:** 100 גרם, 1 ק"ג.

### **מספר רישום התרופה:**

**שם יצרן:** חברת CENA VISA, ראוס, ספרד  
**בעל הרישום:** חברת MPVET בע"מ, רחוב המגשימים 20, קרית מטלון, פתח תקווה

נערך מאי 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות מספר רישום התרופה: 158-89-34655-00