



increlex[®]

mecasermin

بطاقة معلومات للمتعالج حول إنكرلكس[®]

تعليمات استخدام إنكرلكس

- ✿ يجب إعطاء إنكرلكس مرتين يومياً
- ✿ يجب إعطاء إنكرلكس مباشرة قبل أو بعد الوجبة
- ✿ إذا تعذر إعطاء جرعة إنكرلكس مباشرة قبل أو بعد الوجبة، فال تعط تلك الجرعة من إنكرلكس
- ✿ انتبه إلى العلامات والأعراض التي تشير إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، والتي ذكرها لك الطبيب المعالج أو الممرضة. احمل معك مصدر سكر لأكل في حالة ظهرت هذه العلامات.
- ✿ يجب استخدام منطقة حقن مختلفة في الجلد عند إعطاء كل جرعة

يجب تغيير منطقة الحقن

✿ البطن ✿ الفخذ ✿ الأرداف ✿ الذراع العلوي (العضد)

- ✿ في حالة فاتتك جرعة، ال تقم أبداً بزيادة الجرعات التالية لإنكرلكس إكمالها. يجب تناول الجرعة التالية في الوقت المحدد.

- ✿ يجب حفظ إنكرلكس في الثالجة، ولكن يمنع تجميده، احفظ بدرجة حرارة 2°C - 8°C

قبل استخدام المستحضر، اقرأ نشرة المستهلك التي تحتوي على تعليمات الحقن بالتفصيل

يجب إكمال اسم المريض والجرعة المطلوبة قبل إعطاء النموذج للمريض – إنه يحتوي على معلومات مفيدة ومهمة تتعلق بكيفية استخدام إنكرلكس.

اسم المريض:

الجرعة بالوحدات:

تفاصيل الاتصال

اسم الطبيب:

اسم الممرضة:

رقم هاتف العيادة/جهة الاتصال:

يخضع هذا الدواء لمزيد من المراقبة لتمكين الكشف السريع عن معلومات السالمة الجديدة. يمكنك المساعدة من خلال الإبلاغ عن أي آثار جانبية قد يتعرض لها طفلك.

إذا ظهرت على طفلك آثار جانبية، بما في ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة، يجب استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي أو الممرضة.
بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساهمة بمزيد من المعلومات فيما يتعلق بسالمة الدواء.

يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية لوزارة الصحة على العنوان <https://sideeffects.health.gov.il> كما يمكنك إبلاغ صاحب التسجيل مديسون فارما م.ض على العنوان pv@medison.co.il

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكور. ومع ذلك فإن المستحضر مخصص لكال الجنسين. تمت مراجعة هذه البطاقة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة في تشرين الثاني 2021.