



מדריך מינון עבור אינקרלקס®

הוראות שימוש באינקרלקס לטיפול בחסר ראשוני וחמור בפקטור גדילה דמוי-אינסולין 1 (IGF-1)

תרופה זו כפופה לניטור נוסף על מנת לאפשר זיהוי מהיר של מידע בטיחות חדש. אנשי מקצוע בתחום הבריאות מתבקשים לדווח על כל חשד לתופעת לוואי.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות בכתובת <https://sideeffects.health.gov.il> כמו כן, באפשרותך לדווח לבעל הרישום מדיסון פארמה בע"מ בכתובת pv@medison.co.il

מדריך זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בנובמבר 2021.

כיצד יש להשתמש במדריך זה

הטבלאות במדריך זה תוכננו כך שייסעו לך לחשב את המינון המתאים לכל זריקה הניתנת לחולה. לאחר איתור משקל גופו של החולה בעמודה הראשונה, המספר המתאים למינון ביחידות מ"ג לק"ג הוא מספר היחידות להזרקה.

המינון (ביחידות) לזריקה מחושב לפי הנוסחה הבאה:

$$\text{משקל (ק"ג)} \times \text{מנה בודדת (מ"ג לק"ג)} \times 10 = \text{יחידות לזריקה}$$

המינון ההתחלתי המומלץ הוא 0.04 מ"ג לק"ג פעמיים ביום בהזרקה תת עורית. אם הסבילות טובה למשך שבוע אחד לפחות, ניתן להעלות את המינון בתוספת 0.04 מ"ג לק"ג כל פעם, על למינון מרבי של 0.12 מ"ג לק"ג פעמיים ביום. מינונים גבוהים מ-0.12 מ"ג לק"ג פעמיים ביום לא מומלצים מאחר ומגבירים סיכון לנאופלזיה.

המינון מחושב ביחידות מאחר שאינקרלקס ניתן באמצעות מזרק אינסולין.

יש לשנות את אתר ההזרקה בכל מנה ✿
 יש לתת אינקרלקס מיד לפני או מיד לאחר ארוחה ✿

טווחי המינון נעים בין 0.04 מ"ג לק"ג ל- 0.12 מ"ג לק"ג פעמיים ביום ✿
 יחידות המזרק נעות בין 2 יחידות ל- 84 יחידות ✿

היפוגליקמיה

אם מתפתחת היפוגליקמיה במינונים המומלצים, למרות צריכת מזון נאותה, יש להפחית את המינון.

עבור חולים במשקל 5 ק"ג עד 37 ק"ג

מנה לכל זריקה (מ"ג לק"ג) פעמיים ביום									משקל החולה (ק"ג)
0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	
6	6	5	5	4	4	3	3	2	5
7	7	6	5	5	4	4	3	2	6
8	8	7	6	6	5	4	4	3	7
10	9	8	7	6	6	5	4	3	8
11	10	9	8	7	6	5	5	4	9
12	11	10	9	8	7	6	5	4	10
13	12	11	10	9	8	7	6	4	11
14	13	12	11	10	8	7	6	5	12
16	14	13	12	10	9	8	7	5	13
17	15	14	13	11	10	8	7	6	14
18	17	15	14	12	11	9	8	6	15
19	18	16	14	13	11	10	8	6	16
20	19	17	15	14	12	10	9	7	17
22	20	18	16	14	13	11	9	7	18
23	21	19	17	15	13	11	10	8	19
24	22	20	18	16	14	12	10	8	20
25	23	21	19	17	15	13	11	8	21
26	24	22	20	18	15	13	11	9	22
28	25	23	21	18	16	14	12	9	23
29	26	24	22	19	17	14	12	10	24
30	28	25	23	20	18	15	13	10	25
31	29	26	23	21	18	16	13	10	26
32	30	27	24	22	19	16	14	11	27
34	31	28	25	22	20	17	14	11	28
35	32	29	26	23	20	17	15	12	29
36	33	30	27	24	21	18	15	12	30
37	34	31	28	25	22	19	16	12	31
38	35	32	29	26	22	19	16	13	32
40	36	3	30	26	23	20	17	13	33
41	37	34	31	27	24	20	17	14	34
42	39	35	32	28	25	21	18	14	35
43	40	36	32	29	25	22	18	14	36
44	41	37	33	30	26	22	19	15	37

עבור חולים במשקל 38 ק"ג עד 70 ק"ג

מנה לכל זריקה (מ"ג לק"ג) פעמיים ביום									משקל החולה (ק"ג)
0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	
46	42	38	34	30	27	23	19	15	38
47	43	39	35	31	27	23	20	16	39
48	44	40	36	32	28	24	20	16	40
49	45	41	37	33	29	25	21	16	41
50	46	42	38	34	29	25	21	17	42
52	47	43	39	34	30	26	22	17	43
53	48	44	40	35	31	26	22	18	44
54	50	45	41	36	32	27	23	18	45
55	51	46	41	37	32	28	23	18	46
56	52	47	42	38	33	28	24	19	47
58	53	48	43	38	34	29	24	19	48
59	54	49	44	39	34	29	25	20	49
60	55	50	45	40	35	30	25	20	50
61	56	51	46	41	36	31	26	20	51
62	57	52	47	42	36	31	26	21	52
64	58	53	48	42	37	32	27	21	53
65	59	54	49	43	38	32	27	22	54
66	61	55	50	44	39	33	28	22	55
67	62	56	50	45	39	34	28	22	56
68	63	57	51	46	40	34	29	23	57
70	64	58	52	46	41	35	29	23	58
71	65	59	53	47	41	35	30	24	59
72	66	60	54	48	42	36	30	24	60
73	67	61	55	49	43	37	31	24	61
74	68	62	56	50	43	37	31	25	62
76	69	63	57	50	44	38	32	25	63
77	70	64	58	51	45	38	32	26	64
78	72	65	59	52	46	39	33	26	65
79	73	66	59	53	46	40	33	26	66
80	74	67	60	54	47	40	34	27	67
82	75	68	61	54	48	41	34	27	68
83	76	69	62	55	48	41	35	28	69
84	77	70	63	56	49	42	35	28	70