

עלון לצרן ל**כף תרקהנת הרוקחים** (**תכשיט** **התשמ"ו** - **1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ורפרס® SR 240, קפלויות בשחרור מושהה

כל קפלייה מכילה: ורפמיל הידרוכלוריד

(Verapamil hydrochloride) 240 מ"ג.

חומרם בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".
קרא בעיון על העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע ממציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול ביתר לחץ דם מתון עד בינוני. לטיפול ומניעה של תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס).

קבוצה תרפויטית: חוסם תעלות סידן.

חוסמי תעלות סידן משנים את כמות הסידן הנכנס לתוך תאי השריר בלב וכלי הדם. זה יכול לשנות את החוזק והמהירות בהם הלב פועם. זה גם מרחיב את כלי הדם כך שהדם יכול לזרום בגוף ביתר בקלות. זה עוזר ליותר חמצן להגיע לשריר הלב ויכול להוריד את לחץ הדם.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (ורפמיל הידרוכלוריד) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אתה סובל מהלם לבבי (שוק קרדיוגי – ירידה מסוכנת בזרימת הדם)
- גבלת לאחרונה מהתקף לב עם סיבוך של דופק איטי
- אתה סובל מלחץ דם נמוך מאוד או מאי ספיקה של חדר שמאל
- אינך נושא קוצב לב ואתה סובל מחסימה במערכת ההולכה של הלב מדרגה שנייה או שלישית או מתסמונת סינוס חולה (sick sinus syndrome)
- אתה סובל מחסם סינו-פרוזדורי (sino-atrial block)
- אתה סובל מאי ספיקת לב
- אתה סובל מדופק איטי [מתחת ל-50 פעימות בדקה]
- אתה סובל מלחץ דם נמוך [הערך הגבוה (סיסטולי) נמוך מ-90 מ"מ כספית]
- אתה סובל מפרפרז או פרפור פרוזדורי אליו מתלווה מסילת הולכה נוספת (לדוגמה תסמונת וולף-פקינגסון-ויוט)
- אתה נוטל איוברדין (לבעיית לב)

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בורפרס SR 240, ספר לרופא אם:

- את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה.
- יש לך דופק איטי באופן חריג או דופק לא סדיר.

- גבלת לאחרונה מהתקף לב.

- אתה סובל מבעיית כבכד או גבלה.

- אתה סובל או גבלת בעבר מבעיית לב.

- אתה סובל ממחלה בה יש פגיעה בהולכה המעצב לשריר כגון מיאסתניה גרביס, תסמונת למברט-איטון, ניוון שרירים מתקדם על שם דושן.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותרופי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיחד אם אתה לוקח:

- חוסמי בטא בלחץ דם גבוה ומחלות לב (כגון אטנוולל, פרופרנולול, מטופרולול)

- חוסמי אלפא לטיפול בלחץ דם גבוה ומחלות לב (כגון פרוסין, טרוזוסין)

- משתנים

תרופות הידועות כסטטינים כגון אטורבסטטין, לובאסטטין, סימבסטטין, המשמשות להורדת רמות הכולסטרול

- כל תרופה אחרת לטיפול בלחץ דם גבוה או לדופק לא סדיר (הפרעת קצב כגון כינדין, פלקאיניד, דיספירמיד, דיגוקסין, דיגיטוקסין

דיגטראן (תרופה למניעת היווצרות קרשי דם)

- תרופות המכילות איוברדין לטיפול במחלות לב מסוימות (ראה גם בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם")

תרופות לטיפול בדיכאון (כולל התכשיר הצמחי St. John's wort), חדרה או ספיקזזה. אלה יכולות לכלול אימפירמין, בוספירין, ליתיום

תרופות הידועות כמדכאות מערכת החיסון כגון ציקלוספורין, סירולימוס, אברוליומוס, טקרולימוס. משמשות למניעת דחיית השתלות

ג'ליבקלמיד, משמש לטיפול בסוגים מסוימים של סוכרת

אספירין, משכך כאבים שהוא נוגד דלקת שאינו סטרואיד (NSAID)

- המשמש לשיכוך כאבים ולהורדת חום
- אלמוטרפטן, משמש לטיפול במיגרנה
- מידאזולם, משמש כחומר הרגעה או הדרמה
- תיאופילין, משמש לטיפול באסתמה
- דוקורוביצין, תרופה לטיפול בסרטן

סימטידין, משמש לטיפול בקשיי עיכול או כיבים בקיבה

ריפמפיצין, משמש לטיפול בשחפת בסוגים אחרים של זיהום קרבמפיץ, פניטואין או פנוברביטל (פנוברביטון). תרופות אלה

משמשות כנוגדי פרוכוסים

ריטונאביר, לדוגמה לטיפול בגניף הכשל החיסוני (HIV)
איתרומיצין, קליתרומיצין, טליתרומיצין, משמשות לטיפול בסוגים מסוימים של זיהום

- קולכיצין או סולפינרירון, משמשות לטיפול בשיגרון

אם גבלת בטעות גבוה יותר

אם גבלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לטויל את התרופה

אם שכחת לטויל את תרופה זו בזמן המיועד, יש ליטול מנה מייד כשזכרתך, אלא אם כן נמטע הגיע הזמן למנה הבאה. במקרה זה, דלג על המנה שנשכחה. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה, עשויה להיגרם החמרה במצבך.

הריון, הנקה ופוריות

אם את בהריון, מתכננת להיכנס להריון או מניקה, היועצי ברופא.

נהיגה ושימוש במכוונת

אין לנהוג, להפעיל מכוונת או לעסוק בכל פעילות המחייבת ערנות עד אשר תדע כיצד התרופה משפיעה עליך.

ורפרס SR 240 עלולה לגרום לסחרחורת בחלק מהאנשים, במיוחד בתחילת הטיפול.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה כ-35 מ"ג נתרן (מרכיב עיקרי במלח בישול/שולחן) בכל קפלייה. זה שווה ערך ל-%1.75 מהצריכה היומית המרבית המומלצת של נתרן למבוגר.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבלוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע לימינו ואופן הטיפול בתרופה.
הימינו ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.
אין לעבור על המנה המומלצת.

ילדים: ורפרס SR 240

אינה מיועדת לילדים.

צורת הנטילה:

יש לבלוע את התרופה עם כוס מים, עם הארוחה.
ניתן לחצות את הקפלייה. במקרה של חציית קפלייה, יש להשלך את חצי הקפלייה שאינה מיועדת לשימוש מייד.

אסור לעלוס/לכתוש את הקפלייה מאחר שזו תרופה בשחרור מושהה.

אם הפועה תרופה לזואי, אם אתה מתופעת לזואי מחמירה
או כאשר אתה סובל מתופעת לזואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לזואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לזואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לזואי, או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור ומחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמונע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: אין לאחסן מעל 25°C. יש לאחסן את הקפלויות באריזת המגש (בליסטר) המקורית היות שהתכשיר רגיש ללחות. במקרה של חציית קפלייה, יש להשלך את חצי הקפלייה שאינה מיועדת לשימוש מייד.

אין להשלך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשלך תרופות שאינן בשימוש עוד.
אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium alginate, microcrystalline cellulose, povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), indigo carmine aluminum lake (E132), carnauba wax.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קפלייה בצבע ירוק בהיר עם קו חצייה בשני הצדדים.
גודלי אריזה מאושרים: 10, 30 קפלויות. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

נערך במרץ 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 0068-63-26427-00
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

יצרן ובעל רישום: דקסל® בע"מ

רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל

תופעות לזואי נוספות יכולות להופיע בנטילת **ורפרס SR 240** למשך זמן ארוך.
ספר לרופא בהופעת נפיחות בחניכיים שמתחילה להתפשט על פני השיניים, נפיחות בשדיים (גברים), יצירת חלב (גברים ונשים). תופעות אלה נדירות וחולפות בהפסקת טיפול.