

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

فيرابريس SR 240

حبسولات ذات إطلاق مستديم

كل حبسولة تحتوي على: فير إياميل هيدروكلوريد (Verapamil hydrochloride) 240 ملغ.

المواد غير الفعّالة والمُسْتَأرجات في الدواء – انظر للبنّد 6 "معلومات إضافية" وللبنّد 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء"

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لك. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم إذا بدا لك أن وضعهم الطبي مماثل.

1. لأي غرض مُخصّص الدواء؟

لعلاج فرط ضغط الدم المعتدل حتى المتوسط.
لعلاج ومنع الذبحة الصدرية (angina pectoris).

الفصلية العلاجية: حاصر قنوات الكالسيوم.

حاصرات قنوات الكالسيوم تغيّر كمية الكالسيوم التي تدخل لداخل خلايا العضل بالقلب والأوعية الدموية. هذا من شأنه أن يغير القوة والسرعة التي يقذ بها القلب. كذلك يوسع الأوعية الدموية مما يمكن الدم من التدفق باليسر بسهولة أكبر. هذا يساعد في وصول كمية أكبر من الأوكسجين لعضل القلب ويستطيع خفض ضغط الدم.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجي) للمادة الفعّالة (فير إياميل هيدروكلوريد) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبنّد 6)
- كنت تعاني من صدمة قلبية (cardiogenic shock – انخفاض خطير يتدفق الدم)
- عانيت مؤخرًا من نوبة قلبية مع حدوث مضاعفة من نبض بطيء
- كنت تعاني من ضغط دم منخفض جدًا أو من قصور في البطين الأيسر
- كنت لا تحمل ناظفة قلبية فعّالة وكنت تعاني من إحصار في نظام التوصيل الكهربائي للقلب من الدرجة الثانية أو الثالثة أو من متلازمة العقدة الجيبية المريضة (sick sinus syndrome)
- كنت تعاني من إحصار جيبّي أدنبيّ (sino-atrial block)
- كنت تعاني من قصور القلب
- كنت تعاني من نبض بطيء (دون الـ50 دقّة في الدقيقة)
- كنت تعاني من ضغط دم منخفض (القيمة العليا الانقباضي) أقل من 90 ملغ زنبق]
- كنت تعاني من رفرقة أو رجفان أذينيّ المرافق بمرغم إصمائي للتوصيل الكهربائي (على سبيل المثال: متلازمة ولف-باركسونسون-وايت)
- كنت تتناول إيفابريدين (مشاكل القلب)

تحذيرات خاصة متعلّقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بفيرابريس SR 240, أخبر الطبيب إذا:

- كنت حاملًا، تخططين للحمل أو مرضعة.
- كان لديك نبض بطيء بشكل شاذ أو نبض غير منتظم.
- عانيت مؤخرًا من نوبة قلبية.
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكاية.
- كنت تعاني أو عانيت في السابق من مشاكل قلب.
- كنت تعاني من مرض يكون به ضرر بالتوصيل الكهربائي من العضل مثل الوهن العضليّ الوبيل، متلازمة لامبرت-إيتون، حنّ خلّ عضلي متقدم من نمط دوشين.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية، الطبيب أو الصيدلي بذلك، على وجه الخصوص إذا كنت تأخذ:

- حاصرات بيتّا لعلاج ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب (مثل أتينولول، پروپرانولول، ميتوبرولول)
- حاصرات ألفا لعلاج ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب (مثل برازوسين، تيرازوسين)
- مدرات البول
- أدوية المعروفة بالاستاتينات مثل أتورفاستاتين، لوفاستاتين، سيمفاستاتين، المستعملة لخفض مستويات الكولسترول
- أي دواء آخر لعلاج ضغط الدم المرتفع أو النبض الغير منتظم (اضطراب النظم) مثل كوينيدين، فليكانيد، ديسوبراميد، ديجوكسين، ديجيتوكسين
- دابيجاتران (دواء لمنع تكوين جلطات دموية)
- أدوية تحتوي على إيفابريدن لعلاج أمراض قلب معينة (انظر أيضًا للبنّد 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا")
- أدوية لعلاج الاكتئاب (تشمل المستحضر النباتي St. John's wort)، الفلق أو الأذنان. هذه من الممكن أن تشمل إلمبيرامين، بوسپرون، ليثيوم
- أدوية المعروفة بمضخّات جهاز الناعة، مثل سيكلوسبورين، سيروليموس، إيفروليموس، تاكروليموس. تستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة

- جليبنغلاميد، يستعمل لعلاج أنواع معينة من السكري
- أسبيرين، مسكن اللآلام الذي هو مضاد للالتهاب غير ستيرويدي (NSAID) الذي يستعمل لتسكين الآلام وخفض الحرارة
- الموتريبيتان، يستعمل لعلاج الشقيقة
- ميدازولام، يستعمل كمادة مهدنة أو منومة
- نيوفيلين، يستعمل لعلاج الربو
- دوكسوروبيسين، دواء لعلاج السرطان
- سيميتيدين، يستعمل لعلاج صعوبات الهضم أو القرعات في المعدة
- ريفامبيسين، يستعمل لعلاج السل وأنواع أخرى من العدوى
- كاربامازيبين، فينيتوين أو فينوباربيتال (فينوباربيتون). هذه الأدوية تستعمل كمضادة للاختلاجات
- ريفتونايفر، يستعمل لعلاج فيروس العوز المناعي البشري (HIV)
- إريثروميسين، كلاريثروميسين، تيليثروميسين، تستعمل لعلاج أنواع معينة من العدوى
- كولثيسين أو سولفينيزازون، يستعملان لعلاج القرص

أخبر طبيب الجراحة أو طبيب الأسنان أنك تتناول فيرإبريس SR 240 إذا كان من المخطط إجراء عملية جراحية، لأنه من الممكن أن يؤثر على مادة التخدير التي يستعملونها.

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء بغير طعام مع الوجبة. لا يجوز شرب عصير الجريب فروت أثناء استعمال الدواء لأن ذلك قد يؤثر على امتصاصه. هذا الوضع لا يحدث مع عصائر فواكه أخرى مثل عصير البرتقال، التفاح أو البندورة.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

فيرابريس SR 240 يبطئ الوقت الذي يتطلبه جسمك لتفكيك الكحول. معنى ذلك أن كمية قليلة من الكحول تزيد من مستوى الكحول في الدم فوق المستوى المسموح به للسياقة. بالإضافة لذلك، يستغرق وقتًا أكثر حتى تفيق من سكرك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملًا، تخططين للدخول في الحمل أو مرضعة، استشيري طبيبك.

السياقة واستعمال الآلات

لا يجوز السياقة، تشغيل الآلات أو القيام بأي نشاط الذي يستوجب اليقظة حتى تعلم كيف يؤثر الدواء عليك.

قد يؤدي فيرإبريس SR 240 لدوخة لدى بعض الأشخاص، بالأخص ببداية العلاج.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على ما يقارب 35 ملغ صوديوم (مركب أساسي يملح الطعام/ الطاوله) بكل حبسولة. هذا يعادل 1.75 % من الاستهلاك اليومي الأقصى الموصى به من الصوديوم للبالغ.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائمًا استعمل الدواء وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة وطريقة العلاج تُحدّدان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

الأطفال: فيرإبريس SR 240 غير مُخصّص للأطفال.

طريقة تناول:

يجب بلع الدواء مع كأس من الماء، مع الوجبة.

بالإمكان شطر الحبسولة. في حال شطر الحبسولة، يجب رمي نصف الحبسولة الغير مخصّص للاستعمال الفوري.

ممنوع صنع/ سحق الحبسولة لأن هذا الدواء هو ذو إطلاق مستديم.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر

إذا أفرطت في تناول الحبة جرعة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول جرعة فور تذكرك، إلا إذا حان تقريبًا موعد تناول الجرعة التالية. في هذه الحالة، تخطئ الجرعة التي نسيتها. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المتابعة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا قمت بالتوقف عن تناول الدواء

إذا قمت بالتوقف عن تناول الدواء قد يحدث تدهور في وضعك.

لا يجوز تناول أدوية في الظام! **تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

إذا كنت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدليّ.

4. الأعراض الجانبية

كما في أيّ دواء، قد يسبب استعمال فيرإبريس SR 240 أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجه فورًا إلى الطبيب عند ظهور الأعراض الجانبية التالية:

- اصفرار الجلد أو العينين، حتى أو حساسية حول منطقة البطن. هذه علامات لخلل في وظيفة الكبد.
- حققان (إدراك لدقات القلب)، ألم في الصدر الذي يظهر لأول مرة أو ألم في الصدر الذي يظهر في أحيان أكثر تواترًا، انتفاخ بالكاحلين، شعور بالسخونة وألم في اليدين أو في القدمين.
- انتفاخ بالأطراف
- صعير في التنفس، صعوبات تنفس، انتفاخ في الفم، الشفتين أو اللسان أو طغف وخيم في الجلد، التي تظهر بشكل غير متوقّع

العرض الجانبي الأكثر شيوعًا هو الإمساك.

أعراض جانبية إضافية تشمل: نبض غير منتظم، احمرار الوجه أو الرقبة، آلام رأس، غثيان أو تقيؤ، ألم أو الشعور بعدم الراحة في البطن، دوخة، دوار (vertigo)، رنين في الأذنين (طنين)، تعب، ارتجاف، اضطرابات في الحركة، ضعف عضلات الأم في المفاصل *و/* أو في العضلات، طغف أو حكة في الجلد، شعور بالسع في الجلد، حُدْر، تساقط شعر. من الممكن أن تحدث عتانه (ضعف جنسي) لدى الرجال بشكل نادر.

أعراض جانبية إضافية من الممكن أن تظهر عند تناول فيرإبريس SR 240 لفترة زمنية طويلة. **اعلم الطبيب** عند ظهور انتفاخ في اللثة الذي يبدأ بالانتشار على سطح الأسنان، انتفاخ في الثديين (لدى الرجال)، انتاج حليب (رجالًا ونساءً). هذه الأعراض نادرة وتنعضي عند إيقاف العلاج.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "بمّيووح علّ معلومات لرواي عقب تسيول ترفوتي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال *و/أو* الرضع ومجال نظرهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب.

- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (**تأريخ تפוגה**) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25 درجة مئوية. يجب تخزين الحبسولات في عبوة شريط الحبسولات (blister) الأصلية لأن المستحضر حساس للرطوبة. في حال شطر الحبسولة، يجب رمي نصف الحبسولة الغير مخصّص للاستعمال الفوري.
- لا يجوز رمي الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة القمامة البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية رمي الأدوية التي ليست قيد الاستعمال. هذه الوسائل تساعد في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة يحتوي الدواء أيضًا على:

Sodium alginate, microcrystalline cellulose, povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), silica colloidale anhydrous, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E102), indigo carmine aluminum lake (E132), carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

حبسولة بلون أخضر فاتح مع خطٍ شطر بكتنا الجهتين.

أحجام العبوة المصداق عليها: 10، 30 حبسولات. قد لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوّقة.

تم التنقيح في آذار 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 068-63-26427-00 للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض.

شارع دكسل 1، أور عكيفا 3060000، إسرائيل