

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול
בתרופה ללא התיעցות עם הרופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התיוות והמנה בכל
פעם שהינך נוטל תרופה. הרכוב משקפיים אם הין זוקן
לهم.

אם ש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,
היויעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:
כמו בכל תרופה, השימוש בסינטומיצין 3% עלול לגרום
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה
רשימת תופעות הלואו. יתכן שלא מסבול מכך אף אחת
מן.

אם מופיעות תופעות הלואו הבאות, יש לפנות לרופא
מיד:
תגובה אלרגית כלול: חום, פריחה, נפיחות בפה, בפנים,
בשפתיים, פצעים בפה אוocab גורן האגרומים לקשי' בילעה
או נשימה, נפיחות בידים, ברגליים או בקרסולים.
אם מופיעות תופעות הלואו הבאות, הפסיק את הטיפול
ופנה לרופא:

ירידה בספרית הדם המתבטאת בחום,ocab גורן, עיפות,
דימום, חולשה או תגבה של רגשות יתר המתבטאת
באדמוניות, גירוי, פריחה, גירוד, נפיחות או דלקת
מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר), דימום
או חבלה בבלוט.

אם לאחר תום הטיפול מופיעות תופעות הלואו הבאות
לראשונה, פנה לרופא מיד:
חום,ocab גורן.
אם מופיעת תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואו
מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה
בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איז לאחסן את התרופה?
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות
לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקף טיפול
תרופת" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (באנגלית: www.health.gov.il) המפנה לתופס המוקן לדיווח על
תופעות לוואי, או ידי כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il>

6. מידע נוסף:
מן הרעלת! תרופה זו, וכן תרופה אחרת יש לשמר
במקומות סגור מחוץ להישג ידם וווער ראיתם של ילדים/או
תינוקות ועל ידי כך תמנע הרשלה. אל תגרום להקה לא
הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחריה תאריך הת滂גה (Exp. Date)
הופיע על גבי הארזה. תאריך הת滂גה מתייחס ליום
האחרון של אותו חדש.

7. לאחסן מתחת ל-25°C.
אין להשילר תרופות לבוב או לפסולות הביתיות. שאל את
הרופא איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים
אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

8. מידע נוסף:
נוסף על המרכיבים הפוטיים המרכיבה מכילה גם:
Petrolatum yellow (paraffin, yellow soft), Lanolin (wool fat), Mineral oil (paraffin liquid), Silica, colloidal anhydrous

כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארץיה:
בכל ארזה שופורת המכילה 10 גרם משחה בעקב צהוב.
שם בעל הרישום והיצרן וכנותבו:
טבע ישראלי בע"מ,

ר' דבורה גרביה, 124, תל אביב 6944020
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי:
במשרד הבריאות:

טלפון זה נערך בימי 2022 בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.

עלון זה נערך ביום רביעי 20.11.2022 בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.
לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר.
על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

עלון לצרכן לפי תקנות הרווקחים (תקשירים)

התש"מ"ז - 1986

התropa מהשווקת על פי מרשם רופא בלבד

סינטומיצין 3%

משחת עור

הרוכב

Chloramphenicol 3% למינע על מרכיבים בלתי פעילים וארגניים ראה פרק

2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"
ופרק 6 – "מידע נסוף".

קיים ביעין את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכל מידע תමית על התרופה. אם יש לך שאלות

נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו מחייבת טיפול עברוך. אל תעביר אותה לאחרים.
היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרופאי

דומם.

1. لما מיועד התרופה?
טיפול בייחומי עור שוחחים הנגרמים על ידי מיקרואורגניזמים
ורישים לכולםניוקול.

קובזה רפואיית

אנטיבקטרילי לשימוש מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה זו אמ:
אין להשתמש בתרופה זו:

- אתה רגיש (אלרגי) לכולםניוקול או לכל אחד מהמרכיבים הנוגאים לשימוש התרופה (אהה בהמשך הפרק "מידע חשוב על חלק מהרכיבים התרופה" ובפרק 6 "מידע נסוף").
- לך או למשחו מבני משפחתך יש עבר של אנמיה, דימום או בעיות אחרות במערכת הדם.

اذירות מיחדות נוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם הין סובל או סבלת
בעבר מלקי' בתפקוד מה העצם.
התcsiיר מיליכו כולםניוקול העולול לגורם לשוניים בתמונה
הדם בשימוש ממושך. לפיכך, יש להימנע משימוש ממושך
בתcsiיר. התcsiיר אינם מיועדים לשימוש בעניינים, אין לתת לתוכשר
לבוא בפגיעה ענן. בקרה של מגע עם העניינים, יש לשטוף
מיד עם מים.

תגובה בי-תרופתית
אם אתה לוקה, או אם לך כתה לאחרונה, תרופות אחרות
כולל הרופאות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על
רופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקה בתרופות המדכאות
את תפקודו של מה העצם (תרופות העולילות לגורם
בכדיות הדם האדומות, הלבנות או בטסיות).

הירין וננקה
אם הירך ברוירין או מניקה, אין להשתמש בתרופה מבל'
להוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול.

מידיע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
התרופה מכילה את המרכיב לולין (Lanolin) אשר עלול
לגרום לדלקת עור (למשל לדלקת עור מגע).

3. כיצד משתמש בתרופה?

יש לשמש בתcsiיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אין בטוח בוגע
למיון ולאופן הטיפול בתcsiיר.

המיןון ואופן הטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד.
מיןון מוקובל בהעדדר הוראה אחרת מהרופא:

מרא כמות קטנה של המשחה על האזור הנוגע, 3-4 פעעים בזום.

אין לעורו על המנה המומלצת.
אם לא חל שיפור במצבו תוך מספר ימים, יש לפנות לרופא
שנייה.

שים לב
לא לבלעו תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם בלעת או אם ילד בלע מן המשחה, פנה מיד לרופא
לחדר מין של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש בתרופה
אם שכחת למסחה את המשחה בזמן המיעוד, מורה את
המשחה כשנוצרת, והמשך טיפול כפי שנקבע על ידי
הרופא.