

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالبة (مستحضرات) 1986

يُسوَّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

تيريفلونوميديد تيفع

أقرص مطليّة

التركيبة

يحتوي كل قرص على:

Teriflunomide 14 mg

تيريفلونوميديد 14 ملغ

للحصول على معلومات عن المركبات غير الفعّالة ومسيّبات الحساسيّة انظر البند 2 - "معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

لقد وُصف هذا الدواء من أجلك فقط، لا تعطه للآخرين. قد يضرّهم الدواء حتّى لو بدا لك أنّ حالتهم الطبية مشابهة.

<p>بطاقة معلومات وقائيّة لمتلقّي العلاج</p> <p>بالإضافة إلى النشرة الطبيّة، فإنّ للمستحضر تيريفلونوميديد تيفع توجد بطاقة معلومات وقائيّة لمتلقّي العلاج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقائيّة هامّة يتوجّب عليك معرفتها قبل البدء بالعلاج بتيريفلونوميديد تيفع وخلالّه، ويجب عليك اتّباعها.</p> <p>يجب معاينة بطاقة المعلومات الوقائيّة لمتلقّي العلاج وكذلك نشرة المستهلك الطبيّة قبل البدء باستعمال الدواء.</p> <p>يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمعاينة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.</p>

1. لأي غرض مخصّص هذا الدواء؟

تيريفلونوميديد تيفع يحتوي على المادة الفعّالة، تيريفلونوميدي، وهو مادة تعمل على جهاز المناعة وتحد من مهاجمته للجهاز العصبي.

تيريفلونوميديد تيفع مخصّص لعلاج البالغين الذين يعانون من التصلّب المتعدّد الانتكاسيّ المتردّد، بهدف تقليل نسبة النوبات وإبطاء تقدّم الإعاقه.

ما هو التصلّب المتعدّد؟

التصلّب المتعدّد (MS) عبارة عن مرض مزمن يؤثّر على الجهاز العصبي المركزي (CNS). يتكوّن الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي.

في التصلّب المتعدّد، تدمّر العمليّة الالتهابيّة الغلاف الواقي (المسمّى "ميالين") حول الألياف العصبيّة في الجهاز العصبي المركزي. يسمّى فقدان الميالين بـ "زوال الميالين" وهو يخلّ بالعمل السوي للأعصاب.

تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من التصلّب المتعدّد من النوع الانتكاسيّ نوبات متكرّرة من الأعراض البدنيّة الناتجة عن عدم عمل الأعصاب بصورة صحيحة.

تختلف هذه الأعراض من مريض إلى آخر لكنّها ترتبط عادةً بـ:

- صعوبة في المشي.
- مشاكل في الرؤية.
- مشاكل في التوازن.

قد تختفي الأعراض تمامًا تمامًا بعد انتهاء النوبة، لكن مع مرور الوقت، قد تستمرّ مشاكل معيّنة في الفترة التي ما بين النوبات، وقد تسبّب تعقّيدات بدنيّة بإمكانها أن تعيق نشاطاتك اليوميّة.

كيف يعمل تيريفلونوميديد تيفع؟

يساهم تيريفلونوميديد تيفع في حماية الجهاز العصبي المركزي من هجمات الجهاز المناعيّ عن طريق تثبيد الارتفاع في مستوى أحد أنواع خلايا الدم البيضاء (خلايا الليمفاويّة). ويقلّص ذلك العمليّة الالتهابيّة، التي تسبّب ضررًا عصبيًا في التصلّب المتعدّد.

الفصيلة العلاجيّة:

ينتمي المركّب الفعّال، تيريفلونوميدي، إلى فصيلة الأدوية المثبّطة للجهاز المناعيّ بشكل انتقائيّ.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسيّة (حساس) للمادة الفعّالة، تيريفلونوميدي أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").
- سبق أن أصبت في الماضي بطغح جلدي شديد أو تقشّر الجلد، حويصلات و/أو قروح في الفم، بعد تناول تيريفلونوميديد أو لفلونوميدي.
- كانت لديك مشاكل خطيرة في الكبد.
- كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل أو مرضعة.
- كنت تعاني من مشكلة خطيرة تؤثر على جهازك المناعيّ، مثلاً، نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
- كانت لديك مشكلة خطيرة في نخاع العظم، أو إذا كان لديك انخفاض ملحوظ في مستويات خلايا الدم الحمراء أو البيضاء أو انخفاض في مستوى صفائح الدم.
- كنت تعاني من تلوّث خطير.
- كانت لديك مشاكل خطيرة في الكلية تتطلب الديال.
- كان لديك مستويات منخفضة جدًّا للبروتينات في الدم (نقص بروتين الدم).

إذا لم تكن متأكدًا، أو إذا توفّرت لديك أسئلة بالنسبة لاستعمال هذا الدواء، فكلمّ طبيبك أو الصيدليّ قبل استعمال الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء

قبل العلاج بتيريفلونوميديد تيفع، أخبر الطبيب إذا:

- كانت لديك مشاكل في الكبد؛ و/أو كنت معتادًا على استهلاك كميات كبيرة من الكحول؛ سيجري لك طبيبك فحصًا لدم قبل العلاج وخلالّه لفحص وظائف الكبد. إذا أظهرت نتائج الفحص وجود مشكلة في الكبد، فقد يوقف طبيبك العلاج بتيريفلونوميديد تيفع. اقرأ رجاؤ البند 4 - "الأعراض الجانبية".
- كان لديك ضغط دم مرتفع (فرط ضغط الدم)، سواء تمّت السيطرة عليه بواسطة الأدوية أم لا. قد يؤدّي تيريفلونوميدي إلى ارتفاع ضغط الدم. سيفحص طبيبك ضغط دمك قبل بدء العلاج وابتظام خلال فترة العلاج. اقرأ رجاؤ البند 4 - "الأعراض الجانبية".
- كان لديك تلوّث. قبل أن تستعمل تيريفلونوميديد تيفع، سيُتأكد طبيبك من وجود ما يكفي من خلايا الدم البيضاء والصفائح في دمك. وذلك لأن تيريفلونوميديد تيفع يقلّل عدد كريات الدم البيضاء، فإنّ ذلك قد يؤثّر على قدرتك على محاربة التلوّث. بإمكان طبيبك أن يأمّر بإجراء فحوص للدم لفحص مستوى خلايا الدم البيضاء، إذا اعتدت التلوّث. اقرأ رجاؤ البند 4 - "الأعراض الجانبية".
- كنت تعاني من ردود فعل جلدية خطيرة.
- كانت لديك أعراض تنفسية.
- كنت تشعر بضعف، نقص الإحساس، وآلم في اليدين والقدمين.
- كنت على وشك تلقّي لقاح.
- كنت تتناول ليفلونوميديد مع تيريفلونوميديد تيفع.
- كنت تبدأ علاج بتيريفلونوميديد تيفع أو تتوقف عن تناول تيريفلونوميديد تيفع.
- كنت على وشك الخضوع لفحص دم محدّد (مستوى الكالسيوم). قد تشير نتائج الفحص بشكل خاطئ إلى مستويات منخفضة للكالسيوم.

ردود فعل في الجهاز التنفسيّ:

أخبر طبيبك إذا كان لديك سُعال أو ضيق تنفس لا تفسير لهما. قد يجري طبيبك فحصًا إضافيّة.

الأطفال والمراهقون

تيريفلونوميديد تيفع ليس مخصّصًا للأطفال والمراهقين الذين سنّهم دون الـ 18 عاما.

الفحوص والمتابعيّة

قبل البدء بالعلاج بهذا الدواء سيوجهك طبيبك إلى إجراء فحوص للدم وفحص للحمل.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خصوصًا إذا كنت تستعمل أحد الأدوية المفصّلة أدناه:

- لفلونوميدي، ميثوتريكسات وأدوية أخرى تؤثّر على الجهاز المناعيّ (المسمّاة عادةً مثبّطات الجهاز المناعيّ أو منظمّات الجهاز المناعيّ).
- ريفامبيسين (دواء يُستعمل لعلاج السلّ والتلوّثات الأخرى).
- كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينيوتوين (علاج الصرع).
- العرن المقربوب (St. John's wort - نبات طبيّ لعلاج الاكتئاب).
- ريباجليينيد، بيوجليتازون، ناتريلجينيديد أو روزيجلييتازون، لعلاج السكريّ.
- داونوروبيسين، دوكسوروبيسين، باكليتاكسيل أو توبوتيكان، لعلاج السرطان.
- دولوكسينين لعلاج الاكتئاب، عدم السيطرة على التبوّل أو الاعتلال الكلوّي لدى مرضى السكريّ.
- أوسيترون لعلاج الإسهال الحادّ.
- ثيوبوهيلين للربو.

تيزاندين، لإرخاء العضلات.

وارفارين، مستحضر مضاد للتخثّر يُستعمل لتميع الدم (جعله أكثر سيولة) من أجل منع تكوّن خثرات الدم.

- حبوب منع الحمل (التي تحتوي على إيثينيل إيستراديول وليفونورجيستريل).
- سيفالور، بينيزيل بينيسيلين (بينيسيلين G) وسبيروفلوكتاستين للتلوّثات.
- إيندوميثاسين، كيتوروفين للألام والالتهاب.
- فوروسيميد لمرضى القلب.
- سيميتيدين لتقليل الحموضة في المعدة.
- زيدوفودين لتلوّث HIV.
- روروفامستاتين، سيمفامستاتين، أتورفامستاتين، پرافاستاتين لفرط الكوليسترول في الدم (الكوليسترول المرتفع).
- سولفاسالازين لداء الأمعاء الالتهابيّ أو لالتهاب المفاصل.
- كوليستيرامين للكوليسترول المرتفع أو لتخفيف الحكّة عند وجود مرض في الكبد.

• الفحم النشط لتقليل امتصاص الأدوية أو المواد الأخرى.

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو بدون الطعام.

الحمل والإرضاع

الحمل

لا يجوز استعمال تيريفلونوميديد تيفع إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنك قد تكونين حامل. إذا كنت حاملاً أو حملت خلال فترة استعمال تيريفلونوميديد تيفع، فإنّ احتمال ولادة طفل مع عاهات خلقيةّ يزداد. لا يجوز استعمال هذا الدواء لدى النساء في سن الخصوبة دون استعمال وسائل مئوثوق بها لمنع الحمل.

توجّهي إلى الطبيب إذا كنت تخططين للحمل بعد إيقاف العلاج بتيريفلونوميديد تيفع، لأنّ عليك التأكّد من

أنّ الجسم قد تخلّص من معظم المادّة الفعّالة الموجودة في هذا الدواء قبل أن تحاولي أن تحملي. إخراج المادّة الفعّالة من الجسم، بشكل طبيعيّ، قد يستغرق سنين. يمكن تقصير هذه المدّة إلى بضعة أسابيع عن طريق استعمال أدوية معيّنة تعجّل عمليّة إخراج تيريفلونوميديد تيفع من الجسم. على أيّ حال، يجب التحققّ بواسطة فحص الدم من أنّ جسمك قد تخلّص من كمّيّة كافية من المادّة الفعّالة ويجب أن يؤكّد

طبيبك المعالج أنّ مستوى تيريفلونوميديد تيفع في الدم منخفض بما فيه الكفاية ليتيح لك الحمل. للحصول على معلومات إضافية بالنسبة للفحوص المخبريّة، توجّهي إلى طبيبك.

إذا كنت تشكين بأنّك حامل خلال فترة استعمال تيريفلونوميديد تيفع، أو خلال سنتين من لحظة إيقاف العلاج، فتوقفي عن تناول تيريفلونوميديد تيفع وتوجّهي فورًا إلى طبيبك من أجل إجراء فحص للحمل.

إذا أكّد الفحص أنّك حامل، فقد يقرّر طبيبك علاجًا بأدوية معيّنة بهدف إخراج تيريفلونوميديد من جسمك بسرعة وبشكل كاف، لأنّ ذلك قد يقلّل من الخطر على طفلك.

وسائل منع الحمل

إنّك مجبرة على استعمال وسائل فعّالة لمنع الحمل خلال فترة العلاج بتيريفلونوميديد تيفع وبعدها. يبقى تيريفلونوميديد في دمك لفترة طويلة بعد أن تتوقفي عن استعمال الدواء.

استمري باستعمال وسائل فعّالة لمنع الحمل بعد إيقاف العلاج.

• قومي بذلك إلى أن تصبح مستويات تيريفلونوميديد في دمك منخفضة بما فيه الكفاية - سيفحص طبيبك ذلك.

• استشيري الطبيب بخصوص وسيلة منع الحمل الأفضل بالنسبة لك وبخصوص أيّ حاجة محتملة إلى تغيير وسيلة منع الحمل.

الإرضاع

لا يجوز استعمال تيريفلونوميديد تيفع خلال فترة الإرضاع، لأنّ تيريفلونوميدي ينتقل إلى حليب الأم.

السياقة واستعمال الماكينات

قد يسبّب لك تيريفلونوميديد تيفع شعورًا بالدوار ممّا قد يخلّ بقدرك على التركيز والاستجابة. لذلك، إذا شعرت بدوار، فلا يجوز لك السياقة أو تشغيل الماكينات خلال فترة العلاج.

معلومات هامّة عن بعض مركّبات الدواء

يحتوي تيريفلونوميديد تيفع على السكر المسمّى اللاكتوز. إذا أخيرك طبيبك بأنّ لديك عدم تحمّل لسكريّات معيّنة، فاستشر طبيبك قبل استعمال هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على أقلّ من 23 ملغ من الصوديوم في القرص ولذلك فهو يُعتبر خاليًا من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب أن يتمّ العلاج بتيريفلونوميديد تيفع تحت إشراف طبيب خبير في مجال علاج التصلّب المتعدّد. يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب.

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية

يحدد الطبيب فقط الجرعة وطريقة العلاج.

الجرعة الدوائيّة المتبّعة غالبًا هي قرص مطليّ واحد (14 ملغ) في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

كيفية الاستعمال

- تيريفلونوميديد تيفع عبارة عن دواء مخصّص لاستعمال عن طريق الفم، قرص واحد مرّة واحدة في اليوم، في كلّ ساعة من اليوم.
- يمكن تناول القرص مع أو بدون الطعام.
- لا يجوز المضغ! يجب ابتلاع القرص بأكمله مع الماء.
- لا يجوز شطّر الأقراص عند عدم وجود خطّ للشطّر.

إذا تناولت جرعة خطأ دوائية أكبر من اللازم

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واصطحب معك عبوة الدواء. قد تسعر بأعراض جانبيّة كما هو موصوف في البند 4 - "الأعراض الجانبية".

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتياديّ واستشر الطبيب.

يجب المراقبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

حتّى لو طرأ تحسن على حالتك الصحيّة، فلا يجوز التوقّف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقّف عن استعمال تيريفلونوميديد تيفع أو تعيّر الجرعة الدوائيّة دون استشارة طبيبك أو لآ.

لا يجوز تناول الأدوية في العمّة! راجع الملصق وتأكّد من الجرعة في كلّ مرّة تتناول فيها الدواء.
ضع النظارات الطبيّة إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل كلّ دواء، قد يؤدّي استعمال تيريفلونوميديد تيفع إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلقّ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

الأعراض الجانبية الخطيرة

قد تكون بعض الأعراض الجانبية، أو قد تصبح، خطيرة. **توجّه فورًا إلى طبيبك** إذا لاحظت نشوء أحد الأعراض الجانبية الخطيرة المذكورة أدناه:

غير شائعة (قد تؤثر على حتّى شخص 1 من كل 100 شخص)

- التهاب البنكرياس قد تشمل أعراضًا مثل الطغح الجلديّ، الشرى، انتفاخ الشفتين، اللسان أو الوجه، أو صعوبة فحائيّة في التنفّس.
- ردود فعل خطيرة في الجلد قد تشمل أعراضًا مثل الطغح الجلديّ، الحويصلات، ارتفاع الحرارة أو التقرّحات في الفم.
- تلوّثات خطيرة أو تعفّن الدم - إنتان - (سيبسيس - نوع من التلوّث قد يشكّل خطرًا على الحياة)، قد تشمل أعراضًا مثل الحرارة المرتفعة، الارتجاجات، القشعريرة، الانخفاض في تدفق البول، أو الارتباك.
- التهاب في الرئتين قد يشمل أعراضًا مثل ضيق التنفّس أو السعال المتواصل.
- نسبة شوبعها غير معروفة (لا يمكن تحديد انتشارها من خلال المعطيات المتوفرة)**
- مرض خطير في الكبد قد يشمل أعراضًا مثل اصفرار الجلد أو بياض العينين، بول أغمق من المعتاد، غثيان وتقيؤ غير مفسّرين أو ألم في البطن.

أعراض جانبيّة أخرى قد تحدث وفق الوتائر التالية:

أعراض جانبيّة شائعة جدًّا (very common) - أعراض تظهر عند أكثر من مستعمل واحد من

بين عشرة:

- صداع
- إسهال، غثيان
- يظهر ارتفاع في قيم ALT (ارتفاع في مستويات إنزيمات كبدية معيّنة في الدم) في فحوص الدم
- انخفاض في كثافة الشعر
- أعراض جانبيّة شائعة (common) -** أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:
- إنفلونزا، عدوى في المسالك التنفسيّة العلويّة، عدوى في المسالك البوليّة، التهاب الشّعب الهوائيّة، التهاب الجيوب الأنفيّة، ألم في الحجرة وانزعاج عند البلع، التهاب في المثانة البوليّة، التهاب فيروسي في المعدة والأمعاء، هريس الفم، عدوى في السن، التهاب الحجرة، تلوّث فطريّ في الرجل
- القيم المخبريّة: شوهد انخفاض في عد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تغيرات في نتائج فحوص وظائف الكبد وعدّ خلايا الدم البيضاء (انظر البند 2)، وكذلك ارتفاع في إنزيم العضل (كرياتين فوسفوكيناز)
- ردود فعل تحسّسيّة معتدلة
- شعور بالقلق
- شعور بالتئمّل (كوخز الإبرة)، شعور بالضعف، اندعام الإحساس، اللسع أو الألم أسفل الظهر أو في الرجل، اندعام الإحساس، اللذع، اللسع أو الألم في راحتي اليدين والأصابع (متلازمة النفق الرسغيّ)
- الشعور بالخفقان
- ارتفاع ضغط الدم
- غثيان (تقيؤات)، آلام في الأسنان، ألم في الجزء العلويّ من البطن
- طفح جلديّ، حبّ الشباب
- آلم في الأوتار، المفاصل، العظام، آلام في العضلات (آلام في العضلات والهيكل العظميّ)
- الحاجة إلى التبوّل في أحيان أكثر تقاربًا من المعتاد
- دورات طمث تتميّز بنزيف شديد
- آلم
- نقص الطاقة أو الشعور بالضعف
- نقصان الوزن

أعراض جانبيّة غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1.000:

- انخفاض في عدد الصفائح (قلّة الصفائح)
- شعور متزايد أو حساسيّة مفرطة خصوصًا في الجلد، الشعور بطمن أو ألم على شكل نبض على طول مسار عصب واحد أو أكثر، مشاكل في أعصاب الذراعين أو الرجلين (اعتلال الأعصاب المحيطيّ)
- مشاكل في الأظافر، أعراض جلدية خطيرة.
- آلم بعد صدمة (تآل للصدمة)
- الصدفية
- التهاب في الفم أو في الشفتين
- مستويات استثنائية من الدهون (ليبيدات) في الدم
- التهاب في الأمعاء (التهاب القولون)
- أعراض جانبيّة نادرة (rare) –** أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 10,000:
- التهاب أو تضرّر الكبد

أعراض جانبيّة انتشار غير معروف (أعراض لم يتمّ تحديد انتشارها بعد):

• فرط ضغط الدم المزني

إذا ظهر عرض جانبيّ، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبيّ لم يُذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبيّة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبيّة عيب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن أعراض جانبيّة، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: **https://sideeffects.health.gov.il**

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- تجنب التسمّم! هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضّع ومجال رؤيتهم، وبذلك تمنع التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp. Date) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان جافّ، في درجة حرارة أقلّ من 25°C.**
- بالنسبة لعبوة القنيّنة، يمكن استعمال الدواء بعد فتح القنيّنة لأول مرّة حتّى تاريخ انتهاء الصلاحية.
- لا تلقّ أيّ دواء في مياه الصرف الصحيّ أو النفايات البيئيّة. اسأل الصيدلي الخاصّ بك عن كيفية التخلّص من الأدوية التي لم تعدّ قيد استعمالك. ستساهم هذه الخطوات في الحفاظ على جودة البيئية. انتبه: تحتوي القنيّنة على ماصّ للرطوبة. لا يجوز البلع! يجب إبقاء الماصّ داخل القنيّنة وإغلاق القنيّنة جيّدًا بعد كلّ استعمال!

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Lactose monohydrate, starch, microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, sodium stearyl fumarate, hypromellose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, talc, polyethylene glycol, colloidal silicone dioxide, FD&C Blue#2 / indigo carmine aluminum lake

كيف يبدو الدواء وما هو محتوّى العبوة:

قرص مستدير وأزرق، طبع على أحد جانبيه "TV" وطُبع على الجانب الآخر "Y12".

تحتويّ العبوة على 28 أو 30 قرصًا.

قد لا تُسوّق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب الإمتياز والمنتج وعنوانه:

تيفع إسرانيل م.ض.

شارع دقّورا هنيّنا 124، تل أبيب 6944020

للإحابة عن الاستفسارات: 03-6864212

تمّ تحرير هذه النشرة في كانون الأوّل 2021 وفق تعليمات وزارة الصحة.

لا تشتمّل هذه النشرة على جميع المعلومات التي تخصّ المستحضر. إذا كان لديك أيّ استفسار أو إذا كنت غير متأكد من شيء ما، فتوجّه رجاءً إلى الطبيب.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة: 161.57.35259

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

Teriflunomide PIL MW0322

teva