بطاقة للمتعالج

إريڤيدج يمكن أن يضر أو يسبب موت الجنين.

على المتعالجات القادرات على الحمل:

- إستعمال نوعين من وسائل منع الحمل الموصى بها (يجب أن تكون إحداهما وسيلة عازلة والثانية وسيلة منع عالية النجاعة) بشكل دائم أثناء العلاج ولمدة 24 شهرًا بعد تناول آخر جرعة (يرجى مراجعة كتيب برنامج منع الحمل لإريڤيدج لمزيد من المعلومات)
- يجب إجراء اختبار الحمل مرة واحدة في كل شهر لمراقبة الحمل

على المتعالجين الرجال:

- استخدام واقي العضو الذكري بانتظام (مع مبيد النطاف، إن أمكن) أثناء ممارسة العلاقة الجنسية مع امرأة أثناء العلاج ولمدة شهرين بعد تناول آخر جرعة
- عدم التبرع بالحيوانات المنوية أثناء العلاج ولمدة شهرين بعد تناول آخر جرعة

تحدث إلى طبيبك على الفور إذا تأخرت الدورة الشهرية لديك أو لدى شريكتك في العلاقة الجنسية، هنالك شك لوجود حمل أو وجد حمل.

- المتعالجات- استشيري طبيبك وتوقفي عن تناول إريڤيدج على الفور إذا كنت تشكين بأنك حامل أثناء العلاج بإريڤيدج ولمدة 24 شهرا بعد تناول آخر جرعة
- المتعالجين- استشر طبيبك إذا كانت شريكتك تشك بانها حامل خلال تناولك إريڤيدج ولمدة شهرين بعد تناول آخر جرعة

على جميع المرضى:

- يمنع التبرع بالدم أثناء العلاج ولمدة 24 شهراً بعد تناول آخر جرعة.
- لا تعطي هذا الدواء لأي شخص آخر.

يمكن الحصول على تعليمات دقيقة من خلال نشرة المستهلك على موقع وزارة الصحة او على موقع شركة روش www.roche.co.il.

يمكنك التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة باستخدام النموذج عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة www.health.gov.il أو عن طريق تصفح الرابط: https://sideeffects.health.gov.il/ أو لشركة "روش" على عنوان البريد الإلكتروني: Israel.DrugSafety@roche.com

أرقام هواتف الطوارئ: _____

تمت المصادقة على صيغة ومحتوى البطاقة من قبل وزارة الصحة في أيار 2021