

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986**
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

# טמוקסיפן טבע 20 מ"ג

**טבליות מצופות**

**הרכב:**

טמוקסיפן (כמלח ציטראט) 20 מ"ג
Tamoxifen (as citrate) 20 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראי סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

**קראי בעיון על העלון וסופו בטרם תשתמשי בתרופה.**
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פני אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך.
אל תעבירי אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

**התרופה אינה מיועדת לילדים.**

### 1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בסרטן השד.

**קבוצה תרופוטיית:** נוגדי אסטרוגנים.

אסטרוגן הינו חומר טבעי בגוף הידוע להרומון מין'.
חלק מסרטני השד זקוקים לאסטרוגן כדי לגדול.
טמוקסיפן טבע 20 מ"ג פועל על ידי חסימת ההשפעות של אסטרוגן.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- הינך בהריון או חושבת שאת עלולה להיות בהריון (ראי סעיף 2 - "הריון והנקה").
  - את גרישה (אלרגית) לטמוקסיפן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראי סעיף 6 - "מידע נוסף").
  - את נוטלת את התרופה אנסטרוזול (Anastrozole).
  - סבלת בעבר מבעיות בקרישת הדם מסיבה לא ידועה.
  - אחד מבני משפחתך סבל בעבר מבעיות בקרישת הדם מסיבה לא ידועה.
  - הרופא אמר לך שיש לך מחלה תורשתית שמגדילה את הסיכון לקרישת דם.
- אל תטלי את התרופה אם אחד מהמצבים הללו חל עלייך. אם אינך בטוחה, פני לרופא או לרוקח לפני לקיחת התרופה.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה**

יש להיוועץ ברופא לפני נטילת טמוקסיפן טבע 20 מ"ג.

בייתוח לשחזור השד שהתעכב (שבוועת עז שנים לאחר ניתוח השד הראשוני כאשר רקמה משלך מועברת לתיצוב שד חדש), טמוקסיפן טבע 20 מ"ג עלול להגביר את הסיכון של היווצרות קרישי דם בתוך כלי דם קטנים בקרומה, דבר אשר עלול להוביל לסיכונים.
אם יש לך היסטוריה של אנגיודמה תורשתית, עלייך לדעת שטמוקסיפן טבע 20 מ"ג עלול להחמיר את הסימנים של אנגיודמה תורשתית. אם את חווה ירידות בפינים, שפתיים, לשון ו/או גרון עק קושי בבליעה או בנשימה, פני לרופא מיידי.

**תגובות עוריות חמורות**

תגובות עוריות חמורות כגון תסמונת סטיבנס ג'ונסון ו- toxic epidermal (TEN) necrolysis דיווחו בזמן נטילת טמוקסיפן טבע 20 מ"ג. יש להפסיק את השימוש בטמוקסיפן טבע 20 מ"ג ולפנות מיידי לרופא אם את מבחינה בסימנים התגובות טבע (ראי בפרק 4).

**ילדים ומתבגרים**

תרופה זו אינה מיועדת לילדים.

**ניתוחים**

אם את עומדת לעבור ניתוח ממוכן, יש להודיע לרופא או לרוקח, ייתכן שהם ירצו לשקול הפסקת הטיפול לזמן קצר.

**תגובות בין תרופתיות**

**אם את לוקחת או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזוןה ספרי על כך לרופא או לרוקח.**
זאת מכיוון שטמוקסיפן טבע 20 מ"ג עלול להשפיע על אופן פעולתן של חלק מהתרופות וחלק מהתרופות עלולות להשפיע על טמוקסיפן טבע 20 מ"ג.

- במידת יש לספר לרופא או לרוקח אם את לוקחת:
- גלולות למינעת הריון
- טיפול הורמונלי חלופי (HRT)
- נוגדי דיכאון (גושן פארוקסטיין, פלוואוקסטיין)
- בופרופין (משמש כנוגד דיכאון או כאמצעי עזר להפסקת עישון)
- כינוין (משמש לטיפול בהפרעות קצב הלב)
- סינאקלצט (לטיפול בפרנסות בבלוטת יותרת התריס)
- תרופות לדילול הדם כגון ואפרפרי. מוכרות גם כתרופות נגדות קרישה
- ריפאופיין המשמש לטיפול בשחפת
- תרופות הידועות כ"מעכבות אורומאז" המשמשות לטיפול בסרטן השד. תרופות אלה כוללות אנסטרוזול, לטרזול ואקסמסטן.

**מניעת הריון**

נשים שיכולות להיכנס להריון צריכות להשתמש באמצעי מניעה לא הורמונליים נאותים (למשל, אמצעי מניעה מכניים) במהלך הטיפול בטמוקסיפן טבע 20 מ"ג ובמשך 9 חודשים נוספים לאחר הפסקת הטיפול.

**הריון והנקה**

אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת הריון היועצי ברופא או ברוקח לפני נטילת התרופה.

**הריון**

אל תשתמשי בטמוקסיפן טבע 20 מ"ג אם הינך בהריון כיוון שזה יכול להשפיע על העובר.

- יש להמנע מניסה להריון ומהנקה בזמן נטילת טמוקסיפן טבע 20 מ"ג ולמשך 9 חודשים לאחר הפסקת נטילת התרופה.
- מכיון שאסור להיכנס להריון במהלך השימוש בטמוקסיפן טבע 20 מ"ג, יש להיוועץ ברופא לגבי שימוש באמצעי מניעה מתאימים מאחר שיעילותם של חלק מאמצעי המניעה עלולה להיות מושפעת כתוצאה משימוש בטמוקסיפן טבע 20 מ"ג.
- עלייך לפנות לרופא מיידי במקרה של חשד להריון לאחר תחילת נטילת טמוקסיפן טבע 20 מ"ג.

**הנקה**

אם את מניקה, עלייך להתייעץ עם הרופא לפני לקיחת טמוקסיפן טבע 20 מ"ג.

**הגיהה ושימוש במכונות**

טמוקסיפן טבע 20 מ"ג לא צפוי להשפיע על היכולת שלך לנהוג או להשתמש בכל כלי או מכונות. יחד עם זאת, המשתמשים בטמוקסיפן טבע 20 מ"ג דיווחו על עייפות, ולכן יש לפעול בחירות בזמן הגיהה או הפעלת מכונות כל עוד תופעות אלו נמשכות.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נוטלת נתרן.

### 3. כיצד תשתמשי בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**אופן השימוש בתרופה:**

אסור לכתוש או ללנסות את הטבליות ומאז כדי למצטע חשיפה לחומר הפעיל מחשש לתופעות לוואי. יש בלוע הטבליות עם הרבה מים.

ניתן להצות את הטבליה בקו חצי.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לצור קשר באופן מיידי עם הרופא או הרוקח.

**אם שכחת לטולת את התרופה**

• אם שכחת לטילול תרופה זו בזמן המיועד, יש לטילול מנה מיידי כשנזכרת, אך אם מועד נטילת המנה הבאה קרוב, יש לדלג על המנה שהחסרת.

- אין לטילול מנה כפולה (שתי מנות באותו הזמן) על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אין לטילול תרופות בחושה! בדקי התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטלת תרופה. הרכיבי משקפיים אם הינך זקוקה להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועצי ברופא או ברוקה.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטמוקסיפן טבע 20 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבלי מאף אחת מהן.

- אם את מבחינה באחת מתופעות הלוואי הבאות, ייתכן שתזדקקי לטיפול רפואי דחוף:
- תסמינים של קריש דם כגון נפיחות של שקוע או הרגל, כאבים בחזה, קוצר נשימה או הרגשת חולשה פתאומית.
- תסמינים של שבץ הכוללים התפרצות פתאומית של התופעות הבאות: חולשה או שיתוק של הידיים או הרגליים, חוסר יכולת להזיז את הידיים או הרגליים, קושי תפאומי בדיבור, בהליכה, באחיזת דברים או קושי בחשיבה. תסמינים אלו נגרמים עקב ירידה באספקת הדם למוח.

- קושי נשימה.
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון אשר עלולה להקשות על הבליעה.
- נפיחות בידיים, ברגליים ובקטסוילים.
- פריחה אלרגית (המכונה ספרדת או חרלת).
- פריחה חמורה עם שלפוחיות, קילוף של העור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים.
- פריחה חמורה זו יכולה להופיע לאחר חום ותופעות דמויות שפעות. (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, toxic epidermal (TEN) necrolysis). תופעות לוואי אלו מרחחשות לעיתים נדירות.
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון, קושי בבליעה או קושי בנשימה (אנגיודאמה). טמוקסיפן טבע 20 מ"ג עלול לגרום או להחמיר את התסמינים של אנגיודאמה תורשתית.

**יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:**

דימום לא רגיל מהנרתיק.

מחזור לא סדיר, במיוחד אם נוסף על כך דימום כבד, כיוון שזה עלול להיות סימן אזהרה עבור סוג מסוים של סרטן הרחם (סרטן רירית הרחם).

- הפרשות מהנרתיק.
- תחושה של אי נוחות בבטן התחתונה (אזור אגן הירכיים) כגון כאב או לחץ.
- תופעות אלה עלולות להראות כי חלו שינויים ברירית הרחם. לפעמים תופעות אלה חמורות ויכולות לכלול סרטן. הן יכולות לקרות במהלך לא

לאחר טיפול עם טמוקסיפן טבע 20 מ"ג.

**תופעות לוואי נוספות:**

**שיכוחות מאוד (עלולות להשפיע על יותר מ-1 מתוך 10 מטופלות)**

• בחילה • אצירת נוזלים • פריחה בעור • גלי חום • עייפות • דיכאון

**שיכוחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 מטופלות)**

• אנמיה (בעיה בדם שמשמעותה פחות מדי כדוריות דם אדומות) • שינויים בראייה עקב קטקסט (עכירות בעדשת העין) או שינויים ברשתית של העין • עלייה ברמות של שומנים בדם (ניתן לראות בבדיקות דם) • תגובות אלרגיות • התכווצויות ברגליים • שינויים ברחם (כולל שינויים ברירית וגידולים שפירים) • כאב ראש • סחרחורת • גרוד באיברי המין • דיילול של השיער • הקאה • שלשול • עצירות • שינויים בבדיקות דם של תפקודי כבד • היווצרות של תאי שומן תכבד • כאבי שרירים • שינויים תחושתיים (כולל ליקוי בחוש הטעם וחוש הריח) או חוסר תחושה או עקצוץ בעור) • סיכון מוגבר לקרישי דם (כולל קרישי דם בתוך כלי דם קטנים)

**לא שיכוחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 מטופלות)**

• בעיות בדם. עלול לגרום לקבלת סימני חבורות ביתר קלות, לזיהומים חמורים או שתרגשי עייפות רבה או חסרת נשימה

• שינויים בראייה וקושי בראייה

• נפיחות של הלבלב (עלול לגרום לכאב בימני עד חמור בבטן)

• שינויים כבמות הסיזן בדם (הסימנים הם הרגשת בחילות קשות, הקאות מרובות או הרגשת צמא). **פני לרופא אם זה קורה**, ייתכן שתידרש לעשות בדיקות דם

• דלקת ריאה (התסמינים עלולים להיות הרגשת קוצר נשימה, שיעול)

• שחמת תוכנית (בעיות כבד)

**נדירות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 1,000 מטופלות)**

• בעיות דם חמורות. עלולות לגרום לקבלת סימני חבורות ביתר קלות, לזיהומים חמורים או שתרגשי עייפות רבה או חסרת נשימה

• שינויים בקריחת העין

• בעיות בעצב המחוברת אל הרשתית למוח

• נפיחות של עصب הראייה

• מחלות כבד חמורות שגרמו למוות במקרים מסוימים. מחלות כבד חמורות המלוות דלקת של הכבד, שחמת כבד, זנק לתאי כבד, ירידה ביצירת מיצי מרה וכשל כבדי. התסמינים יכולים לכלול הרגשה כללית לא טובה, עם או בלי צחצח (הצחצה של העור והעיניים)

• זנק לכלי דם הגורים לנקודות אדומות או סמולות בעור

• מחלת עור חמורה. התסמינים כוללים אדמומיות, שלפוחיות וקילוף

• תאי סבדרך כלל נמצאים רק ברירית הרחם נמצאו במקום אחר בגוף, ציסטות על השחלות וסרטן

• גוש לא סרטני ברירית הפופימית של הנרתיק (פולפי וגינלי)

• בתחילת הטיפול חסמי סמיני סרטן השד עלולים להתמיר, כגון עלייה ברמת הכאב ו/או עלייה בגודל הרקמה הסרטנית (ידוע כהתפרצות הגידול)

**נדירות מאוד (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10,000 מטופלות)**

• דלקת של העור המאופיינת בפריחה או אודם, לעיתים קרובות מאוד

• דאזורים בגוף החשופים לאור (דאבת עורית)

• מחלת עור המאופיינת בשלפוחיות בעור באזורים בגוף החשופים לאור

• עקב יציור מוגבר של פיגמנטים (פורפיריזים) על ידי הכבד

• פריחה בעור המערבת אדמומיות, נפיחות ואם שלפוחיות (כמו כוניות שמש חמורות) של העור לאחר קבלת טיפול קרניתי (רדיותרפיה)

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מתמירה או כאשר את סובלת מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.**

**דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שממצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

מנני ירעה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ילדים וסווור ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרמי להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אם הלהשתמש בתרופה אחרת תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

- יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל-25°C.**
  - יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור.**
  - אין להשליך תרופות לביבו או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.
- 6. מידע נוסף**

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Mannitol, Sodium starch glycolate, Povidone, Hypromellose, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Titanium dioxide, Polyethylene glycol 400.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

טבליה מצופה, לבלנה ועגולה, קמורה משני צדיה, עם קו חצייה, כאשר המספר "20" מוטבע בעל הקו והאות "T" מתחתיו וחקקה בצד השני של הטבליה.

גודלי אריזות: 10, 30, 100, 250 טבליות. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

**שם בעל הרישום והיצרן ונתבות:**

טבע ישראל בע"מ, רח' הבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

**נערך בינואר 2022 בהתאם להחיות משרד הבריאות.**

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**
142.98.33084