

חברת למטופל

באוונציו®

(אבלומאב)

מידע חשוב על בטיחות למזעור הסיכון  
של תופעות לוואי (תגובות חריגות)  
הקשורות למערכת החיסון

מידע למטופלים

המידע שלפניך נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ביוני 2022

אודות באוונציו® (אבלומאב)


**באוונציו® היא תרופה המשמשת לטיפול בסוגים מסוימים של סרטן.**

**לפני שתתחיל לקחת באוונציו®**


אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה, או שאתה עשוי לקחת תרופות כלשהן, ספר על כך לרופא. עדכן את הרופא המטפל על מצבך הרפואי במקרים הבאים:

- יש לך מחלה אוטואימונית (מצב שבו הגוף מתקיף את התאים של עצמו)
- יש לך זיהום בנגיף כשל חיסוני אנושי (HIV) או תסמונת כשל חיסוני נרכש (AIDS)
- סבלת או הינך סובל מזיהום נגיפי של הכבד, כולל הפטיטיס B (HBV) או הפטיטיס C (HCV)
- אתה מקבל תרופות לדיכוי מערכת החיסון שלך
- עברת השתלת איברים
- אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות כלשהן
- את אישה בהיריון, חושבת שאת בהיריון, או מתכננת להרות
- את מסוגלת להרות. עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן שאת מטופלת בבאוונציו® ולמשך חודש אחד לפחות לאחר המנה האחרונה שתקבלי
- את מניקה או מתכננת להניק. אל תניקי בזמן שאת מטופלת בבאוונציו® ולמשך חודש אחד לפחות לאחר המנה האחרונה שתקבלי

הרופא שלך רשם לך באוונציו® (אבלומאב) כדי לטפל במחלתך. חוברת זו תדריך אותך בטיפול, כולל מה לצפות בזמן שאתה נוטל תרופה זו. מדריך זה יסביר כמה מתופעות הלוואי שעלולות להתפתח בזמן שאתה מקבל טיפול בבאוונציו® וכיצד לזהותן. תלמד גם מדוע חשוב לדווח על תסמינים לרופא שלך באופן מיידי.



נא להדביק כאן  
את כרטיס המידע  
החשוב למטופל



חותמת הרופא

## מה עליך לדעת על הטיפול שלך

### איך מקבלים באוונציו® (אבלומאב)

הטיפול בבאוונציו® ינתן לך בבית חולים או במרפאה בהשגחת רופא מנוסה. הרופא ייתן לך באוונציו® באמצעות עירוני לתוך הוריד (תוך-וריד) במשך שעה אחת, פעם בשבועיים. הרופא המטפל יחליט כמה טיפולים אתה צריך.

### לפני שתתחיל לקבל באוונציו®

במשך ארבעת הטיפולים הראשונים לפחות, תקבל פרצטמול ואנטי-היסטמין לפני שתקבל באוונציו® כדי לעזור במניעת תופעות לוואי אפשריות הקשורות לעירוי. בהתאם לתגובה של גופך לטיפול, הרופא עשוי להחליט להמשיך לתת לך תרופות אלה לפני כל הטיפולים שלך בבאוונציו®.

חשוב מאוד שתגיע לכל התורים שנקבעו לך כדי לקבל באוונציו®. אם לא הגעת לתור, בקש מהרופא לקבוע מועד למנה הבאה שלך.

### הטיפול בבאוונציו® עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות המחייבות טיפול מיד

#### תופעות לוואי אפשריות

כמו בכל תרופה, השימוש בבאוונציו® עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

התרופה באוונציו® פועלת על מערכת החיסון שלך ועלולה לגרום דלקת בחלקים של גופך. הדלקת עלולה לגרום נזק רציני לגופך ומצבי דלקת מסוימים עשויים לחייב טיפול נוסף, וייתכן שהטיפול שלך בבאוונציו® יופסק. במקרים נדירים, חלק מתופעות לוואי אלה עלולות להוביל למוות.

פנה לקבלת עזרה רפואית בדחיפות אם יש לך אחד מהתסמינים הבאים, או שהם מחמירים. הם עשויים להופיע שבועות או חודשים אחרי המנה האחרונה שתקבל. אל תנסה לטפל בהם בעצמך באמצעות תרופות אחרות:

תופעות לוואי	סימנים או תסמינים
תגובות לעירוי	<ul style="list-style-type: none"> <li>קוצר נשימה או צפצופים</li> <li>צמרמורות או רעד</li> <li>פריחה גושיה או בליטות בעור</li> <li>הסמקה</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>לחץ דם נמוך (סחרחורת, תשישות, בחילה)</li> <li>חום</li> <li>כאב גב</li> <li>כאב בטן</li> </ul>

### תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון

פנאמוניטיס (דלקת ריאות)	<ul style="list-style-type: none"> <li>קשיי נשימה</li> <li>שיעול</li> </ul>
הפטיטיס (דלקת בכבד)	<ul style="list-style-type: none"> <li>הצהבה של העור (צהבת) ושל לובן העין</li> <li>בחילות או הקאות חמורות</li> <li>כאב בצד הימני של אזור הבטן</li> <li>ישנוניות</li> <li>שתן כהה (בצבע תה)</li> </ul>
קוליטיס (דלקת המעי הגס)	<ul style="list-style-type: none"> <li>שלשול (יציאות רכות)</li> <li>מספר תנועות מעיים רב מהרגיל</li> </ul>
פנקריאטיטיס (דלקת של הלבלב)	<ul style="list-style-type: none"> <li>כאב בטן</li> <li>בחילה</li> </ul>
מיוקריטיס (דלקת של שריר הלב)	<ul style="list-style-type: none"> <li>קשיי נשימה</li> <li>סחרחורת או התעלפות</li> <li>חום</li> </ul>
הפרעות אנדוקריניות בבלוטות הורמונליות (בלוטת התריס, בלוטת יותרת המוח, בלוטת יותרת הכליה)	<ul style="list-style-type: none"> <li>עייפות קיצונית</li> <li>פעימות לב מהירות</li> <li>הזעה מוגברת</li> <li>שינויים במצב הרוח או בהתנהגות, כגון עצבנות או שכחנות</li> </ul>
סוכרת מסוג 1, כולל בעיה חמורה, לעתים מסכנת חיים, עקב עליית חומצה בדם הנוצרת מסוכרת (חמצת סוכרתית [קטואצידוזיס])	<ul style="list-style-type: none"> <li>תחושת רעב או צמא מוגברת מהרגיל</li> <li>מתן שתן בתכיפות רבה מהרגיל</li> <li>ירידה במשקל</li> <li>תחושת עייפות</li> <li>קושי בחשיבה צלולה</li> </ul>
נפריטיס (דלקת של הכליה) וחוסר תפקוד של מערכת השתן	<ul style="list-style-type: none"> <li>תוצאות חריגות בבדיקות תפקודי כליות</li> <li>מתן שתן פחות מהרגיל</li> </ul>
תופעות לוואי נוספות הקשורות למערכת החיסון	<ul style="list-style-type: none"> <li>מיוזיטיס (דלקת של השריר)</li> <li>כאבי שרירים</li> <li>חולשה</li> <li>אובאיטיס (דלקת של העין)</li> <li>תסמונת גיליאן-ברה</li> <li>כאב</li> <li>נימול</li> <li>מיאסתניה גרביס או תסמונת מיאסתנית</li> <li>חולשת שרירים חמורה</li> </ul>

## תשומת לב לתופעות לוואי

### חשוב להיות מודע לתסמינים

אם הבחנת בסימנים או תסמינים בזמן שאתה מקבל באוונציו®, עליך לדבר עם הרופא המטפל מיד. עליך לדעת כי תופעות לוואי עדיין עשויות להופיע שבועות או חודשים לאחר קבלת המנה האחרונה של באוונציו®.

ניתן להשתמש בתרופות מסוימות, כמו קורטיקוסטרואידים, למניעת סיבוכים חמורים יותר ולהפחתת התסמינים. הרופא שלך עשוי להשהות או להפסיק לחלוטין את הטיפול אם תופעות הלוואי שלך חמורות מדי.

### מה לעשות אם יופיעו תסמינים כשאתה רחוק מביתך

חשוב שתיצור קשר עם הרופא שלך בכל פעם שמופיעים תסמינים. קח איתך תמיד את כרטיס המידע למטופל המכיל את פרטי הקשר של הרופא כדי שתוכל להשיג אותו במקרה חירום. כרטיס המידע החשוב למטופל מכיל מידע חשוב אודות תסמינים שצריך לדווח עליהם מיד לרופא או לאחות המטפלים בך כאשר אתה רחוק מביתך. הוא גם מתריע לרופאים אחרים שאתה מטופל באוונציו®.

**שא עמך את כרטיס המידע למטופל בכל עת.**

## אל תחמיץ את התור לטיפול בבאוונציו®

אם תפסיק את הטיפול או שלא תיקח אותו ברצף, ייתכן שהשפעת התרופה תיפסק. אל תפסיק את הטיפול בבאוונציו® אלא אם כן דיברת על כך עם הרופא שלך.

אנא השתדל מאוד להגיע לכל התורים, וקבע מועד לתור חדש בהקדם האפשרי אם החמצת תור. צור קשר עם הרופא שלך מיד אם יש לך תופעות לוואי כלשהן, כולל כאלה שאינן מופיעות בחוברת זו.

פנה לרופאך אם יש לך שאלות על באוונציו® או על אופן פעולתה.

באוונציו® הוא מסוג הטיפולים המסייעים למערכת החיסון שלך להילחם בסרטן. סוג זה של טיפול יכול להיות מלווה לעתים בתופעות לוואי.

תופעות לוואי מסוימות של הטיפול עם באוונציו®, עלולות להיות חמורות. פנה לרופאך במידי אם יש לך תופעות לוואי כלשהן. דבר עם רופאך אם יש לך שאלות על באוונציו® או על אופן פעולתה.

### היכן למצוא מידע נוסף

למידע נוסף, היוועץ ברופא המטפל.

אם יהיו לך תופעות לוואי כלשהן, פנה לרופא, לרוקח או לאחות. בנוסף יש לדווח לרופא לגבי כל תופעת לוואי שאינה מפורטת בחוברת זו.

## דיווח תופעות לוואי

תרופה זו נמצאת במעקב מתמשך. על ידי דיווח תופעות לוואי באפשרותך לסייע באיסוף מידע בטיחותי נוסף אודות התרופה. דיווח זה מאפשר גילוי מהיר של מידע בטיחותי חדש.

אנא דווח על תופעות לוואי לחברת מרק בטלפון: 09-9510737  
או בכתובת הדוא"ל הבאה: [Drug.Safety.israel@merckgroup.com](mailto:Drug.Safety.israel@merckgroup.com)

ניתן לדווח על תופעות לוואי גם למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או בלחיצה על הקישור הבא: <https://sideeffects.health.gov.il>