

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء بموجب وصفة طبية فقط

روبراكا 200 ملغ أقراص مطليّة

روبراكا 250 ملغ أقراص مطليّة

روبراكا 300 ملغ أقراص مطليّة

المادة الفعالة:

روبراكا 200 ملغ أقراص مطليّة تحتوي على 200 ملغ روکارپاريب (rucaparib 200 mg)
روبراكا 250 ملغ أقراص مطليّة تحتوي على 250 ملغ روکارپاريب (rucaparib 250 mg)
روبراكا 300 ملغ أقراص مطليّة تحتوي على 300 ملغ روکارپاريب (rucaparib 300 mg)

لائحة المواد غير الفعالة، انظر رجاءً البند 6: "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل أن تبدأ باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديكَ أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وُصِّف هذا الدواء لعلاج مرض. لا تعطِه لآخرين؛ لأنَّه قد يضر بهم، حتَّى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

روبراكا معد لعلاج مداومة للبالغين الذين لديهم سرطان المبيض الظهاري، سرطان قناة فالوب، أو سرطان صفافي أولي، الذين استجابوا استجابة كاملة أو جزئية للعلاج الكيميائي الذي يستند على بلاتين.

روبراكا معد لعلاج البالغين الذين لديهم سرطان المبيض الظهاري، سرطان قناة فالوب، أو سرطان صفافي أولي مع طفرة وراثية وأو مكتسبة في جين BRCA، والذين تلقوا علاجين كيميائيين أو أكثر.

الفصيلة العلاجية: مضادات الأورام - مثبطة إنزيمات PARP.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال روبراكا إذا:

- كانت لديكَ حساسية مفرطة (Hypersensitivity) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية")
- كنتَ مريضعة

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بروبراكا، أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا:

- كانت لديكَ العلامات والأعراض التالية التي تشير إلى تعداد دم منخفض، الذي قد يحدث نتيجة استعمال روبراكا: حُمى، ثلوث، نزيف دموي، وميل لتطور خدمات في الجسم.
قد يكون تعداد الدم المنخفض علامة لمشكلة خطيرة في نخاع العظام - مثلاً: متلازمة خلل التنسج النقوي (MSD) أو ابيضاض الدم النقوي الحاد (AML).

- كنتَ امرأة في سن الإخصاب أو كنتَ تخططين للحمل. يُحسن إنجاز فحص حمل قبل بداية العلاج بروبراكا. يوصي باستعمال وسائل منع حمل ناجعة أثناء العلاج بروبراكا وحتى 6 أشهر بعد الجرعة الأخيرة التي تم تناولها. أخبري الطبيب على الفور إذا كنتَ حاملاً.

الأطفال والمرأهقون

روبراكا ليس معداً للاستعمال لدى الأطفال والمرأهقين دون جيل 18 سنة.

الفحوص والمتابعة

سوف ينجز طبيبك أو الممرضة فحوص دم لـتعداد دمك:

- قبل بداية العلاج بروبراكا
 - في كل شهر من العلاج بروبراكا
- قد يتطلب طبيبك منك إنجاز فحص حمل قبل بدء العلاج بروبراكا.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكمّلات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. ذلك لأن روبراكا قد يؤثر في طريقة عمل الأدوية الأخرى. إضافة إلى ذلك، قد تؤثر أدوية أخرى في عمل روبراكا.

أخبر الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة إذا كنت تتناول دواء واحداً أو أكثر من الأدوية التالية:

- أدوية مضادة للتختثر تحسن تدفق الدم مثل وارفارين
- أدوية مضادة للاختلالات لعلاج الاختلالات (التشنجات) وداء الصرع مثلا: فينيتوين
- أدوية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، مثلا: روسباستاتين
- أدوية لعلاج مشاكل في المعدة، مثلا: سيساپريد، أوميپرازول
- أدوية لتنشيط جهاز المناعة، مثلا: سيكلوسيپرين، سيروليموس أو تاكروليموس
- أدوية لعلاج الشقيقة وحالات الصداع، مثلا: ثانوي هيدروارچوتامين أو إيرچوتامين
- أدوية لعلاج الألم الحاد، مثلا: أفتانيل أو فينتانيل
- أدوية لعلاج الحركات الالإرادية أو الاضطرابات النفسية، مثلا: بيموزيد
- أدوية لخفض مستويات السكر في الدم ولعلاج السكري، مثلا: ميتغورمين
- أدوية لعلاج النبض غير المنتظم، مثلا: ديجوكسين أو كيندين
- أدوية لعلاج ردود فعل أرجحية، مثلا: استيميزول أو تيرفينادين
- أدوية تساعد على النوم أو النعاس، مثلا: ميدازولام
- أدوية لإرخاء العضلات، مثلا: نيزانيدين
- أدوية لعلاج الربو، مثلا: ثيوفيلين

استعمال الدواء والغذاء

يمكن تناول الدواء مع أو من دون طعام.

الحمل، الإرضاع والخصوصية

الحمل

- لا يوصى بتناول روبراكا أثناء الحمل، لأنه قد يلحق ضرراً بجنينك. يُمنع الحمل أثناء العلاج بروبراكا.
- يُستحسن إنجاز فحص حمل قبل بدء العلاج بروبراكا لدى النساء في سن الإخصاب.

الإرضاع

- لا يجوز الإرضاع أثناء العلاج بروبراكا، ولمدة أسبوعين بعد تناول الجرعة الأخيرة، ذلك لأنه من غير المعروف إذا كان روكياباريب ينتقل عبر حليب الأم.

الإخصاب النساء

يتعين على النساء القادرات على الحمل أن يستعملن وسائل منع حمل ناجحة:

- أثناء العلاج بروبراكا
- لمدة 6 أشهر بعد انتهاء الجرعة العلاجية الأخيرة من روبراكا.

ذلك لأن المادة الفعالة روكياباريب قد تؤثر على الجنين.

تحديثي مع الطبيب أو الصيدلي حول وسائل منع الحمل الأنفع.

الرجال

- يجب على الرجال الذين لديهم زوجات حوامل أو اللواتي قد تصبحن حوامل استعمال وسائل منع حمل ناجحة أثناء العلاج بروبراكا ولمدة ثلاثة أشهر بعد تناول الجرعة الأخيرة من روبراكا.
- يُمنع التبرع بالحيوانات المنوية أثناء العلاج بروبراكا ولمدة ثلاثة أشهر بعد تناول الجرعة الأخيرة من روبراكا.

السيافة واستعمال الماكينات

- قد تشعر بالنعاس، الدوار، أو التعب أثناء تناول روبراكا.
- لا يجوز لك القيادة، ركوب الدراجة الهوائية، استعمال الأجهزة أو تشغيل الماكينات حتى تعرف كيف يؤثر الدواء فيك.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك تناول المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. افحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

- الجرعة المقبولة عادة هي قرصان من 300 ملغ (المجموع 600 ملغ) مرتين في اليوم. يعني ذلك تناول ما مجموعه 1,200 ملغ في اليوم. إذا كنت تعاني من أعراض جانبية معينة، قد يوصي لك الطبيب جرعة منخفضة أكثر أو إيقاف العلاج مؤقتاً.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
لا توجد معلومات حول سحق القرص، شطره، أو مضغه.

العلاج بروبراكا هو طويل الأمد. استمر بتناول روبراكا حتى يوصي لك الطبيب بإيقافه.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة أعلى من المطلوب من روبراكا، أخبر فوراً الطبيب، الصيدلي أو الممرضة. قد تحتاج إلى مساعدة طبية.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك.

إذا نسيت تناول روبراكا

- إذا فوتت جرعة، فتناولها فوراً تذكر.
- تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي.
- لا يجوز تناول جرعة مزدوجة تعويضاً عن الجرعة المنسية.
- افحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد مما عليك القيام به.

إذا تقيأت بعد تناول روبراكا، فلا تتناول جرعة إضافية. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي.

عليك المواظبة على العلاج تبعاً لتوصية الطبيب.
حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول روبراكا

- من المهم متابعة تناول روبراكا يومياً - طالما يواصل طبيبك وصفه لك.
- لا يجوز لك التوقف عن تناول هذا الدواء دون استشارة طبيبك.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، يمكن أن يسبب استعمال روبراكا أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تنزع لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فقد لا تعاني من أي منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10):

- ضيق تنفس، شعور بالتعب، جلد شاحب، أو تبض سريع - قد تكون هذه علامات تدل على تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر الدم)
- نزيف أو كدمات تستمر وقتاً أطول من المعتاد في حال التعرض لإصابة - قد تكون هذه علامات تدل على تعداد منخفض للصفائح الدموية (Thrombocytopenia)
- حمى - قد تكون هذه علامات تدل على تعداد منخفض لكرات الدم البيضاء (قلة العدلات)

أعراض جانبية أخرى تشمل على:

أعراض جانبية شائعة جداً (تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10):

- غثيان
- شعور بالتعب/الضعف
- تقيؤ
- آلام في البطن أو انتفاخ في البطن
- تغييرات في حاسة الذوق
- تغييرات في فحوصات أداء الكبد
- ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد
- قلة الشهية
- إسهال
- ارتفاع مستويات كرياتينين في الدم
- صعوبات في التنفس
- الشعور بالدوار
- حرائق الشمس
- طفح
- وذمات محيطية
- أرق
- حالات صداع
- إمساك
- التهاب في المسالك التنفسية العليا
- اضطرابات في الهضم

أعراض جانبية شائعة (تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

- حكة
- جروح في جوف الفم
- اكتئاب

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمار على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإبلاغ عبر إرسال بريد إلكتروني إلى وحدة أمان المرضى لدى صاحب التسجيل:
drugsafety@neopharmgroup.com

5. كيف يُخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجاالت رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على الفارورة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين ما دون 25 درجة مئوية.
- يمكن استعمال روبيراكا لمدة شهر بعد فتح العبوة للمرة الأولى. يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيوت. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية غير المستعملة. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate.

طلاء
أقراص مطلية 200 ملغ:

Polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), polyethylene glycol/macrogol (E1521), talc (E533b), brilliant blue FCF aluminium lake (E133), indigo carmine aluminium lake (E132).

أقراص مطلية 250 ملغ:

Polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), polyethylene glycol/macrogol (E1521), talc (E533b).

أقراص مطلية 300 ملغ:

Polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), polyethylene glycol/macrogol (E1521), talc (E533b), and iron oxide yellow (E172).

• كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة

روبراكا 200 ملغ: أقراص مطلية، لونها أزرق، مستديرة، مختوم على أحد جانبيها 'C2'.

روبراكا 250 ملغ: أقراص مطلية، لونها أبيض، شكلها معين، مختوم على أحد جانبيها 'C25'.

روبراكا 300 ملغ: أقراص مطلية لونها أصفر، شكلها بيضاوي، مختوم على أحد جانبيها 'C3'.

الأقراص معبة بقارير بلاستيكية. تحتوي كل قارورة على 60 قرصاً.

اسم المنتج وعنوانه: شركة كلوفيس أونكولوجي، إنك.، بولدر، الولايات المتحدة.

صاحب التسجيل وعنوانه:

نيوفارم م.ض.، شارع هشليواح 6، ص.ب. 7063، بيتح تكفا .4917001

حررت في آذار 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

روبراكا 200 ملغ: 162-81-35664

روبراكا 250 ملغ: 162-83-35666

روبراكا 300 ملغ: 162-82-35665

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكور. مع هذا، فالدواء معد لأبناء كلا الجنسين.