

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوّج الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

SANOFI

فريزيوم

أقراص، 10 ملغ

المادة الفعالة:

كل قرص يحتوي على:

Clobazam 10 mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

والفقرة 6 - "معلومات إضافية"

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء للعلاج من أجليك. لم تحطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

مقدمة النشرة للمستهلك - بنزوديازيبينات

- هذا الدواء ينتمي إلى فصيلة البنزوديازيبينات، التي تتسم بصفات خاصة تُلزم إخطاح الحذر الشديد عند إستعمالها.

- هناك أهمية كبيرة لإجراء متابعة طبية حثيثة عند تناول هذا الدواء.

- عند تناولك هذا الدواء أحرص على مراجعة الطبيب بعد 2-4 أسابيع، نظراً لأن العلاج مخصص لفترات قصيرة فقط.

- الإستعمال المطول بالدواء قد يقلل من تأثيره.

- هذا الإستعمال قد يسبب ظاهرة شديدة من التعلق بالدواء، حيث يصعب على المريض فيها التوقف عن تناول الدواء.

- يترافق التوقف الغير مراقب للعلاج بأعراض إنسحابية مثل: توتر، عصبية، إرتباك، رجفان، آرق، آلام في البطن، تقوؤات، غثيان، تعرق، تشنجات.

- الإستعمال المتواصل بالدواء يمكن أن يسبب أحيانا تغيرات في أنماط السلوك ولأنكار مزعجة.

- من الموصى به خاصة لدى المستين الإحتراس عند المشي، نظراً لأن الدواء يخل باليقظة كذلك يخل أحيانا بتنسيق حركات الجسم وبذلك هناك خطورة لحدوث ترحل أو سقوطات.

إن تناول هذا الدواء مع أدوية من فصيلة الأفيونات، أدوية أخرى مثبطة للجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول، قد يؤدي إلى الشعور بميل شديد للنوم، صعوبة في التنفس (تثبيط تنفسي)، سبات وموت.

(1) لأي غرض مخصص للدواء؟

يستعمل الدواء لعلاج حالات اللق لد الكبار.

الفصيلة العلاجية: تنتمي المادة الفعالة إلى فصيلة أدوية تسمى بنزوديازيبينات.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الرجي) للمادة الفعالة، لأدوية أخرى من فصيلة البنزوديازيبينات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- علامات لر فعل تحسسي شمل: طفح، مشاكل في البلع أو في التنفس، إنتفاخ الشفتين لديك، الوجه، الحنجرة أو اللسان.
- كنت في فترة الحمل أو تخططين للحمل (أنظري فيما يلي تحت "الحمل، الإرضاع والخصوبة" لمعلومات إضافية)
- كنت مرضعة
- وجدت لديك في الماضي مشاكل تعلق بأدوية أو بالكحول
- كنت تعاني من مرض يسبب ضعف عضلي (يسمى الوهن العضلي البويل - myasthenia gravis)
- لديك مشاكل في الكبد
- لديك مشاكل في التنفس
- كنت تتوقف عن التنفس لفترات قصيرة خلال النوم (يسمى "متلازمة إنقطاع التنفس خلال النوم")

لا تتناول الدواء إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات المذكورة أعلاه. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول فريزيوم.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ فريزيوم، إحدك لطبيب إذا:

وجدت لديك مشاكل في حركاتك (تسمى "spinal or cerebellar ataxia").

كنت تعاني من إكتئاب، مخاوف غير منطقية وأفكار قسرية.

كنت تعاني من أفكار باطلة (الاعتقاد بأشياء غير حقيقية) أو هلوسة (تشعر بأشياء غير موجودة).

وجدت لديك مشاكل في الكلى.

تطور لديك في الماضي تعلق بدواء آخر أو بالكحول. لا يجوز إستهلاك الكحول خلال العلاج بـ فريزيوم جراء تزايد الخطورة لحدوث أعراض جانبية.

تجاوزت عمر 65 سنة. وذلك جراء تزايد الحساسية لحدوث أعراض جانبية لدى المسنين مثل نعاس، دوار وضعف عضلي. هناك أيضاً خطورة زائدة لحدوث سقوطات التي قد تؤدي إلى إصابة خطيرة.

وجدت لديك صعوبة في هضم الأدوية. لدى بعض المتعالجين، قد لا يجرى الكبد إستقلاب (تفكيك) كافٍ للأدوية. لدى هؤلاء المتعالجين قد يبقى الدواء في الجسم لفترة زمنية أطول. قد يؤدي هذا الأمر إلى أعراض جانبية. إذا كان من المعروف أن لديك خلل في إستقلاب أدوية معينة، الرجاء تحدث مع طبيبك.

كنت تستعمل منتجات طبية أو غير طبية تحتوي على كئابيديول، لأن ذلك قد يفاقم الأعراض الجانبية لكlobazam.

إن الدواء، خاصة إذا تم تناوله مع أدوية أخرى بما في ذلك أدوية لمعالجة الصرع، قد يؤدي لأعراض جانبية جلدية شديدة وتشكل خطراً على الحياة. إذا حدث هذه الأعراض، يجب التوجه إلى الطبيب فوراً.

نعاس، صعوبة في التنفس، سبات ووفاة قد تحدث إذا تم تناول فريزيوم سوية مع أفيونات.

بإمكان إستعمال فريزيوم وأفيونات بشكل متزامن فقط عندما تكون الخيارات العلاجية الأخرى غير مناسبة. الرجاء إحدك لطبيبك عن كافة الأدوية الأفيونية

التي تستعملها، وأحرص على التقيّد بتعليمات الطبيب بخصوص المقدار الدوائي. أظهرت أبحاث معينة تزايد الخطورة لحدوث أفكار إنتحارية، محاولات للإنتحار والإنتحار لدى متعالجين يتناولون أدوية معينة للتهديفة والنوم، بما في هذا الدواء. مع ذلك، لم يثبت فيما إذا كان هذا الأمر ناجماً عن الدواء أو فيما إذا قد تكون هناك أسباب أخرى. إذا وجدت لديك أفكار إنتحارية، إتصل بطبيبك بأسرع ما يمكن لتلقي إستشارة طبية إضافية (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي قبل تناول فريزيوم.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص للأطفال.

الفحوص والمتابعة

إذا إقتضت الحاجة لبداية العلاج بدواء يحتوي المادة الفعالة ستيريبنتول، بالإضافة لـ فريزيوم، فهاك ضرورة لإجراء فحوص دم قبل بدء العلاج وخلاله. هناك حاجة لمراقبة طبية حثيثة في الأسابيع الثمانية الأولى للعلاج من أجل تشخيص ظهور أعراض جلدية شديدة بشكل فوري.

التداخلات/التفاعلات مع الأدوية

إذا كنت تتناول، من شأنك أن تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحدك لطبيب أو الصيدلي عن ذلك. إن ذلك لن يفرزيوم قد يؤثر على طريقة عمل أدوية معينة أخرى. كذلك، فإن أدوية معينة قد تؤثر على طريقة عمل فريزيوم.

إحدك لطبيب بالأخص إذا كنت تتناول:

● أدوية الصرع (مثل ليفيتين، كاربامازيبين، ستيريبنتول أو حمض فالبرويك).

● أدوية للإكتئاب (مثل مثبطات أكسيداز أكسيداز (MAOIs) أو مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة مثل ترازودون، أو مثبطات إنتقائية لإعادة إمتصاص السيروتونين (SSRIs) مثل فلوكساسامين أو باروكستين).

● أدوية لأمراض كلوية خطيرة تسمى "مضادات الكلى" (مثل كلوربرومازين، هالوبيريدول، كلوزابين وبيميوزين).

● مسكنات آلام (مثل أدوية تحتوي على كوديين، ديهيدروكوديين أو مورفين).

● أدوية النوم (مثل زولبيديم).

● أدوية مهدئة (مثل بنزاديام، تميزازيم أو لورازيبام).

● أدوية لإرخاء العضلات (مثل باكليفين).

● مضادات الإستمناء التي تسبب لك الميل إلى النوم (مثل كلورفينامين، بروميثازين أو ديفينهيدرامين).

● ليتيوم - المستعمل لمرض نفسي يسمى "الهوس الإكتيبي" (تغيرات في المزاج التي تتراوح ما بين حالة من فرط الأطفال أو عواطف مبالغ فيها وإكتئاب).

● سيميتيدين - يستعمل لعلاج القرحة والحرقان.

● أميبرازول - يستعمل لعلاج إضطرابات المعدة.

● تيكلوپيديين - دواء يبطئ تكس الصفائح الدموية الذي يستعمل لمنع تشكل الخثرات الدموية.

● فلوكونازول - يستعمل لعلاج حالات الفطر.

● ديكستروميثورفان - يستعمل للتخفيف من السعال الجاف والمزعج.

● نيبيفلور - يستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع.

● منتجات تحتوي على كئابيديول (منتجات طبية أو غير طبية).

إن الإستعمال بشكل متزامن لـ فريزيوم وأفيونات يزيد من الخطورة لحدوث نعاس، صعوبات في التنفس، سبات ووفاة. تفيد بتعليمات الطبيب بخصوص المقدار الدوائي.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كانت إحدى الحالات المذكورة أعلاه تنطبق عليك، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

مواد التخدير

إذا كنت مقبلاً على تلقي مادة للتخدير، إحدك لطبيبك أو لطبيب التخدير بأنك تتناول فريزيوم. لأنه من الجائز أن يحتاج طبيبك إلى تغيير كمية المادة المخدرة أو مرخي العضلات الذي يجب إعطاؤه لك.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز شرب الكحول خلال فترة تناول فريزيوم. ذلك لأن هناك زيادة في الخطورة لحدوث ميل للنوم وأعراض جانبية أخرى.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

لا يوصى بإستعمال هذا الدواء خلال فترة الحمل ولدى نساء في سن الخصوبة اللاتي لا يستعملن وسائل منع حمل.

إذا إكتشفت بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك فوراً من أجل التقييم من أجل الحاجة للعلاج. لا تتوقفي عن تناول فريزيوم بدون إحدك مع طبيبك.

لم تبين كمية كبيرة من المعطيات أدلة لنشوءات مرتبطة بإستعمال البنزوديازيبينات. مع ذلك، أظهرت أبحاث معينة احتمالاً لخطورة متزايدة لحدوث إنشقاق في الحنك والشفة لدى حديثي الولادة مقارنة باللفة السكانية العامة.

إن الحنك والشفة المشقوقين (المُسميان أحياناً "شفة الأرنب") عبارة عن تشوه خلقي ناتج عن إلتزام غير كامل للحنك والشفة العلوية.

إنخفاض في حركات الجنين وتغيرات في نظم قلب الجنين من شأنها أن تحدث بعد تناول كlobazam خلال الثلث الثاني و/أو الثالث من الحمل.

إذا تم تناول فريزيوم في نهاية الحمل أو خلال الولادة، فمن الجائز أن يعاني رضيعك من ميل للنوم، ضعف عضلي (نقص التوتر العضلي) أو إرخاء في العضلات، إنخفاض في درجة حرارة الجسم (hypothermia)، صعوبات في الإطعام (مشاكل في الرضاعة التي تؤدي إلى إرتفاع قليل في الوزن) ومشاكل في التنفس (تثبيط للتنفس، أحياناً خنثي).

إذا تم تناول الدواء بشكل دائم في المراحل المتأخرة من الحمل، فمن الجائز أن يعاني رضيعك من أعراض فطام مثل عصبية أو إرتجاج. في هذه الحالة، على المولود أن يخضع لإشراف حيث خلال فترة ما بعد الولادة.

لا يجوز تناول فريزيوم إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع. ذلك لأنه من شأنه أن ينتقل إلى حليب الأم.

السياقة وإستعمال الماكينات

قد تشعر بميل للنوم أو أن تعاني من مشاكل في التركيز أو في الذاكرة بعد تناول هذا الدواء. قد تعاني أيضاً من إزدواجية الرؤية أو قد تستجيب بشكل أبطأ لأشياء.

إذا حدث ذلك، فلا يجوز السياقة أو إستعمال معدات العمل أو الماكينات.

قد يؤثر الدواء على قدرتك على السياقة لأنه قد يسبب لك ميل للنوم أو دوار.

لا تقم بالسياقة خلال إستعمال هذا الدواء إلى أن تعلم بكيفية تأثيره عليك.

تحدث مع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان آمناً أن تتقود خلال فترة تناول الدواء.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي فريزيوم على لكتوز. إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، تحدث مع طبيبك قبل تناول الدواء.

(3) كيفية استعمال الدواء؟

يجب دائماً استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب.

عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

عليك تناول الدواء نظاماً يصفه لك الطبيب. إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أشد أو أضعف من اللازم، فلا تغير المقدار الدوائي من تلقاء نفسك، إستشر الطبيب.

يُعطى فريزيوم عادة لفترة 2-4 أسابيع وبعد ذلك يقرر الطبيب بخصوص إستمرارية العلاج.

المقدار الدوائي الاعتيادي للكبار: 30-20 ملغ في اليوم بمقدارين دوائيين مقسمين أو كمقدار دوائي واحد في الليل.

من الجائز أن يرفع الطبيب المقدار الدوائي حتى 60 ملغ في اليوم، ومن الجائز أن يخفض الطبيب المقدار الدوائي.

المقدار الدوائي الاعتيادي للمسنين: 10-20 ملغ في اليوم.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال.

المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو في الكلى سيتناولون مقداراً دوائياً منخفضاً من فريزيوم، حسب تعليمات الطبيب.

بعد فترة لا تتجاوز 4 أسابيع من بدء العلاج يحدد الطبيب مواصلة العلاج.

لا يجوز الصُّغُر يجب بلع الدواء بشكله الكامل مع نصف كأس ماء على الأقل أو مفتت ومخلوط مع قناع مهروس.

يسمح بشرط القرص إلى نصفين من أجل الحصول على مقدار دوائي قدره 5 ملغ. إذا توجب تناول المستحضر عدة مرات في اليوم، فيجب تناول المقدار الدوائي الأكبر في المساء.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر:

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه مباشرة إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

لا تتقود، لأنك يمكن أن تشعر بالنعاس.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص، فتناول قرصاً حال تذكرك ذلك، لكن إذا حان تقريبا موعد تناول القرص القادم، فقم بتقوية المقدار الدوائي هذا.

لا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً كتعويض عن القرص المنسي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. يتم التوقف عن العلاج بالدواء بشكل تدريجي.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

يمكن أن يؤدي التوقف عن العلاج بالدواء إلى قلة الهدوء، قلق، إرتباك، إكتئاب وحتى لفقدان الشهية للطعام والأرق. إحذر الطبيب إذا حدث ذلك.

لا تتوقف عن تناول الدواء إلا إذا أوصاك طبيبك القيام بذلك. يتم التوقف عن العلاج بشكل تدريجي. راجع الطبيب قبل التوقف عن العلاج.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب فحص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، فإن استعمال فريزيوم قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تنشأ من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.

قد تشعر بأنك مريض بعد تناول الأقراص، أو تلاحظ أعراضاً غير اعتيادية أو غير متوقعة. إحذر طبيبك إذا حدث ذلك.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهرت لديك إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين):

• الشعور بصعوبة أو بقلّة راحة.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل):

• خلل في الذاكرة خلال العلاج بـ فريزيوم (فقدان الذاكرة) أو سلوك شاذ.

• كوابيس ليلية.

• الشعور بالقلق.

• الإعتقاد بأشياء غير حقيقية (أفكار باطلة).

• تزايد احتمال الترحل أو السقوطات، خاصة لدى المتعاليين المسنين.

أعراض جانبية شائعة غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعطيات المتوفرة):

• مشاكل في النوم التي تتفاقم بعد تناول الدواء.

• الشعور بأشياء غير موجودة (هلوسة).

• انخفاض الإدراك لمحيطك، خاصة لدى المسنين.

• شعور إنتحاري.

• طلع حويصلي خطير حيث قد يظهر فيه تقشر لطبقات الجلد الذي يترك مناطق واسعة على كامل سطح الجسم مكشوفة الجلد. كذلك، شعور عام غير جيد، سخونة، قشعريرة وآلام عضلية. يُسمى هذا "إنتحال البشرة النخري السمي" (Toxic epidermal necrolysis).

إذا ظهرت لديك إحدى الأعراض الجانبية المذكورة أعلاه، فمن الجائز أن يقرر طبيبك بأن هناك حاجة للتوقف عن العلاج. هذه الأعراض الجانبية شائعة أكثر لدى المسنين.

يجب مراجعة طبيبك أو الصيدلي إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية التالية أو إستمرت لأكثر من عدة أيام، أو إذا لاحظت عرض جانبي لم يذكر في النشرة. أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):

• صعوبة البقاء يقظاً أو متنبهاً.

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 مستعملين):

• الشعور بميل للنوم أو دوار.

• الشعور بهيجان أو عدوانية.

• إكتئاب.

• صداع.

• مدى قصير للإصغاء.

• صعوبة في النطق.

• إرتجاف في الأصابع.

• مشاكل في المشي أو مشاكل أخرى في الحركة.

• انخفاض في تأثير فريزيوم مقارنة بالتأثير الاعتيادي (خاصة في الإستعمال طويل الأمد).

• جفاف في الفم، إسكاس.

• فقدان الشهية للطعام، غثيان.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل):

• فقدان الرغبة الجنسية.

• صعوبات في الذاكرة، إرتباك.

• إزدواجية الرؤية.

• طفح جلدي.

• زيادة في الوزن.

أعراض جانبية شائعة غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعطيات المتوفرة):

• تطور تعلق بـ فريزيوم (تعلق جسدي أو نفسي) (خاصة بالإستعمال طويل الأمد).

• الشعور بعدم التواصل مع الواقع وعدم القدرة على التفكير أو الحكم بوضوح (نمّان).

• الشعور بالغضب.

• تغيرات في طريقة المشي.

• مشاكل في التنفس.

• حساسية لضوء الشمس.

• طفح حاك، تدّون (شرى).

• تقلصات عضلية أو ضعف عضلي.

• رد فعل أبطأ من المعتاد للأشياء.

• حركات سريعة وخارجة عن السيطرة للعينين.

• مشاكل في التعلم.

• درجة حرارة منخفضة بشكل شاذ للجسم.

• إحتباس البول.

الأعراض التالية شائعة أكثر في بداية العلاج. تستمر عادة لفترة قصيرة: الشعور بهرجان، جفاف في الفم، إسكاس، فقدان الشهية للطعام، غثيان، إرتجاف في الأصابع.

إذا كنت تتناول الدواء لفترة مطوّلة، يزداد احتمال ظهور الأعراض الجانبية التالية: قلق، إرتباك، إكتئاب، فقدان الشهية للطعام وصعوبات في النوم.

بعد التوقف عن العلاج، من الجائز حصول حالات فردية لظاهرة تشبه الغفام، خاصة بمقادير دوائية عالية أو بعد علاج مطّول (في حالة إقراره من قبل الطبيب).

إذا كنت تشعر بأعراض إنسحابية كذلك التي فصلت في المقدمة أو أي عرض آخر، يجب إستشارة الطبيب.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابطة "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية.

لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو إلى القمامة المنزلية. إسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً على:

Lactose monohydrate, maize starch, talc, colloidal anhydrous silica, magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما محتوى العلبة

الأقراص مستديرة وببضاض، مع خط للشرط والختم "B" في جانب واحد من الخط و"GL" في الجانب الثاني من الخط. مختم في الجانب الثاني من القرص شعار.

يتوفر فريزيوم ضمن عبوة لويحة ذات 20، 30 قرصاً. من الجائز ألا تتسوّق كافة أحجام العلبة.

صاحب الإمتياز والمستورد وعنوانه

سانوفي - أفنديس إسرائيل محض، ص.ب. 8090، נתانيا تم إعدادها في آب 2021 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 125-90-24542

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.